نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) – 1986
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

ريڤوتريل
2.5 ملغ/ملل
قطرات

التركيب:
يحتوي 1 ملل **ريڤوتريل** على:
كلونازيپام 2.5 ملغ clonazepam 2.5 mg

* لمعلومات عن الموادّ غير الفعّالة، انظر البند 6 - "معلومات إضافيّة".

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدّواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجّه إلى الطبيب أو الصيدليّ.

وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطِه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحيّة وحالتهم.

مقدمة للنشرة للمستهلك للبنزوديازيپينات
ينتمي هذا الدواء إلى مجموعة البنزوديازيپينات، ذات الخصائص المميّزة التي تتطلب توخي الحذر الشديد عند استعمالها. هناك أهمية كبيرة للمتابعة الطبية اللصيقة عند تناول هذا الدواء.

تتطرق الفقرة التالية فقط إلى العلاج قصير الأمد بالدواء:
عندما تتناول هذا الدواء، احرص على التوجه إلى الطبيب بعد 2 حتى 4 أسابيع، لأن العلاج معدّ لفترات قصيرة فقط.
قد يسبّب الاستعمال المتواصل للدواء تقليل تأثير الدواء.
كما قد يؤدي هذا الاستعمال المتواصل إلى عارض خطير من الاعتماد، ما يصعّب على المريض إيقاف تناول الدواء.
قد يكون إيقاف العلاج غير المراقب مصحوبا بأعراض فطام، مثلا: توتر، عصبية، ارتباك، رجفة، أرق، آلام في البطن، تقيؤات، غثيان، تعرّق، تشنجات، تقلصات وآلام في العضلات.
قد يؤدي أحيانا استعمال الدواء بشكل متواصل إلى تغييرات في أنماط السلوكيات وإلى أفكار قهرية.
يوصى لدى المسنين بشكل خاص بتوخي الحذر أثناء المشي، لأن الدواء يلحق ضررا باليقظة وبتناسق حركات الجسم أحيانًا، لذلك يخشى من الانزلاق أو السقوط.

قد يؤدي تناول هذا الدواء مع أدوية من مجموعة الأفيونيات، أدوية أخرى تثبط جهاز الأعصاب المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول إلى الشعور بالنعاس العميق، صعوبات في التنفُّس (تثبيط التنفس)، غيبوبة وإلى الموت.

1. لمَ أُعدّ هذا الدّواء؟
الدواء معدّ لعلاج الصرع (epilepsy) أو نوبات القلق.

المجموعة العلاجية:
ينتمي **ريڤوتريل** إلى مجموعة أدوية تدعى البنزوديازيپينات.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة كلونازيپام أو لأي بنزوديازيپين آخر أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 – "معلومات إضافيّة").
- كان لديك مرض انسدادي مزمن في المسالك التنفسية مع بدء فشل تنفسي.
- كان لديك قصور كبد خطير لأن البنزوديازيپينات قد تحفز الاعتلال الدماغي الكبدي.
- كان لديك تعلق بأدوية تسبب الإدمان وبمثبطات الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك الكحول.

قد يؤدي هذا الدواء إلى الإدمان. المخاطر أعلى لدى متعالجين يتناولون جرعات أعلى أو عند استعمال العلاج على الأمد الطويل أو لدى متعالجين لديهم ماض من إساءة استهلاك الكحول أو تعاطي المخدرات.

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء

يجب تناول ريڤوتريل على شكل قطرات فقط. انظر البند 3 – "كيفية استعمال الدواء؟" لمزيد من المعلومات. إذا لم تكن متأكدا، فيما إذا كان يتعين عليك استعمال ريڤوتريل توجه إلى طبيبك.

قبل بدء العلاج بريڤوتريل أخبر الطبيب إذا:

- **كنتِ حاملا، أصبحتِ حاملا خلال العلاج بريڤوتريل أو تخططين للحمل:** من غير المعروف فيما إذا كان **ريڤوتريل** يلحق ضررا بالجنين عندما تتناوله امرأة حامل. إذا كانت هناك حاجة إلى تناول **ريڤوتريل** عندما تكونين حاملا، فسوف يتحدث معكِ طبيبك عن المخاطر والفائدة لكِ ولجنينكِ.
- **كانت لديك مشاكل صحية بما في ذلك:**
  - مرض في الكبد، الكلى أو الرئة
  - ضغط دم مرتفع أو منخفض
  - وهن عضلي وبيل (ضعف عضلات حاد)
  - انقطاع النفس (حالة تواجه فيها انقطاع التنفس المؤقت خلال النوم)
  - داء الزرق (حالة يكون فيها لديك ضغط مرتفع في العين)
  - اكتئاب، ذهان أو انفصام الشخصية و/أو إذا كان لديك اكتئاب أو أفكار انتحارية في الماضي
  - فرفرية (اضطراب نادر في صبغة الدم)
  - ماض من سوء استعمال الكحول أو المخدرات

تحذيرات إضافيّة:

- **أخبر الطبيب، طبيب الأسنان، والصيدلي الذين يعالجونك بأنك تتناول ريڤوتريل.**
- **أخبر الطبيب إذا لم تتناول لأي سبب كان المستحضر وفق تعليماته.** وذلك لأن الطبيب قد يعتقد أن المستحضر ليس ناجعا وقد يغيّر علاجك دون الحاجة إلى ذلك.
- **أخبر الطبيب إذا كنت تشعر أن ريڤوتريل لا يساعد في حالتك الطبية.**
- **يجب الحرص على الخضوع لمراقبة طبية متواصلة.**
- **يجب الحرص على أن تكون لديك كمية كافية من المستحضر خلال نهاية الأسبوع أو في الأعياد.**
- **لا يجوز استعمال ريڤوتريل لعلاج حالات طبية أخرى دون تعليمات من الطبيب.**
- **يجب توخي الحذر لدى المسنين، المتعالجين الذين ينتابهم شعور غير جيد بعد استهلاك الكحول أو بعد تناول أدوية أخرى –** قد يشعر بعض المستعملين بأعراض جانبية مثل النعاس، الارتباك، الدوار أو نقص الثبات وقد تزيد هذه الأعراض خطر السقوط. يوصي الطبيب المعالِج بالامتناع عن استهلاك الكحول أثناء العلاج **بريڤوتريل**.

الأطفال والمراهقون

إن أمان ونجاعة **ريڤوتريل** لعلاج نوبات القلق لدى الأطفال دون سن 18 عاما غير معروفَين.

الفحوصات والمتابعة

خلال فترة العلاج **بريڤوتريل**، قد يطلب منك الطبيب إجراء فحوصات دم وفحوصات أخرى بين حين وآخر لفحص تقدمك واكتشاف أعراض جانبية.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنتَ تتناول، أو تناولتَ مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائيّة، أخبِر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- أقراص للنوم، مواد منوّمة أو مهدئة
- أدوية للاكتئاب
- أدوية للصرع
- أدوية للحساسية أو للرشح مثل مضادات الهيستامين
- مُسكّنات الآلام
- مرخيات العضلات
- مواد مخدّرة
- سيميتيدين – دواء يُستعمل لعلاج التقرحات
- ديسولفيرام – دواء يستعمل لعلاج إساءة استعمال الكحول

قد يؤثر **ريڤوتريل** في هذه الأدوية أو قد تؤثر هذه الأدوية في طريقة عمل **ريڤوتريل**. يمكن أن يخبرك الطبيب أو الصيدلي الخاصيْن بك ما الذي عليك القيام به إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، لديهما قائمة أكبر بالأدوية التي تتطلب توخي الحذر أو الامتناع عن تناولها عند تناول **ريڤوتريل**.

إذا لم تخبر طبيبك بكل الأدوية المذكورة أعلاه، أخبره قبل أن تبدأ باستعمال **ريڤوتريل**.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا تستهلك الكحول عندما تتناول **ريڤوتريل**. قد يزيد الكحول تأثيرات **ريڤوتريل** وقد يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة.

الحمل والإرضاع

إذا كانت هناك حاجة إلى تناول **ريڤوتريل** عندما تكونين حاملا، فسوف يتحدث معكِ طبيبك عن المخاطر والفائدة لكِ ولجنينكِ.
إذا كنتِ مرضعة أو تخططين للرضاعة: ينتقل **ريڤوتريل** إلى حليب الأم وقد يسبب النعاس و/أو صعوبات في الرضاعة لدى الطفل. لا يوصى باستعمال **ريڤوتريل** أثناء الإرضاع.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يجوز لك السياقة أو تشغيل الماكينات حتى تعرف كيف يؤثر المستحضر فيك.
قد يؤدي **ريڤوتريل** إلى النعاس أو الدوار لدى بعض المتعالجين، لهذا قد يؤثر في اليقظة.
تأكد من أنك تعرف كيف يؤثر المستحضر فيك قبل أن تقود سيارة أو تشغل ماكينات أو تقوم بأية خطوة أخرى قد تكون خطيرة إذا عانيت من النعاس، الدوار أو من عدم التركيز.
يجب تحذير الأولاد من ركوب الدراجات الهوائية أو اللعب على مقربة من الشارع، وغير ذلك.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسَب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحدّدهما الطبيب فقط.
يمكن تناول **ريڤوتريل** مع طعام أو من دونه.

الجرعة المتبعة في داء الصرع
يجب ملاءمة جرعة **ريڤوتريل** لكل متعالِج على حدة وفق رد فعله السريري، قدرته على تحمّل الدواء، وعمره.

تبدأ جرعة واحدة فموية من **ريڤوتريل** بالتأثير خلال 60-30 دقيقة ويظل هذا التأثير طوال 8-6 ساعات لدى الأطفال و 12-8 ساعة لدى البالغين.

للامتناع عن التعرض لأعراض جانبية عند بدء العلاج، من المهم بدء العلاج **بريڤوتريل** بجرعة منخفضة وزيادة الجرعة اليومية تدريجيا حتى الوصول إلى جرعة الصيانة الملائمة لكل متعالجٍ على حدة.

الرضع والأطفال حتى عمر 10 سنوات (أو حتى وزن 30 كغم): الجرعة الابتدائية هي 0.03-0.01 ملغ لكل كغم وزن الجسم في اليوم، تُعطى من خلال 3-2 جرعات موزعة. الجرعة اليومية القصوى لدى الأطفال هي 0.2 ملغ لكل كغم وزن الجسم ولا يجوز تجاوزها.
الأطفال في عمر 10 حتى 16 عاما: الجرعة الابتدائية هي 1.5-1 ملغ في اليوم، تُعطى في 3-2 جرعات موزعة. يجب رفع الجرعة تدريجيا حتى التوصل إلى جرعة الصيانة الشخصية (عادة 6-3 ملغ في اليوم).
البالغون: لا يجوز تجاوز الجرعة الابتدائية لدى البالغين وهي 1.5 ملغ في اليوم موزعة على 3 جرعات.
جرعة صيانة مقدارها 6-3 ملغ في اليوم تكون كافية عادة. الجرعة العلاجية القصوى للبالغين هي 20 ملغ في اليوم ولا يجوز تجاوزها.

يجب تقسيم الجرعة اليومية إلى 3 جرعات متساوية. إذا لم تُقسم الجرعات بشكل متساو، يجب تناول الجرعة الأكبر قبل النوم. يتم التوصل إلى مستوى جرعة الصيانة بأفضل شكل بعد علاج مدته 3-1 أسابيع. بعد التوصل إلى مستوى جرعة الصيانة، يمكن تناول الكمية اليومية في جرعة واحدة في المساء.

الجرعة المتعبة في نوبات القلق
الجرعة الابتدائية للبالغين الذين لديهم قلق هي 0.25 ملغ مرتين في اليوم (0.5 ملغ في اليوم).

جرعة الصيانة الاعتيادية للبالغين هي 1 ملغ مرتين في اليوم (2 ملغ في اليوم). في حالات شاذة، قد يصف الطبيب جرعة قصوى مقدارها 2 ملغ مرتين في اليوم (4 ملغ في اليوم).

بعد التوصل إلى جرعة ثابتة، يمكن للمتعالجين أن يستبدلوا الجرعة بجرعة واحدة في اليوم، تُعطى قبل النوم عادة.

يجب إيقاف العلاج تدريجيا.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة الاستعمال:
عليك قياس جرعة ريڤوتريل التي تم وصفها على شكل قطرات فقط.
لا يجوز التقطير من القنينة في الفم مباشرة.
بعد كل إعطاء، تأكد من أن القطارة في مكانها في عنق القنينة. يجب إعطاء القطرات بملعقة صغيرة.
بعد كل مرة تفتح فيها القنينة، تأكد من أن القطارة مثبتة في مكانها في عنق القنينة.
يمكن تخفيف مستحضر **ريڤوتريل** بالماء، الشاي أو شراب الفواكه.

يجب متابعة تناول **ريڤوتريل** حتى يطلب منك الطبيب إيقافه. لا يجوز تناول المستحضر لفترة أطول من تلك التي وصفها لك الطبيب.

إذا لم تكن متأكدا فيما عليك القيام به اسأل الطبيب أو الصيدلي.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى
إذا كنت تعتقد أنك أنت أو أي شخص آخر قد تناولتما جرعة مفرطة من **ريڤوتريل**، أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، أخبر طبيبك بذلك فورا أو توجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، مصطحبًا عبوة الدواء معك.
قم بذلك حتى إذا لم تكن لديك علامات عدم الراحة أو التسمم. يُحتمَل أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ.
إذا تناولت كمية أكبر من **ريڤوتريل** فقد تشعر بضبابية، تعب، ارتباك، دوار، صعوبات في التنفس، ضعف أو قد تتعرض لفقدان الوعي.

إذا نسيت تناول الدواء
إذا آن الأوان تقريبا لتناول جرعتك التالية، تخطَّ الجرعة المنسية، وتناول الجرعة التالية في وقتك الاعتيادي. إذا لم يكن الأمر كذلك، تناول الجرعة المنسية فور تذكرك، ثم واصل تناول الدواء كالمعتاد.
لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة تعويضا عن الجرعة المنسية.

يجب المداومة على العلاج تبعا لتوصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

يجب خفض الجرعة أو إيقاف العلاج وفق تعليمات الطبيب وتدريجيا. قد يسبب إيقاف العلاج **بريڤوتريل** فجأة ظهور أعراض غير مرغوب بها. سيشرح لك طبيبك كيف عليك تقليل جرعة **ريڤوتريل** تدريجيا حتى تتمكن من إيقاف استعماله كليا.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوّة الدواء ومن الجرعة الدوائيّة في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظّارات الطبّية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديكَ أسئلة أخرى فيما يتعلّق باستعمال الدواء، استشِر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال **ريڤوتريل** أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدِمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة. فمن المحتمل ألّا تعاني من أيٍّ منها. قد تحتاج إلى علاج طبي إذا شعرت ببعض الأعراض الجانبية.
أخبر الطبيب المعالِج أو الصيدلي في أسرع وقت ممكن إذا شعرت بسوء خلال العلاج **بريڤوتريل**.

يجب التوجه إلى الطبيب فورًا أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب من منزلك إذا شعرت بأحد ما يلي:
- صعوبات في التنفُّس
- قلق أو توتر مفاجئين
- هلوسة أو ذهان
- اضطرابات حادة في النوم

هذه هي أعراض جانبية حادة قد تتطلب علاجا طبيا طارئا. هذه الأعراض الجانبية نادرة.

أخبِر الطبيب إذا اختبرت أحد الأعراض الجانبية التالية:

- نعاس، تعب
- دوخة، نقص الاستقرار
- ضعف العضلات
- رجفة
- فقدان الذاكرة، نقص الانتباه، ارتباك، نقص التركيز
- صداع، شعور بالخُمار (hangover) في الصباح

- كلام غير واضح (كلام غير مفهوم)
- أحلام مزعجة
- خفقان القلب
- تقيؤات

أعراض جانبية إضافيّة:
- نُعاس
- اكتئاب
- دوخة
- عصبية
- ترنح
- فقدان القدرة الذهنية
- تناسق غير سليم
- اضطراب الكلام
- اضطرابات في الذاكرة
- نقص الاستقرار العاطفي
- انخفاض الرغبة الجنسية (libido)
- ارتباك
- عدوى في المسالك التنفسية العلوية
- التهاب الجيوب الأنفية
- التهاب الأنف
- سعال
- التهاب البلعوم
- التهاب الشعب الهوائية
- إمساك
- انخفاض الشهيّة
- ألم في البطن
- تعب
- رد فعل تحسسي
- آلام في العضلات
- إنفلونزا
- تبول متكرر
- عدوى في المسالك البولية
- تشوّش الرؤية
- النساء: آلام الحيض، التهاب في المهبل
- الرجال: تأخر في قذف المني، عجز جنسي
- الجسم عموما: ارتفاع الوزن، حادث، انخفاض الوزن، جرح، وذمة، حمى، قشعريرة، خدوش، وذمة في الكاحل، وذمة في الساق، وذمة حول العينين، نقص الراحة، ألم، التهاب في النسيج تحت الجلد (cellulitis)، والتهاب موضعي.
- اضطرابات في القلب: ألم في الصدر، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف
- اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي: الشقيقة، تنميل، ثمالة، شعور بعدم السيطرة على التبول، شلل نصفي، رجفة، حرقة في الجلد، سقوط، ثقل الرأس، بحة، فرط النشاط، فقدان الإحساس، لسان سميك، وتشنجات.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي: انزعاج في البطن، التهاب في الجهاز الهضمي، اضطراب في المعدة، ألم في الأسنان، تورم، حرقة، فرط اللعاب، اضطرابات في الأسنان، حركة أمعاء متكررة، ألم في الحوض، عسر الهضم، وبواسير
- اضطرابات في السمع والأذنين: دوار، التهاب الأذنين، آلام في الأذنين، داء السفر
- اضطرابات نظم القلب: خفقان القلب
- اضطرابات في الأيض والتغذية: عطش، نقرس
- اضطرابات في جهاز العضلات-الهيكل العظمي: ألم في الظهر، كسر بسبب صدمة، التواء، ألم في الساق، ألم في الرقبة، تشنجات في العضلات، تشنجات في الساق، ألم في الكاحل، ألم في الكتف، التهاب في الوتر، ألم في المفصل، فرط التوتر، ألم في الظهر السفلي (lumbago)، ألم في راحتي القدمين، ألم في الفك، ألم في الركبة، وتورم الركبة
- اضطرابات في جهاز الدم: نزيف جلدي
- اضطرابات نفسية: أرق، إزالة الكبح، قلق، اضطراب تبدد الشخصية، أحلام مبالغ بها، فقدان الرغبة الجنسية (libido)، زيادة الشهية، زيادة الرغبة الجنسية (libido)، انخفاض ردود الفعل، عدوانية، لا مبالاة، اضطراب في التركيز، انفعال، غضب، جوع شاذ، هذيان، كوابيس، اضطراب في النوم، أفكار انتحارية، وتثاؤبات
- اضطراب في الجهاز التناسلي الأنثوي: ألم في الثديين، دورة شهرية غير منتظمة
- اضطرابات في الجهاز التناسلي الذكري: انخفاض قذف المني

- اضطرابات في أجهزة المقاومة: عدوى فطرية، عدوى فيروسية، عدوى المكورات العقدية، عدوى الهربس البسيط، عدوى كثرة الوحيدات العدائية، وداء المبيضات
- اضطرابات في الجهاز التنفسي: فرط العطس، نوبة ربو، ضيق في التنفس، نزيف من الأنف، التهاب في الرئتين، التهاب الجنبة (pleuritis)
- اضطرابات جلد وملحقات الجلد: اندلاع حب الشباب، صلع، جفاف الجلد، التهاب الجلد التماسي (contact dermatitis)، احمرار الوجنتين، حكة، رد فعل قيحي، حروق جلدية، واضطرابات جلدية
- اضطرابات في الحواس: فقدان حاسة التذوق
- اضطرابات في جهاز البول: ألم أثناء التبوّل، التهاب في المثانة ، فرط التبول، عدم السيطرة على التبول، خلل في أداء المثانة ، احتباس البول، نزيف في جهاز البول، وتغيير لون البول
- اضطرابات في الأوعية الدموية: التهاب الوريد الخثاري في الساق (thrombophlebitis)
- اضطرابات في الرؤية: تهيج العين، اضطرابات في الرؤية، رؤية مزدوجة، تقلصات في العين، شحاذ العين، خلل في حقل الرؤية، وجفاف العين

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارِض جانبيّ لم يُذكَر في النشرة، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحّة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحّة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يُخزّن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة والقنينة. تاريخ انتهاء الصلاحيّة يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25^0C. يجب تخزين القنينة بوضعية عامودية.
- يمكن استعمال الدواء حتى 120 يوما منذ فتحه.
- في حالة وجود شكّ، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- تخلص بشكل ملائم من أي دواء غير مستعمل. يُمنع إلقاء الدواء في حاوية القمامة المنزلية أو مياه الصرف الصحي. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية التي لا تحتاجها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافيّة

إضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

peach flavor, saccharin sodium, brilliant blue FCF, acetic acid glacial, propylene glycol.

كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبوة: يسوق دواء **ريڤوتريل** على شكل قطرات صافية، زرقاء، معدّة للابتلاع. تحتوي كل عبوّة على قنينة واحدة فيها 10 ملل من قطرات **ريڤوتريل**.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: تسامال بيو-فارما م.ض.، شارع همچشيميم 20، پيتح تكڤا
اسم المُنتج وعنوانه: تسبلافارم م.ض.، چرايفسفالد، ألمانيا
تم تحريرها في أيار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 061-31-21476-00
لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

RIV_PIL_TZ_08.2021