

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) תשי"מ – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רביף® 22 מק"ג

רביף® 44 מק"ג

תמיסה להזרקה תת–עורית

מזרק מוכן להזרקה

מחסנית להכנסה למזרק אלקטרוני

החומר הפעיל:

אינטרפרון בטא-1a (interferon beta-1a)

כל מזרק מוכן להזרקה של **רביף® 22 מק"ג** הכולל מחט, מכיל: 22 מיקרוגרם (6 מ"ל מיליון יחידות בין-לאומיות [IU]) אינטרפרון בטא-1a 0.5 מ"ל.

התכשיר מכיל 2.5 מ"ג בנזיל אלקוהול.

כל מזרק מוכן להזרקה של **רביף® 44 מק"ג** הכולל מחט, מכיל: 44 מיקרוגרם (12 מיליון יחידות בין-לאומיות [IU]) אינטרפרון בטא-1a 0.5 מ"ל.

התכשיר מכיל 2.5 מ"ג בנזיל אלקוהול.

כל מחסנית של **רביף® 22 מק"ג** המוכנסת למזרק מתאים, מכילה:

66 מיקרוגרם (18 מיליון יחידות בין-לאומיות [IU]) אינטרפרון בטא-1a 1.5 מ"ל.

התכשיר מכיל 7.5 מ"ג בנזיל אלקוהול.

כל מחסנית של **רביף® 44 מק"ג** המוכנסת למזרק מתאים, מכילה:

132 מיקרוגרם (36 מיליון יחידות בין-לאומיות [IU]) אינטרפרון בטא-1a 1.5 מ"ל.

התכשיר מכיל 7.5 מ"ג בנזיל אלקוהול.

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 וסעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק ממרכיבים של התרופה".

- קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
- שמור את העלון בהישג יד, ייתכן שתצטרך לעיון בו שוב.
- אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
- עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה.
- היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא אם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.
- אם אתה חש בתופעות לוואי כלשהן, פנה לרופא שלך. זה כולל כל תופעת לוואי אפשרית שאינה כלולה בעלון זה. ראה סעיף 4.

- למה מיועדת התרופה**

רביף (אינטרפרון בטא-1a) משתייך לקבוצת תכשירים היועדים כאינטרפרונים. אלו הם חומרים טבעיים, שתפקידם להעביר מידע בין התאים.

האינטרפרונים מיוצרים על ידי הגוף ויש להם תפקיד מרכזי במערכת החיסון, הם פועלים על ידי מנגנון שאינו ברור במלואו ומסייעים בצמצום הנזק למערכת העצבים המרכזית הקשורה לטרשת נפוצה.

רביף הינו אינטרפרון - חלבון מטורה במיוחד ומסיס שמוצר בהנדסה גנטית, הוא דומה לאינטרפרון בטא הטבעי שמוצר בגוף האדם. רביף משמש כטיפול בטרשת נפוצה, מקטין את תדירות ההתקפים ועוזעצצמ ומאט את התקדמות המחלה.

רביף 44 מק"ג בלבד מאושר גם לשימוש במטופלים אשר חוו אירוע קליני בודד אשר הינו סימן ראשוני של טרשת נפוצה.

קבוצה תרופטית (סיפולית): מגרי מערכת החיסון - אינטרפרונים.

- לפני השימוש בתרופה**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אינטרפרון בטא טבעי או רקומביננטי או לכל אחד ממרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אתה מצוי בדיכאון חריף ו/או יש לך מחשבות אובדניות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

שוחר עם הרופא שלך, רוקח או אחות לפני השימוש ברביף.

- יש להשתמש ברביף רק תחת השגחת רופא.
- לפני השימוש יש לקרוא בעיון את העלון ולנהוג על פי הוראות השימוש בעלון זה, זאת בכדי לצמצם את הסיכון לנזק באזור ההזרקה (פגיעה בעור וברקמה), כפי שדווח בקבוצת מטופלי ברביף. אם אתה מבחין בתגובות מקומיות מטרידות, יש לפנות לרופא.

- לפני השימוש ברביף, עליך לדווח לרופא שלך או לרוקח אם אתה אלרגי (בעל רגישות יתר) לכל תרופה שהיא.
- אם במהלך הטיפול מופיעים סימנים של טרומבוציטופניה, התפתחות של יתר לחץ דם חדש, חום, תסמינים של מערכת העצבים המרכזית (כגון: בלבול או שיתוק) ופגיעה בתפקוד הכליתי או ממצאים מעבדתיים כגון: ספירת טסיות מופחתת, עלייה ב-LDH, יש לבצע בדיקות נוספות של רמות תסיות, LDH בסרום ובדיקות התפקוד הכליתיי (כל הסימנים הללו יכולים להיות הצגה קלינית של Thrombotic - TMA - היווצרות של קרישי דם בכלי דם קטנים במהלך הטיפול אשר עלולים להשפיע על הכליות שלך). זה יכול לקרות מספר חודשים עד מספר שנים לאחר תחילת השימוש ברביף. אם אתה מפתח סימנים של בצקת, חלבון בשתן (פרוטאינוריה) ובעיות בתפקוד הכליתי, יש לדווח לרופא - ביחוד אם אתה נמצא בקבוצת סיכון גבוה להתפתחות של מחלת כליות (ייתכן שאלו הם סימנים לסינדרום נפרטי ולהפרעות בתפקוד הכליתי).

דווח לרופא אם אתה סובל ממחלות במח העצם, הכליה, הכבד, בלוטות התריס (היתריאיד), אם סבלת **מדיכאון או ממחשבות אובדניות**, אם יש לך רקע של התקפים אפילפטיים, אם אתה נוטל תרופות לאפילפסיה (ביחוד אם האפילפסיה לא מוזנחת), או אם אתה סובל ממחלת לב (אנגינה, כשל לבבי או הפרעות קצב), כל זאת בכדי שהרופא ידאג לעקוב ולנטר את הטיפול כך או בהממרה על מצבים אלו.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה נוטל, נטלת לאחורנה או עשוי ליטול תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד עליך לדווח לרופא אם אתה משתמש בתרופות נגד דיכאון או נגד אפילפסיה.

היריון והנקה

אם את בהריון, חושבת שייתכן שאת בהיריון או מתכננת להכנס להיריון, שאלו את הרופא או הרוקח לפני נטילת התרופה.

לא צפויה השפעה מזיקה על התינוק הינוק. ניתן להשתמש ברביף בזמן הנקה.

נהיגה ושימוש במכוונת

השימוש בתרופה או מצב מחלתך עלולים להשפיע על כושרך לנהוג או להפעיל מכוונת. במקרה של חשש יש להתייעץ עם הרופא.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מיליומול נתרן (23 מ"ג) למנה, זה מוגדר כ- "נטול נתרן".

תרופה זו מכילה 2.5 מ"ג בנזיל אלקוהול למנה. בנזיל אלקוהול עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

בנזיל אלקוהול נמצא קשור לסיכון לתופעות לוואי חמורות כולל בעיות נשימה (הנקראות "Gasping syndrome") בילדים צעירים.

אין להשתמש במשך יותר משבוע בילדים צעירים (מתחת לגיל 3), אלא אם הומלץ על ידי הרופא או הרוקח.

פנה לרופא או לרוקח אם אתה סובל ממחלות כבד או כליות, או אם את בהריון או ממקה. זאת מאחר שכמויות גדולות של בנזיל אלקוהול יכולות להצטבר בגוף שלך ועלולות לגרום לתופעות לוואי (הנקראות "מחצת מטבולית").

- כיצד תשתמש בתרופה**

התרופה במזרק המוכן להזרקה הינה לשימוש חד פעמי.
התרופה ממחסנית הינה לשימוש חד פעמי.

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך כטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול. מינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל זה:
מטופלים אשר חוו סימן קליני בודד
המנה המומלצת הינה 44 מיקרוגרם (12 מיליון יחידות בין-לאומיות) הניתנת 3 פעמים בשבוע.
מטופלים אשר חולים בטרשת נפוצה
המנה המומלצת הינה 44 מיקרוגרם (12 מיליון יחידות בין-לאומיות) הניתנת 3 פעמים בשבוע.
מנה מופחתת של 22 מיקרוגרם (6 מיליון יחידות בין-לאומיות) הניתנת 3 פעמים בשבוע, מומלצת במטופלים שאינם סובלים את המנה הגבוהה יותר.

יש להזריק רביף 3 פעמים בשבוע במידה וניתן:

- בשלושה ימים קבועים בשבוע (במרווחים של לפחות 48 שעות לדוגמא: ראשון, שלישי, חמישי)
- באותה שעה (עדףי בערב)

אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש בילדים ובמתבגרים (ביליאי 17–2 שנים)

לא נערכו ניסויים קליניים רשישים בילדים ובמתבגרים. אך ישנם נתונים קליניים המצביעים על כך שפופולרי הבטיחות בילדים ובמתבגרים שמקבלים רביף 22 מיקרוגרם או רביף 44 מיקרוגרם שלוש פעמים בשבוע דומה לזו שראה במתבגרים.

שימוש בילדים (מתחת לגיל שנתיים)

רביף אינו מומלץ לשימוש בילדים מתחת לגיל שנתיים.

אופן השימוש:

- רביף מיועד להזרקה תת-עורית.
- יש לבצע את ההזרקה הראשונית בנוכחות איש צוות רפואי.
- לאחר שאתה, בן משפחה, חבר או מטפל שלך קיבלת הדרכה מתאימה על השימוש במזרק רביף או במחסנית רביף שיש להכניסה למזרק המתאים, ניתן יהיה לבצע את ההזרקה של התכשיר בבית.

רביף מוגש:

- כמזרק** ממוזל בתמיסה, מוכן להזרקה, למזרק מחוברת מחט המיועדת להזרקה עצמית תת-עורית (מתחת לעור). מזרק זה מיועד לשימוש חד פעמי. ניתן לשימוש גם עם מזרק עזר (רביג'קט).
- כמחסנית** שיש להכניסה לבאביר שהינו מזרק אלקטרוני בשם רביסמארט המיועד למחסנית, להזרקה עצמית תת-עורית.
- התייעץ עם הרופא שלך, מהי צורת הרביף המתאימה לך.

הוראות שימוש ברביף, יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש הבאות:

- מחסנית רביף – יש לעיון בהוראות השימוש המלאות המצורפות עם המזרק האלקטרוני רביסמארט, עקוב אחרי הוראות אלו בהירות**
- רביף במזרק מוכן להזרקה – הוראות לפינך בעלון זה**

לפני הזרקה

- רחץ את ידך היטב עם מים וסבון.
- הוצא את מזרק או מחסנית הרביף מאריזתם על ידי קילוף הכיסוי הפלסטי.

- בדוק (מיד לאחר ההוצאה מהמזרק) שמזרק הרביף או המחסנית לא קצא באריזות או במכשיר. יש להשתמש רק בתמיסה צלולה ללא חלקיקים וולא סימני פגיעה נראים.

עקוב אחרי הוראות השימוש.

היכן להזריק רביף

- בבד** אזור הזרקה. הרופא שלך יציע לך אזורי הזרקה אפשריים (אזורים מומלצים כוללים את החלק העליון של הירך ואת הבטן התחתונה).
- אחוז את המזרק כפי שמחזיקים עפרון. מומלץ לערוך רישום של אזורי ההזרקה ולהחליפם בסבב, כדי לא להזריק לעתים תכופות מדי באזור אחד וזאת כדי למנוע את הסיכון לנזק באזור ההזרקה.
- העבר:** אל תזריק באזורים בהם ניתן לחוש בגושים נפיחות מקומית או בכאב. שוחח עם הרופא או עם האחיות, אם אתה מגלה אזורים כאלה.
- לפני הזרקה,** השתמש בספוגית אלקוהול **לפינך** העור באזור ההזרקה. תן לעור להתייבש. אם נשאר אלקוהול על העור אתה עלול לחוש צריבה.

הוראות הזרקה במזרק מוכן להזרקה

- יש לזבזב את העור שמסביב לאזור בעדינות (כדי להגביה אותו מעט), ראה איור מס' 1.
- כאשר שורש קר יך מונח על העור, קרוב לאזור ההזרקה, החדר את המחט בזווית ישרה אל תוך העור בתנועה מהירה וחזקה, ראה איור מס' 2.
- הזרק את התרופה על ידי דחיפה איטית ויציבה (דחוף את הבוכנה ביניהם עד שהמזרק מתרוקן), ראה איור מס' 2.
- לחץ בעזרת הספוגית על אזור ההזרקה. הוצא את המחט מהעור.
- יש לעסות בעדינות את אזור ההזרקה עם ספוגית צמר גפן או גזה יבשה.
- יש להשליך את כל הפריטים: לאחר שסיימת את ההזרקה, יש להשליך מיד את המזרק למקום מתאים. את המחט יש להשליך לתוך כלי איסוף.

אם נרשם לך שימוש במחסנית, יש להחדיר אותה למכשיר ההזרקה האלקטרוני רביסמארט לפי ההוראות המצורפות למכשיר ההזרקה.

בדיקות ומעקב

בתקופת הטיפול ייתכן שתידרש לערוך בדיקות דם, תפקודי כבד, תפקודי כליה ותפקודי בלוטת התריס (ראה גם סעיף 2).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

במקרה כזה יש להמשיך בהזרקה מהיום הבא של מנת הטיפול המתוכננת לפי המשטר הטיפולי. אין להזריק מנה כפולה כדי להשלים את המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

ייתכן שלא תחוש בהשפעה של רביף באופן מיידי. לכן, אל תפסיק להשתמש ברביף, אלא המשיך להשתמש בהמשך בכדי לקבל את התוצאה הרצויה. אם אתה מודאג בנושא, פנה לרופא. אין להפסיק את הטיפול מבלי להיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב כשפסיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

- תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ברביף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

פנה מיד לרופא שלך והפסק להשתמש ברביף אם אתה מבחין בתופעות לוואי אלה:

- תגובות אלרגיות (רגישות יתר) חמורות.** אם מיד לאחר נטילת מנת רביף, אתה חש בקשיי נשימה פתאומיים שייכתן שיהיו מלווים בנפיוחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון, פריחה בעור (סרפדת), גרד בכל הגוף, חולשה או עיelfון, עליך לפנות מיידית לרופא או לחד מרכז רפואי למצבי חירום. תופעות אלו נדירות (עלולות להתרחש אצל עד 1 מתוך 1,000 משתמשים).
- עליך לדווח מיידית לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים של **בעיות בכבד:** אהבת (הצהבה של העור או של לובן העיניים), גרד מפושט, איבוד תיאבון המלווה בבחילה והקאות וחבלות בעור. בעיות חמורות בכבד יכולות להיות קשורות לסימנים נוספים כגון: קשיי ריכוז, ישנוניות ובלבול.

- דיכאון** (עלול להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים) מטופלים עם תשעות נפוצה. **אם אתה מודאג או מפתח מחשבות אובדניות,** פנה מיד לרופא!

פנה לרופא אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

- תסמינים הדומים לשפעת,** כגון: כאב ראש, חום, צמרמורת, כאבי שרירים ומפרקים, עייפות ובחילה, הינם מאוד שכיחים (עלולים להתרחש אצל יותר מ- 1 מתוך 10 משתמשים).
- תופעות אלו הן לרוב מתונות, שכיחות יותר בתחילת הטיפול ופוחתות בהמשכו. כדי להפחית תסמינים אלו, ייתכן שהרופא ייעץ לך ליטול תרופה להורדת חום ולושיכר כאבים לפני התחלת ההזרקה של רביף ובמהלך 24 שעות לאחר כל הזרקה.
- תגובות במקום ההזרקה** העלולות: אדמומיות, נפיחות, שינוי צבע, דלקת, כאב וסדקים בעור, מאוד שכיחות. התרחשוות של תגובות אלו במהלך ההזרקה בדרך כלל פוחתות עם הזמן. נזק לקרמה (מקל, כיבים וגושים במקום ההזרקה) אינם שכיחים (עלולים להתרחש אצל עד 1 מתוך 100 משתמשים).
- ראה המלצות בסעיף "אזהרות ואמצעי זהירות הנוגעים לשימוש בתרופה" על מנת להקטין את הסיכון של תגובות במקום ההזרקה.

במקרים מסוימים מקום ההזרקה מזההם (לא שכיח), העור במקום הופך להיות נפוח, רגיש, קשה ומאוד כואב. במקרים אלו עליך לפנות לרופא.

- ייתכנו שינויים במספר תוצאות של **בדיקות מעבדתיות,** שינויים אלה בדרך כלל אינם מורגשים על ידי המטופל מכיוון שהם אינם מלווים בתסמינים ולרוב הנימ מתונים וחולפים ואינם דורשים טיפול מיוחד, כגון: ירידה במספר כדוריות דם אדומות, כדוריות דם לבנות או גססיות הדם, כל אחד בנפרד (מאוד שכיח) או כולם ביחד (נדיר). ייתכנו תסמינים כתוצאה משינויים אלו, כגון: עייפות, ירידה ביכולת הליכהים ביוזום, חבלות או דימום ליד מסגרב, הפרעות בתוצאות תפקודי כבד (מאוד שכיח). דווח גם על דלקת בכבד (לא שכיח). אם מופיעים תסמינים מעדיים על הפרעה בתפקוד הכבד, כגון: אובדן תיאבון מלווה בחילה, הקאה, אהבת, פנה מיד לרופא. ראה למעלה בסעיף "פנה מיד לרופא שלך..."

- אי תפקוד בלוטת התריס (יתריאיד)** (לא שכיח). בלוטת התריס יכולה להפחית ביתר או בתת פעילות. שינויים אלו ותסמיניהם לרוב אינם מורגשים על ידי המטופל, הרופא שלך ימליץ לך על הבדיקות המתאימות.
- דמוי התקף של טרשת נפוצה** (השכיחות לא ידועה). ייתכן שעם תחילת הטיפול עם רביף תחוש בתסמינים המדמים התקף של טרשת נפוצה. לדוגמא, תחוש בשרירים מאוד מתוחים או חלשים, מה שימנע ממך תנועה בהתאם לדמיון. במספר מקרים תסמינים אלו קשורים עם חום ותסמינים רצוניים שפעת כפי שתוארו מעלה. אם אתה מבחין בתופעות אלו יש לדווח לרופא.

תופעות לוואי אחרות אפשריות:

שכיחות מאוד (עלולות להתרחש אצל יותר מ- 1 מתוך 10 משתמשים): כאב ראש.

שכיחות (עלולות להתרחש אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים): קשיי שינה, לשלשל, בחילה, הקאות, גרד, פריחה בעור (תגובות עוריות), כאב שרירים ומפרקים, עייפות, חום וצמרמורת, אובדן שיער.

לא שכיחות (עלולות להתרחש אצל עד 1 מתוך 100 משתמשים): סרפדת, התקפים אפילפטיים, דלקת בכבד (צהבת), קשיי נשימה, קרישי דם כמו פקקת (טרומבוזיס) בוורידים העמוקים, הפרעות ברשתית העין (מאחורי העין) כגון: דלקת או קרישי דם הגורמים להפרעות בראייה (קשיי ראייה) או אובדן ראייה), הזעה מוגברת.

נדירות (עלולות להתרחש אצל עד 1 מתוך 1,000 משתמשים):

ניסיון אובדני, תגובות עור חמורות - חלקן עם נגעים יריים, היווצרות קרישי דם בכלי דם קטנים שעלולים להשפיע על הכליות שלך (ארגמנת של קרישה וחסר טסיות - Thrombotic thrombocytopenic purpura או תסמונת המוליטית אורמית - Haemolytic uremic syndrome - הפרעה שיתיתן שנתגבטט בקרישי דם קטנים). התסמינים יכולים לכלול עלייה בחבלות, דימום, ירידה בטסיות, אנמיה, חום, חולשה קיצונית, כאב ראש, סחרחורת ותחושת עיelfון. הרופא שלך יכול להבחין בשינויים בדם שלך ובתפקודי הכליות.

תופעות לוואי נדירות כוללות את הסינדרום הנפרוטי וגלומרולוסקלרוזיס.

זאבת אדמונית מושרית תרופה: תופעת לוואי המתרחשת כתוצאה משימוש ארוך טווח ברביף. התסמינים יכולים לכלול: כאבי שרירים, כאבי מפרקים ונפיחות, ופריחה. אתה עלול לחוות תסמינים אחרים כגון: חום, אובדן משקל ועייפות. לרוב התסמינים נעלמים במהלך שבוע עד שבועיים לאחר הפסקת הטיפול.

בעיות בכליות כולל צלקות שעלולות להפחית את תפקודי הכליה. אם אתה חש חלק מתסמינים אלו או את כל התסמינים: שתן קצפי, עייפות, נפיחות - במיוחד בקרסוליים ובעפעפיים ועלייה במשקל, דווח לרופא שלך כיוון שאלו עלולים להיות סימנים לבעיות כליה.

תופעות הלוואי הבאות דווחו עבור אינטרפרון בטא בשכיחות אל ידועה: סחרחורת, עצבנות, אובדן תיאבון, הרחבת כלי הדם ודפיקות לב, שינויים במחזור החודשי, יתר לחץ דם ריאתי, עורק כללי הדם בריאות הגורמת ליתר לחץ דם בכלי הדם המובילים דם מהלב לריאות. יתר לחץ דם ריאתי עורקי נראה במספר נקודות זמן שונות במהלך הטיפול, כולל מספר שנים לאחר תחילת הטיפול ברביף, דלקת של רקמת השומן מתחת לעור (פניקוליטיס) אשר יכולה לגרום לעור להרגיש קשה וייתכן שיתפתחו גושים או כתמים אדומים וכואבים.

אין להפסיק או לשנות את התרופה ללא המלצת הרופא.

אם פועיקה תופעת לוואי, או אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ילדים ומתבגרים

תופעות לוואי אצל ילדים ומתבגרים דומות לאלו שנצפו במבוגרים.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי. נמנעא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il/

- אין לאחסן את התרופה**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סודי מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אין לגנוב להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

מזרק מוכן להזרקה

יש לאחסן את התרופה במקרר, בטמפרטורה בין 2°C–8°C, זהו טווח הקירור במקרר ביתי. אין להקפיא! (כדי למנוע הקפאה, הימנע מאחסון סמון למקפיא).

מחסנית להכנסה למזרק אלקטרוני

מכשיר הזרקה אשר מכלי מחסנית של רביף (רביסמארט) חייב להיות מאוחסן בקופסת המכשיר במקרר בטמפרטורה של 2°C–20°C. אין להקפיא! אין לשמור אותה במקרר בסמון למקפיא. זאת כדי למנוע אפשרות של קיפאון. אחרי הזרקה ראשונה של רביף במחסנית יש להשתמש בתוך 28 יומי.