

# ريسيپيردال كونستا™ 25 ملخ ريسيپيردال كونستا™ 37.5 ملخ ريسيپيردال كونستا™ 50 ملخ

مسحوق لمعلق ذو تحريك مطول للحقن داخل العضل  
المادة الفعالة وكيفيتها:

ريسيپيردال كونستا 25 ملخ يحتوى:

ريسيپيردون 25 ملخ قنبلة

ريسيپيردون 37.5 ملخ يحتوى:

ريسيپيردون 37.5 ملخ / قنبلة

ريسيپيردون 50 ملخ يحتوى:

risperidone 25 mg/vial

risperidone 37.5 mg/vial

risperidone 50 mg/vial

المركيبات غير الفعالة ومواد الحساسية في المستحضر - انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استخدامك للدواء.  
تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي، وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك، لا تعطى للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

## تحذير: زيادة في الوفيات لدى المرضى المسنين الذين يعانون من الخرف المتعلق بالذهان

إن البعض من المسنين الذين يعانون من الخرف المتعلق بالذهان والذين يخضعون لعلاج بأدوية مضادة للذهان معروضون لخطورة أكبر لحدوث وفاة، إن رسيپيردال كونستا غير مصادق عليه لمرضى يعانون من الخرف المتعلق بالذهان.

### 1. لا يُغَرِّرُ مُخْصِصُ الدَّوَاء؟

لعلاج مرض انصمام الشخصية، لمعالجة الإضطرابات الفاصمية العاطفية والإضطراب الثنائي القطب.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الذهان اللانمطية.

### 2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز استعمال المستحضر إذا:

كانت حساساً (الergic) لل المادة الفعالة (ريسيپيردون) أو للمستقلب الخاص بها (الباربيورتون) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6).

رودوف فلتر طرد الماء، دواء يستعمل بشكل خاص لمعالجة ضغط الدم، يحظر بشدة على الأدوية.

على جواز استعماله، إن رسيپيردون والبيبريدون.

لم يتم اختيار رسيپيردال كونستا في التجارب السريرية لدى الأطفال والمسنين دون عمر 18 سنة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

لقد أبدت الأبحاث لدى المرضى المسنين الذين يعانون من الخرف أن تناول رسيپيردال بحد ذاته أو مع فوروسيميد، دواء لمعالجة ضغط الدم، يحظر بشدة حالات من الوفاة بشيك.

الطبيب إذا أبدت تناول فوروسيميد، دواء لمعالجة ضغط الدم، معه مشكلة مشكلة معينة في القلب أو الأدوية التي يتناولها.

ريسيپيردال كونستا غير موصى عليه للإستخدام لدى المسنين الذين يعانون من الخرف، ولديه المرضى المسنين الذين يعانون من الخرف، الذي يحظر تناوله.

ما يقتضي في الحالات القلبية أو ضغط الدم، على الأدوية التي يتناولها.

فورياميل، لعلاج إرتفاع ضغط الدم و/أو نظم قلب غير اعتيادي.

سيرتالين وفلوكوكسامين، لعلاج الإكتئاب وإضطرابات نفسية أخرى.

إذا بدأ أو توقف عن تناول هذه الأدوية من الجائز أن تناوله.

يعمل على تناوله.

إذا بدأ أو توقف عن تناوله.

إذا بدأ أو