

هالدول™ ديكانوس

محلول للحقن داخل العضل

كل ملليليون على:

Haloperidol 100 mg (equivalent to 141.04 mg haloperidol decanoate)

المواد غير الفعالة ومواد التحسين: ديكانوس

ظهور خرائط دوائية في الرجال أو النساء

بمستحضرات لعلاج القصص

مشكل في القلب، تباطؤ نظم نبضات القلب، تناول أدوية لعلاج ضربات القلب

أو إذا وجدت ساقية ملائكة لمشاكل في القلب، وفاة أحد أفراد عائلتك القرية

يشكل فجأة نتيجة مشاكل في القلب.

كت تغافل عن معرفة أو تجاهل عن الأعراض

الطبيب أو الصيدلي.

وتفصيل هذا الدواء، لا تعطيه لآخر فهو قد يضرهم حتى ولو

الدواء غير مخصص للأطفال.

1 لأي غرض مخصوص الدواء؟

علاج داعم لدى مرضى القصص.

الفصيلة العلاجية: مضاد للذهان من فصيلة البوتيروفينونات.

2 قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو لكل واحد من المركبات الإضافية

التي تحتويها الدواء.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل غير اعتيادي.

كنت تعاني من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة (Lewy body dementia).

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Progressive Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

كان لديك قصور ليوي أو عانيت من نوع قلبية مؤخراً.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اضطرابات في النظم أو نظم قلب

بطيء، صورة خارقة.

كنت تتناول أدوية معينة التي تؤثر على نظم القلب.

كان لديك نسبة متضخنة من البوتاسيوم في الدم لم يتم معالجتها.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مoxa، أو موية أخرى بما في ذلك أدوية

بدون وصفة طبية، وأضفافات غذائية، إحدى للطب أو الميدالي عن ذلك.

تناولها كافية مع الدار (أظرف) (التفاعلات بين الأدوية).

لا يجوز إستعمال الدار إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج:

مشكل في نظم القلب لديك (مثل أميدورون، ديفينيد، ديسوپيراميد،

إيلوك، إذا متن واقتصر، استشر الطبيب قبل إستعمال المستحضر.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدار

أعراض جانبية خطيرة

قد يسبب الدار ديكانوس مشاكل في القلب، مشاكل في التحكم على حرارات

الجسم أو اضطرافات على عرض جانبي خطير يسمى "متلازمة مضادات الذهان

الخطيبة". يمكن أن يسبب الدار ديكانوس أيضاً ردود فعل تحسسية شديدة

وخدرات دموية. يجب أن تكون على درجة بالاعتراض الجانبية الخطيبة أثناء

استعمال الدار لأنك قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل. انظر "الأعراض الجانبية

الخطيبة" في الفقرة 4.

الأعراض المสอน والأشخاص المصابون بالخرف

تم التبليغ عن زيادة في حالات الوفاة والسكنة المائية لدى الأشخاص

المسنين المصابين بالخرف الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان.

لا يجوز إستعمال الدار بدون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

خوارط دموية، أو إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني أو عانى من هذه المشكلة.

ظهور خرائط دوائية في الرجال أو النساء

بمستحضرات لعلاج القصص

مشكل في القلب، تباطؤ نظم نبضات القلب، تناول أدوية لعلاج ضربات القلب

أو إذا وجدت ساقية ملائكة لمشاكل في القلب، وفاة أحد أفراد عائلتك القرية

إقرأ النشرة بتعمق حتى تهياها قبل إستعمال الدار. تحتوي هذه النشرة

على معلومات موجزة عن الدار، إذا توفر لديك أسلطة إضافية، توجه إلى

الطبيب أو الصيدلي.

وصف الدار الدار الأدوية العلاج مرخص. لا تعطيه لآخر فهو قد يضرهم حتى ولو

الدواء غير مخصص للأطفال.

3 قبل إستعمال الدار

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعاني من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Progressive Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة (Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعانين من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعانين من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعانين من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعانين من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعانين من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعانين من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر

طبيب أو الصيدلي قبل تناول الدار ديكانوس.

لا يجوز إستعمال الدار إذا:

كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعلة أو المركبات الإضافية

التي تحتويها الدار.

كنت أقل دراً بالأشياء من حولك أو ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل

غير اعتيادي.

كنت تعانين من باركنسون.

كانت تعانين من الخرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Lewy body dementia).

كانت تعانين من الخرف مع أجسام ليوي

الفحوص والتابعة

كان لديك مرض ضعي ضموري في الدماغ -

Supranuclear Palsy (PSP).

كان لديك متلازمة إبطالية مقطط QT، أو أي مشكلة

أخرى في نظم القلب التي تظهر كتجدد شاذة في تحفيظ ECG (تحفيظ

كهربائي القلب).

إذا متن واقتصر إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تنطبق عليك، استشر