

סלאטאק ג'ל

הרכב:

חומצה סליצילית 12%, חומצה לקטית 4%
Salicylic acid 12%, Lactic acid 4%

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר:
ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (הסימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים אחרי 12 שבועות.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להסרת יבלות וירליות, יבלות והתקשיות עור בצורת יבלות. החומרים הפעילים גורמים לריכוך ולהמסת העור הקרני של היבלת.

קבוצה תרפויטית: שילוב קרטוליטי של חומרים פעילים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) למרכיבים הפעילים (חומצה סליצילית, חומצה לקטית) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה רשימת המרכיבים הבלתי פעילים בסעיף 6).
- אין להשתמש על או בקרבת הפנים, בית שחי, שדיים, הישבן ובאזור אברי המין.
- אין להשתמש על כתמי לידה, שומות, יבלות שעירות או על כל כתם אחר.
- אין להשתמש בתרופה אם הנך חולה סוכרת או סובל מאספקת דם ירודה לכפות הידיים והרגליים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם אתה לא בטוח שיש לך יבלת שמתאימה לטיפול באמצעות סלאטאק ג'ל, שאל את הרופא או הרוקח לפני תחילת הטיפול.
- יש למרוח את הג'ל בזהירות רק על היבלת באמצעות לחיצה על השפופרת בעדינות:
 - יש להימנע ממגע הג'ל בעור בריא המקיף את היבלת, במיוחד בעור העדין של ילדים צעירים מכיוון שעלול להיגרם גירוי. אם הג'ל נוגע בטעות בעור בריא יש לנקות עם טישו באופן מיידי ובמידת הצורך לשטוף את האזור.
 - אל תשתמש בכמות רבה מדי של הג'ל.
- יש להימנע ממגע עם העיניים, אף, פה, עור פצוע, חתכים ושריטות. אם הג'ל נכנס בטעות לעיניים או לפה עלול להיגרם נזק. יש לשטוף את העיניים או הפה בהרבה מים. אם שוטפים עין אחת, הקפד להימנע מכניסת מי השטיפה לתוך העין השנייה. אחר כך פנה לטיפול דחוף בבית החולים.
- הימנע משפיכה של החומר משום שעלול להיגרם נזק לך, לבגדיך ולרכושך:
 - אל תקפל את השפופרת כי זה עלול לפגוע בה ולגרום לה לדלוף.
- התרופה הינה נדיפה ודליקה מאוד. אין להשתמש בתרופה סמוך ללהבות או למקורות הצתה (כגון סיגריות דולקות או כל דבר אחר שעלולה להתרחש בו הצתה).
- יש להימנע משאיפת התכשיר. במידה ונשאפה כמות של החומר עלולה להיגרם תחושה של קלות דעת, יש לשאוף הרבה אוויר צח.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. לא ידוע כי תכשיר זה משפיע או מושפע מתרופות אחרות.

היריון, הנקה ופוריות:

ניתן להשתמש בתרופה זו במהלך ההיריון ובעת ההנקה. מרכיבי התרופה נמצאים בשימוש נרחב בתכשירים אלו ודומים להם מזה שנים רבות, ללא דיווחים על בעיות. יחד עם זאת, ניסויי בטיחות לא נערכו.

נהיגה ושימוש במכוונות:

לא ידוע כי שימוש בתכשיר זה משפיע על היכולת לנהוג או על השימוש במכוונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אופן השימוש:

כיצד יש לטפל ביבלת ובהתקשות עור בצורת יבלת?

1. הסר כל אגד מדבק.
2. רחץ את האזורים הנוגעים, השרה במים חמים למשך 2-3 דקות.
3. יבש את האזור היטב במגבת האישית שלך.
4. מרח 1-2 טיפות מהג'ל ישירות על היבלת. המתן עד להיווצרות קרום על היבלת. הקרומ יופיע תוך פרק זמן קצר לאחר התייבשות החומר. שים לב ומנע את מגע הג'ל עם העור שמסביב ליבלת. אין צורך לכסות באגד מדבק.
5. הסר למחרת בערב בזהירות את הקרומ שנוצר מהטיפול בערב הקודם. חזור שנית על הטיפול.
6. אחת לשבוע לפני הטיפול שפשף בעדינות את האזור המטופל על-ידי שימוש בפצירת הציפורניים המצורפת לאריזה או באבן ספוגית, ואחר כך המשך בטיפול.

זכור: יש להתמיד ולהשתמש בסלאטאק ג'ל עד להיעלמותן המוחלטת של היבלות.

מהי תדירות הטיפול בסלאטאק ג'ל?

יש להשתמש בסלאטאק ג'ל באופן עקבי פעם ביום, בדרך כלל בערב לפני השינה, עד לריפוי הסופי.

הסרת יבלות וירליות יכולה להימשך עד 12 שבועות.

הערה: לפני פתיחת השפופרת, החזק אותה במצב אנכי עם הפתח למעלה למשך 30 שניות. פתח את המכסה, הפוך אותו ונקב באמצעות את פתח השפופרת. הוצא מהקופסה את המכסה הנוסף בעל הפיה המוארכת וסגור באמצעותו את השפופרת היטב.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שים לב:

- אין לבלוע!

- תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם שכחת ליטול את התרופה:

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסלאטאק ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

בעת השימוש בסלאטאק ג'ל אתה עלול להרגיש תחושת עקצוץ קלה ו/או רגישות קלה באזור המטופל. תחושה זו הינה בדרך כלל זמנית, ובמקרים נדירים עלולה להופיע כפגם זמני בעור.

אם בטעות התאפשר לג'ל להתפשט ולהישאר במגע עם אזורים של עור בריא (ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בסעיף 2), עלול להיגרם גירוי.

שפיכה של התרופה על בגדיך, בדים, תכשיטים, מתכות או משטחים מלוטשים, עלולה לפגוע בהם לצמיתות.

הפסק את השימוש וספר לרופא או לרוקח:

- אם אתה חש אי-נוחות בלתי נסבלת או אם הגירוי מתמשך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה ועל גבי התווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאינן נדרשות עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

תנאי אחסון:

אין לאחסן מעל 25°C.

זהירות! חומר דליק, הרחק מאש! ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בסעיף 2.

יש לסגור היטב את השפופרת באמצעות המכסה, עם סיום השימוש.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Ethyl acetate, Ethanol, Pyroxilin, Camphor.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

ג'ל שקוף, חסר צבע.

התרופה משווקת בשפופרת המכילה 8 גרם של ג'ל. לשפופרת יש מוליך מיוחד. כל אריזה כוללת גם פצירה לציפורניים.

בעל הרישום: תרופא רשמי שיווק 1985 בע"מ, פארק תעשיות פולג, ת.ד. 8105, א.ת. דרום נתניה.

יצרן: מעבדות דרמל בע"מ, גוסמור הרטס, אנגליה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 053-62-26348

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך במרץ 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.