

מונופרט®

טבליות מצופות

החוואר הפעיל ומומטו ביחידת מינון:

כל טבליה מצופה מכילה:
2.8 מ"ג מיוטיב שמשורש הצמח קוהוש שחור (Black cohosh)
נוזל המיצוי: 58% אטנול בנפח.

Each film-coated tablet contains:

Dry extract from Cimicifuga rhizome (Black cohosh) (5-10:1) 2.8 mg

Extraction solvent: ethanol 58% (V/V)

רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתוופה – ראי סעיף 6.
למידע חשוב על חלק מהמרכבים של התוופה – ראי סעיף 2.

קראי בעזין את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתוופה.

עליז זה מכל מדע תמציתוי על התוופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנו אל הרופא או אל הרוקח.
עליז ליטולת התוופה מנופרט על פי ההוראות בערך המופיע בעלון זה. היועץ ברוקח אמר הנר' דקוקה למידע נוסף. עלייך פנותו לרופא ותסמניו המכלה (סימפטומרים) מחומרים או אינם משתפרים לאחר 6 שבועות של שימוש בתוופה.

1. ומה מיועדת התוופה?

נכשיר פוא' ממילוי צמחיי המיפוי לנשים מבוגרות להקלת תסמיini גיל המעבר כדוגמת גלי חום והזעת יתרה.
קבוצה תרפואיית: קוהוש שחור.

2. לפני שימוש בתוופה:

א אין להשתמש בתוופה:

- אם את רגישה (אלרגיה) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילו התוופה.
- במקרה שאתה סובלת או סבלת בעבר מഫראעות בתפקודו הכבד.

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתוופה:
ב לא לידיע את השימוש בתוופה ולפנות לרופא באופן מיידי במחלה, הצבהה של גוון עור או העיניים, כאב חמור ברום הבطن מלאה בחילה

(עיפויות לא שגרתיות, חום או ייאבן), ריריה במישקן, הצבהה של גוון עור או העיניים, כאב חמור ברום הבطن מלאה בחילה והקאה, שלשלולים או נתן כהה).
- מופיע דימום וגינלי או ב מידת ואחריו תסמיינים חדשים או לא בரורים.
- טופלת בעבר או/non לטיפולית עתת בתרופות ננד סרטן השד או ננד גידול אחר תליי הורמוניים.
- את מטופלת בתרופות המכילות אסתרוקן.

ג ילדות ומתבגרות
אין להשתמש בתוופה מנופרט בילדים ובൺגרות מותבגרות.

ד בדיקות ומעקב:
יתכן שהרופא המטפל יפנה אותך לבדיקות מעקב אחר תפקודו כבד.

ה אין נראקציות בין תרופתיות:
אם את לךחת או אם לךחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מדוזן, ספרי על כך לרופא או לרוקח.

לא דוחה עד כה על אינטראקציות בין התוropaה מנופרט לבין תרופות אחרות ולא בוצעו מחקרים לבדיקת אינטראקציות עם תרופות אחרות.

■ שימוש בתוropaה ומזהן: אין מידע לגבי השפעת מזהן על השימוש בתוropaה.

■ הרין והנקה:
הרין: השימוש בתוropaה מנופרט במהלך הרין אינו מומלץ. מאוחר ונitin לעדין להרות במיידת ואת חוהה תסמנית גיל מעבר, מומלץ להמשך ולחשתמש באמצעות המשך השימוש בתוropaה.
הנקה: מאוחר ולא-ידע באם החומר הפעיל מופרש בלבד האם, אין ליטול את התוropaה מנופרט אם את מניקה. אם את בהרין, מניקה או חושבת שתאת בהרין, היועץ ברופא לפני השימוש.

■ נגיגה ושימוש במכוונות: לא נרכזו מחקרים להערכת השפעת התוropaה על יכולת הנרגה או הפעלת מכונות.

■ מידע שוב על חלק מהתרכיבים של התוropaה: התוropaה מנופרט מכילה לקטוז. אם נמסר לך על ידי הרופא או אם ידעת כי הינך סובל מוגזחות לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני השימוש בתוropaה.

3. כיצד תשתמש בתוropaה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעיטה בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתוropaה.
המינון המקבול בדרך כלל הוא:
טבילה מצוחה אחת, פעמיים ביום, בבוקר ובערב (מינון מקסימלי של 2 טבליות מצוחות ביום).
אין לעורר על המונולצת.

marsh הטיפול בתוropaה:

אם התסמנים שיר לא משתפרים במהלך השימוש בתוropaה, יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח.
אין להשתמש בתכשיר לתקופהמושחת יותר מ- 6 חודשים ללא התייעצויות עם הרופא.

גורת הנטילה: יש לבלוע את התוropaה בשלהמתה עם כמה מספקת של נוזל שתיה.
אין לטוען או למצוץ את הטבילה המצוחה.

אוכליות/חיצייה/עליטה: אין מידע אודוט המינון המדרש במרקורים של הפרעות בתפקוד הכל'ית.
אין להשתמש בכישר במטיפול עם היסטויריה של הפרעות בתפקוד הכבב (ראוי סעיף 2 "اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתוropaה" וסעיף 4 "תופעות לוואי").

כתישה/חיצייה/עליטה: לא קיים מידע בנוגע לכתישה/רישוק. אין לחוץ את הטבילה המצוחה.

אם נטלת בטעות מין גבהה יותר: לא דוחו עד כה מקרים של מנת יתר כתזאה משימוש בתוropaה מנופרט. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל ידן התוropaה, פוי מז לറואה או לחדר מין של בית חולים ורבאי איזת התוropaה איתך. הרופא יחילט על אופן הטיפול.

אם שכחית ליטול את התוropaה בזמן המיעוד, אין ליטול מנתנה כפולה. קחי את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא.
יש לההמיד בטיפול כפי שモליץ עלי ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתוropaה ללא התייעצויות עם הרופא.

אם את מפסיקת את נטלת התוropaה: הפסקת הטיפול בדרך כלל אינה מלואה בנדק.

אין ליטול תרופות בחושן כדי את התוoyaה והמנה **בכל פעע** שהין נטלת תוropaה. הרכבי משקפיים אם הין זקופה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוropaה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

- כמו לכל הרופה, השימוש במונופרט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחלי למקרא רשותת תופעות הלואין. יינק ולא תסבל אף אחת מהן.
- השלכות של תופעות הלואין הבאות איה ידועה:
- פגיעה כבדית (הפרעות בתפקוד; כבד, צהבת, הפטייטיס) נקשרת בשימוש בתכשירים המכילים את האצטamide קוהוש שחור
 - תגובה ערירית (רופפת, פרירה או גדור)
 - נפוחות ברקמות הגוף והרפואיות התחולות (בצקת)
 - הפרעות בברקמות העיכול (הפרעות עיכול, שלישולים)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר את סובלת מטופעת לוואי שלא הזכרה בעלוון, עליך להתריעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דווחת מטופל רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקן לדוח על תופעת לוואי או עי' כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

drugsafety@drsuelov.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מניע הרעלוגן תרופה זו וכילו תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או/
תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלוגן. אל תנתמי לחקלא ללא הוראה מופרשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחר תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי אריזת הקרטון או הבוליסטר. תאריך התפוגה מחייב ליום האחרון של אותו חדש.
תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 30°C.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הבאים פעיליים הבאים:

Calcium hydrogen phosphate dihydrate; Lactose monohydrate; Potato starch; Magnesium stearate; Talc; Ammonio methacrylate copolymer, Type A, Dispersion 30% (Eudragit® RL 30D); Titanium dioxide (E 171); Macrogol 6000; Iron oxide yellow (E 172); Iron oxide red (E 172); Sorbic acid; Sodium hydroxide.

כיצד ו奈ית התרופה ומה תיכון האריזה: התרופה מנופרט נראית כתבליה מצופת חלקה, עגולה, דז-קמורה בצבע חום-טרוקטה וללא קוו חיציה. קוטר התבילה 7.0-7.2 מ"מ.
טבליות המצויפות באירועים במלגשי פלסטיק ("בליסטרים"), אשר אරודים בקופסאות קרטון.

גודל האריזה: התרופה מנופרט מסופקת באירועים קרטון המכילות 4 מגשי פלסטיק עם 15 טבליות מצופות בכל אחד, 60 טבליות מצופות בכל אריזה.

בעל הרישום ויבואן: דר סמואלוב יבוא ושיווק בע"מ, ח.פ 512260944, ת.ד. 2486, רעננה 4365007,
.info@drsuelov.co.il, כתובת מייל: 09-7483769.

יען: בינויקה SE, נומרכט 92318, גרמניה.

אשר מרץ 2021

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-34785-11-165.

Menopret-PIL-HEB-03/21