

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
דודיסיל וטרינרי, תמיסה להזרקה

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון
כל מ"ל מכיל:

Cyanocobalamin (vit. B12) 1 mg ויטמין B12 (ציאנוקובלאמין)
Thiamine (vit. B1) 100 mg ויטמין B1 (תיאמין)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13.

3. למה מיועדת התרופה
תוספת ויטמינים B1, B12 בבקר, צאן, סוסים, חזירים, כלבים וחתולים.

קבוצה תרפויטית- ויטמינים לשימוש בעלי חיים.

4. התוויות נגד
אין להשתמש במקרה של רגישות יתר לחומרים הפעילים או לאחד מהרכיבים הבלתי פעילים.

5. תופעות לוואי
לא דווחו תופעות לוואי.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה: בבקר, צאן, סוסים, חזירים, כלבים וחתולים.

7. מינון ואופן המתן
מתן תוך שרירי או תוך וורידי.
מתן תוך ורידי צריך להינתן באופן איטי
ההזרקה צריכה להתבצע בצורה אספטית.
המינון המומלץ הוא:
בקר וסוסים: 5-10 מ"ל.
עגלים, כבשים וסייחים: 2.5-5 מ"ל
חזירים: 1.5-4 מ"ל
חזירונים: 1-1.5 מ"ל
חתולים וכלבים: 0.5-1.5 מ"ל

יש לחזור כל 5-7 ימים אם יש צורך, לפי הוראות הוטרנר.

8. אופן השימוש בתכשיר

ראה פירוט בסעיף 7.

9. זמן המתנה: אין צורך בזמן המתנה.

10. אזהרות

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בחיות**
יש לנקוט בזהירות לפי הנדרש למתן אספטי (לא מזוהם).
- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר**
יש לנקוט זהירות בעת המתן כדי להימנע מהזרקה עצמית בטעות.
על אנשים עם רגישות ידועה לתיאמין או לויטמינים מקבוצה B להימנע ממגע עם התרופה
- **הריון והנקה של בעל החיים המטופל**
ניתן להשתמש בתכשיר במהלך הריון והנקה של בעל החיים המטופל.
- **תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות**
קרבונטים וציטראטים עלולים להוריד את היעילות של תיאמין. ויטמין B12 עלול להגיב עם כלוראמפניקול. מתן של אנטיביוטיקות עשוי לפגוע בריכוזי ויטמין B12.
- **מינון יתר**
אין מידע על מינון יתר, אין לעבור על המינון המומלץ.
- **חוסר תאימות (Incompatibilities)**
אין לערבב עם תכשירים וטרינריים אחרים

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון**: יש לשמור בטמפרטורת החדר (מתחת ל-25°C). יש לשמור במקום יבש ולהגן מאור. יש להשתמש בתכשיר תוך 28 יום לאחר פתיחה ראשונה.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**
Benzyl alcohol, Disodium edetate, Water for injection
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה**
בקבוקון המכיל 100 מ"ל תמיסה צלולה בצבע אדום-ורוד
- **בעל הרישום:** רומט בע"מ, המעפילים 39/104 הרצליה, 4654327
- **יצרן:**

FATRO S.P.A., VIA EMILIA 285 - 40064 , OZZANO EMILIA, BOLOGNA, ITALY

- מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:
083-38-92357
- נערך בנובמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.