

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله وعباءه
ديازيغال پريميكس بيطري
مسحوق للخلط في علف الحيوانات

2. المواد الفعالة
Sulfadiazine 25% w/w
Trimethoprim 5% w/w

للاطلاع على قائمة للمواد غير الفعالة في المستحضر - انظروا للبند 13 "معلومات إضافية".

3. لأي غرض مخصص الدواء

لعلاج أمراض تلوثية تحدث بسبب جراثيم حساسة للمستحضر في دجاج الفطام، ديوك الحبش، عجول قبل أن يتطور لديها جهاز للاجترار (pre-ruminating) والسمك.

الفئة العلاجية:
مستحضر مضاد للبكتيريا من نوع سولفوناميدات مدمج مع تريمثوبرينات

4. موانع الاستعمال

يمنع الاستعمال في العجول التي لديها جهاز متطور للاجترار. يمنع التقديم لحيوانات ذات اعتلال وخيم في الكبد، الكلى أو جهاز الدم
يمنع الاستعمال في حال وجدت حساسية نحو السولفوناميدات أو أي من مركبات الدواء

5. الأعراض الجانبية

ترسب بلورات في الكلى هو خطر نظري وبلغ عنها في أحيان نادرة. كذلك يحتمل (في أوقات نادرة) حدوث حساسية زائدة نحو السولفوناميدات
يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il>

6. الحيوانات المستهدفة: دجاج الفطام

ديوك الحبش

العجول الرضيعة (pre-ruminating)
السمك

7. طريقة إعطاء الدواء والجرعة

الجرعة الموصى بها في دجاج الفطام في ديوك الحبش هي 1 كغم ديازيجال پريميكس لكل 1000 كغم علف طعام لمدة 5-7 أيام.

عجول: 3 كغم ديازيجال پريميكس لكل 1000 كغم طعام لمدة 7 أيام

سمك: 240 غرام ديازيجال پريميكس لكل طن وزن سمك حي، لمدة 7 – 10 أيام. استهلاك الطعام في السمك يتغير حسب درجة حرارة الماء. لغرض ملائمة الجرعة يجب استشارة البيطري

8. طريقة استعمال المستحضر

للتقديم عن طريق الخلط في العلف حسب تعليمات البيطري

9. وقت الانتظار-

دجاج الفطام : 8 أيام

ديوك الحبش: 5 أيام

عجول : 21 أيام

سمك : 30 يوماً بدرجة حرارة: 23°C

10. تحذيرات

- تحذيرات خاصة المتعلقة باستخدام الدواء في علاج حيوان الهدف

- دجاج الفطام وديوك الحبش: في حال انخفاض في الشهية، يجب ملائمة التركيز في الطعام للحصول على الجرعة الموصى بها. بغية منع ترسب البلورات في الكلى، فإن استهلاك كمية لائقة من الماء هو أمر ضروري، خاصة عندما يدور الحديث عن حيوانات لديها ضرر كلوي.

تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يتعامل مع الدواء

عند خلط المستحضر في العلف، على العامل تجنب ملامسة المستحضر للجلد والعينين واستنشاقه وهذا من خلال استعمال وسائل وقاية ملائمة. لذلك يجب استعمال قفازات، قناع واق ونظارات واقية عند خلط المستحضر مع العلف. يجب غسل اليدين بعد استعمال هذا المستحضر.

قد تسبب السولفوناميدات رد فعل تحسسي بعد التعرض في أعقاب حقن، استنشاق، بلع أو لمس الجلد. يمكن للحساسية الزائدة نحو السولفوناميدات أن تسبب حساسية متصالبة مع مضادات حيوية أخرى. أحيانا قد يكون رد الفعل التحسسي نحو هذه المواد وخيما.

يمنع لمس هذا المستحضر في حال عرف بوجود حساسية نحو السولفوناميدات.

في حال تطورت لديك أعراض مثل طفح أو صعوبات تنفس عليك التوجه إلى الطبيب وأن تحضر معك هذه النشرة.

11. تعليمات التخزين

- تجنب التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وهكذا تمنع التسمم.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون 25°C يجب الحماية من الضوء

12. تعليمات حول تدمير المستحضر / بقايا المستحضر بعد الاستخدام

يجب تدمير أي بقايا من المستحضر البيطري أو أي نفايات يتم تلقيها من استخدام المستحضر البيطري كنفايات سامة، ويجب عدم إلقتها في المجاري.

13. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضا على Dextrose

- حجم العبوة: 1 كغم، 3 كغم

صاحب التسجيل وعنوانه: بيوفاك م.ض، شارع هايلان 30، المنطقة الصناعية الشمالية، أور عكيفا، 3060000

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 0822892278

أعدت في 8.2021 وفقا لتوجيهات وزارة الصحة