

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה

דיאזיגל פרמיקס וטרינרי
אבקה לערבוב בתערובת מזון

2. חומרים פעילים

Sulfadiazine 25% w/w
Trimethoprim 5% w/w

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר- ראו בסעיף 13 "מידע נוסף"

3. למה מיועדת התרופה

לטיפול במחלות זיהומיות הנגרמות על ידי חיידקים הרגישים לתכשיר בתרנגולי פטם,
תרנגולי הודו, עגלים לפני התפתחות מערכת העלאת גירה (pre-ruminating) ודגים.

קבוצה תרפויטית:

תכשיר אנטי-מיקרוביאלי מסוג סולפונאמידים משולב עם טרימתופרים

4. התוויות נגד

אין להשתמש בעגלים עם מערכת מפותחת להעלאת גירה. אין להגיש לבעלי חיים עם ליקוי
חמור בכבד, כליות או מערכת הדם.
אין להשתמש במקרים של רגישות ידועה לסולפונאמידים, או לכל אחד ממרכיבי התרופה.

5. תופעות לוואי

שקיעת גבישים בכליות הינו סיכון תאורטי ודווח לעתים נדירות.
כמו כן תתכן, לעתים נדירות, רגישות יתר לסולפונאמידים.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,
או ע"י כניסה לקישור: [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. חיות מטרה: תרנגולי פטם

תרנגולי הודו

עגלים יונקים (pre-ruminating)

דגים

7. מינון ואופן המתן

המינון המומלץ בתרנגולות פיטום בתרנגולי הודו הוא 1 ק"ג דיאזיגל פרמיקס לכל 1000 ק"ג
תערובת מזון למשך 5-7 ימים.
עגלים: 3 ק"ג דיאזיגל פרמיקס לכל 1000 ק"ג מזון למשך 7 ימים.

דגים: 240 גרם דיאזיגל פרמיקס לכל 1 טון משקל דגים חי, למשך 7 – 10 ימים. צריכת המזון בדגים משתנה בהתאם לטמפרטורת המים, לפיכך, לצורך התאמת המינון יש להיוועץ עם הווטרינר.

8. אופן השימוש בתכשיר
להגשה על ידי ערבוב בתערובת מזון לפי הוראות הווטרינר.

9. זמן המתנה-
תרנגולי פטם : 8 ימים
תרנגולי הודו : 5 ימים
עגלים : 21 ימים
דגים : 30 ימים בטמפרטורה: 23°C

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיות המטרה
עבור תרנגולי פטם ו תרנגולי הודו: במקרים של ירידה בתיאבון, יש להתאים את הריכוז במזון על מנת להשיג את המינון הנכון. כדי למנוע שקיעת גבישים בכליות, צריכת מים נאותה הינה חיונית במיוחד כאשר מדובר בבעלי חיים עם נזק כלייתי.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
 - בזמן ערבוב התכשיר בתערובת מזון, על העובד להימנע ממגע התכשיר בעור ובעיניים ומשאפתו, וזאת על ידי שימוש באמצעי מיגון מתאימים. לכן יש להשתמש בכפפות ובמסכת מגן בעת הטיפול במזון עם תכשיר זה. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתכשיר זה.
 - סולפונאמידים עלולים לגרום לתגובה אלרגית לאחר חשיפה בעקבות הזרקה, שאיפה, בליעה או מגע בעור. רגישות יתר לסולפונאמידים יכולה לגרום לרגישות צולבת עם אנטיביוטיקות אחרות. לעתים התגובות האלרגיות לחומרים אלו עלולות להיות חמורות.
 1. אין לבוא במגע עם מוצר זה אם ידוע שקיימת רגישות לסולפונאמידים.
 2. אם אתה מפתח תסמינים כמו פריחה בעור, או קשיי נשימה, פנה לרופא והבא איתך עלון זה.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : מתחת ל 25°C. יש להגן מפני אור.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש
כל שאריות של תכשיר ווטרינרי או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש בתכשיר ווטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם Dextrose
- גודל האריזה : 1 ק"ג, 3 ק"ג

יצרן ובעל הרישום: ביוואק בע"מ, רחוב האילן 30, איזור תעשייה צפוני, אור עקיבא, 3060000

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות : 0822892278

נערך ב 8.2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות