

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

טלפסט 120 מ"ג, טבליות מצופות

חומר פעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה: פקסופנאדין הידרוכלוריד (Fexofenadine hydrochloride) 120 מ"ג
מרכיבים לא פעילים: ראה סעיף 6

קרא בעיון את העלון עד סופו, בטרם תשתמש בתרופה.

שמור על עלון זה, ייתכן ותצטרך לקרוא בו שוב.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך ליטול את התכשיר במדויק, על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה או כפי שאמר לך הרופא או הרוקח.
היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. פנה לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת להקלה במקרים של נזלת אלרגית עונתית.

קבוצה תרפויטית: אנטיהיסטמין.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

הינך רגיש (אלרגי) לפקסופנאדין או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בטלפסט התייעץ עם הרופא אם:

- הינך סובל מליקוי בתפקוד: הכליה או הכבד.
- הינך סובל או סבלת בעבר ממחלת לב, כיוון שתרופה מסוג זה עלולה לגרום לקצב לב מהיר או לא סדיר.
- הינך קשיש

אם אחד מהמצבים הללו רלוונטי אליך או אם אינך בטוח, ספר לרופא שלך לפני שאתה נוטל טלפסט.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר

על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח

תרופות לבעיות עיכול שמכילות אלומיניום או מגנזיום העשויות להקטין את כמות הטלפסט שנספגת ולהשפיע על פעילות הטלפסט. מומלץ ליטול תרופות אלו שעתיים לפני או אחרי נטילת טלפסט.

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת הריון יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

אין לקחת טלפסט בהריון ללא הנחיית רופא.

טלפסט אינו מומלץ בזמן הנקה.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר שטלפסט ישפיע על יכולתך לנהוג או להפעיל מכונות, אולם, עליך לוודא לפני שאתה נוהג או מפעיל מכונות שהטבליות לא גורמות לך לישנוניות או לסחרחורת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש תמיד בדיוק לפי הרשום בעלון זה או כפי שהנחה אותך הרופא או הרוקח. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. **למבוגרים וילדים מעל גיל 12** המינון המקובל בדרך כלל הוא טבליה אחת (120 מ"ג) פעם ביום. יש לבלוע את התרופה עם מים לפני האוכל. אין מידע לגבי כתישה או ריסוק הטבליה. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר של טלפסט ממה שהיית צריך
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה אתך. תסמינים של מנת יתר במבוגרים הם סחרחורת, ישנוניות, עייפות ויובש בפה.

אם שכחת ליטול טלפסט

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם הפסקת לקחת טלפסט

אם אתה רוצה להפסיק לקחת טלפסט לפני סיום הטיפול שהומלץ על ידי הרופא, ספר זאת לרופא. אם תפסיק לקחת טלפסט מוקדם מהמתוכנן הסימפטומים עלולים לחזור.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטלפסט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

פנה לרופא מיד והפסק לקחת טלפסט אם הינך סובל מנפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון ומקשיים בנשימה, מכיוון שאלו עשויים להעיד שהינך סובל מתגובה אלרגית חמורה.

תופעות הלוואי הבאות דווחו בניסויים קליניים, עם שכיחות דומה לאלו שנצפו בחולה שלא קיבל את התרופה (פלצבו).

תופעות לוואי שכיחות (מתרחשות ב-10-1 משתמשים מתוך 100): כאב ראש, נמנום, בחילה וסחרחורת.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-1 מתוך 100 משתמשים): עייפות/ישנוניות.

תופעות לוואי נוספות (שכיחות לא ידועה) שיכולות לקרות: נדודי שינה, הפרעות שינה, חלומות רעים, עצבנות, דפיקות לב מהירות או לא סדירות, שלשול, פריחה בעור וגרד, חרלת, תגובות אלרגיות קשות העלולות לגרום לנפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון, הסמקה, לחץ בחזה וקשיי נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מהמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן טלפסט?

-מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

-אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ 30°C

אל תזרוק תרופה כלשהי באמצעות שפכים או פסולת ביתית.

שאל את הרוקח שלך איך לזרוק את התרופות שאתה כבר לא משתמש בהן. צעדים אלו יסייעו להגן על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Tablet core: Microcrystalline Cellulose, Pregelatinised Maize Starch, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate.

Film coating: Hypromellose, Macrogol 400, Titanium Dioxide, Colloidal Anhydrous Silica, Povidone, Yellow Iron Oxide Blend, Pink Iron Oxide Blend,

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

טלפסט 120 מ"ג טבליות מצופות הינן בצבע אפרסק, צורתן דומה לקפסולה. על צד אחד של הטבליה מסומן "012" ועל צדה השני "e".

טלפסט 120 מ"ג משווק באריזת מגשיות (בליסטרים). האריזה מכילה 15 טבליות.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר, אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה אנא פנה לרופא.

יצרן סאנופי ווינטרופ תעשיות, טור, צרפת

בעל הרישום וכתובתו סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 8090, נתניה

נערך באפריל 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות 108 90 29135

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

TELF-120-PIL-V12.0