

## نيزورال™ كريم

المادة الفعالة وكيميتها أو تركيزها بوحدة مقدار دوائي

كيتونونازول 20 ملг/غرام Ketoconazole 20 mg/gr

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - انظر الفقرة 6  
“معلومات إضافية”.

اقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أمراض الجلد. لا تطهير للأذنين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن جالتهم الطبية مشابهة لحالتك. نيزورال كريم غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة.

### (1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج التلوثات الفطرية للجلد وإلتهاب الجلد الدهني (Seborrheic Dermatitis).

الفصيلة العلاجية:

مستحضر مضاد للفطريات من فصيلة الإيميدازولات.

### (2) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (الergic) للمادة الفعالة كيتونونازول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات الإضافية انظر الفقرة 6 “معلومات إضافية”.
- إذا وجدت لديك علامات لحساسية مفرطة، تشمل حكة وإحمرار في الجلد، التي يمكن أن تحدث بعد دهن الكريم.
- لعلاج إلتهابات العينين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل إستعمال نيزورال كريم إحكام الطبيب إذا:

- استعملت مؤخراً كريم، مرهم أو مستحلب يحتوي على ستيرويدات لطيفة (مثل هيدروكورتيزون)، كريم، مرهم أو مستحلب يحتوي على ستيرويدات لطيفة (مثل نيزورال كريم في المساء، إن العلاج بالستيرويد اللطيف يمكن بعد ذلك التوقف بالتدريج على إمتداد 2-3 أيام). إذا توفرت لديك أسئلة بخصوص التوقف عن استعمال الكريم، المرهم أو المستحلب ستيرويدي إستشر الطبيب أو الصيدلي.

الأطفال والراهقون

نيزورال كريم غير مخصص للاستعمال لدى أطفال وراهقين دون عمر 18 سنة.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام الطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأخص إذا كنت تتناول:

- كوريكتيكوتستيرويدات للاستعمال الموضعي على شكل كريم، مرهم أو مستحلب. إذا كنت تستعمل مستحضر كريم على إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء الإستعمال بـ نيزورال كريم.

يمكن في نفس الوقت بدء إستعمال نيزورال كريم، لكن لا يجوز التوقف عن إستعمال الكوريكتيكوتستيرويد بشكل مفاجئ لأنه من الجائز حدوث رد فعل لحكة وأحمرار في الجلد. لتجنب ذلك، انتبه ذلك إستعمال الكوريكتيكوتستيرويد لمدة أسبوع خلال ساعات النهار وأما نيزورال كريم في المساء، بعد ذلك، إدهم الكوريكتيكوتستيرويد في الصباح كل مساء لمدة 1-2 أيام. لاحقاً يمكن التوقف عن العلاج بالكوريكتيكوتستيرويد، ومواصلة العلاج بـ نيزورال كريم وفقاً للحاجة.

### الحمل والإرضاع

بالإمكان إستعمال نيزورال كريم إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة. يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

### السياحة وإستعمال الماكولات

من غير المحمّل أن يؤثر نيزورال كريم على قدرتك في السياحة أو تشغيل الماكولات.

### معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء

يحتوي نيزورال كريم على بروبيليلن چلوكول

يحتوي المستحضر على 6,000 ملغ بروبيليلن چلوكول ضمن ماسورة ذات 30 غرام من نيزورال كريم، الذي يساوي بالقيمة لـ 200 ملغ/غرام.

يحتوي نيزورال كريم كحول ستيبيلي وكمول ستيباريلي الكحول الستيبيلي والكمول الستيباريلي قد يسببان ردود فعل جلدية موضعية (مثل: إلتهاب الجلد التنساوي).

### (3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستیصاص من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقادير الدوائية العادي عادة هو دهن الكريم مرة أو مررتين في اليوم، وفقاً لتعليمات الطبيب.

عادة يستمر العلاج 2-6 أيام، وذلك يتعلق بنوع التلوث وبحدتها.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به. للإستعمال الخارجي فقط. لا يجوز بلع نيزورال كريم.

### تجهيز الجلد

• إسلب المنطقة المصابة وجفف جيداً.

### استعمال نيزورال كريم

• إن ماسورة نيزورال كريم مسدودة. من أجل فتح الماسورة يجب ثقب فتحة الماسورة بواسطة السادة.

• يجب دهن كمية من نيزورال كريم بحيث تغطي المنطقة المصابة والجلد المحيط بها والتاليك بطلخ بواسطة أطراف الأصابع.

• لا يجوز وضع نيزورال كريم في العينين.

### النظافة الشخصية

• إذا كانت المنطقة المصابة ليست البدين، فاغسل يديك بالماء والصابون بعد إنتهاء كل عملية دهن للكري.

• إن غسل البدين بعد إستعمال الكريم سيوقن نقل التلوث من المنطقة المصابة إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لأشخاص آخرين.

• لا تسمح للأشخاص الآخرين بإستعمال المنشفة والبطانية الخاصة بك. إن هذه الخطوة توقف حدوث الآخرين.

• إنحرص على تبديل الملابس التي تلامس المنطقة المصابة بشكل منتظم. نيزورال كريم ليس دهيناً ومن غير المتوقع أن يترك بقعاً على الملابس.

## إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا استعملت أكثر مما أنت بحاجته من نيزورال كريم، فإن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بحرق، إمبار أو انتفاخ، إذا حدث ذلك فيجب التوقف حالاً عن استعمال نيزورال كريم. إذا استعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا باع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

## إذا توقفت عن استعمال نيزورال كريم

غالباً سترت علامات تحسن بعد 4 أسابيع. إذا لم تشعر بذلك - إستشر الطبيب. يجب مواصلة العلاج عدة أيام إضافية بعد زوال كافة الأعراض. حتى بعد شفاء جلاك تماماً، يتوجب عليك أخياناً استعمال الكريم مرة في الأسبوع أو في الأسبوعين. هذا سيعين عودة الأعراض.

## كيف يمكنك المساعدة في نجاح العلاج

تحفز الرطوبة نمو الفطريات. لذا يجب الحفاظ علىبقاء المكان المصاب جافاً. يجب غسل المنطقة المصابة قبل كل عملية دهن للدواء، بين بلاط وعلاج بالكلريم - يمكن استعمال مسحوق مضادلفطريات لتجفيف المكان.

إذا كان العلاج في القدمين - يجب الحرص على الغسل جيداً والتجفيف خاصة بين أصابع القدمين. يستحسن استعمال جوارب قطنية؛ يجب تجنب إرتداء جوارب من الكروسب أو من مواد إصطناعية. يستحسن تبديلها عدة مرات في اليوم (وفقاً لكتبة العرق). في الفصول الملائمة يوصى بإنتعال الصنادل بدون جوارب.

لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أستيل إضافية حول استعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

## (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال نيزورال كريم قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعانى أي منها.

توقف عن استعمال الدواء وراجع الطبيب حالاً إذا قاسيت من الأعراض

الجانبية التالية. من الجائز أن تكون بحاجة لعلاج طبي طارئ:

شائع: تهيج شديد في الجلد أو أحمرار الجلد في منطقة دهن الكلريم، أو علامات أخرى لحساسية أثناء الأيام الأولى من الإستعمال.

غير شائع: تقرش أو حويصلات في الجلد.

إحدى للطبيب أو الصيدلي إذا قاسيت من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

• الشعور بحرقة

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10

مستعملين من بين 1,000

• مشاكل في المكان الذي تم فيه إستعمال الكلريم، مثل:

- نزف

- إنزعاج

- جفاف

- إلتهاب الجلد التماسي (contact dermatitis)

- الشعور بدغدة

- طفح، شرى

• الشعور بتديق في الجلد

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية تقع علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى المنوذن المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5 كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عنتناول أيندي ومحال رؤبة الأطفال / أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحه من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date). تجنب ظهور على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يصلح الكلريم للإستعمال لمدة 6 أشهر بعد فتح الماسورة للمرة الأولى.
- يجب تخزين نيزورال كريم بدرجة حرارة ما بين 15-30 درجة مئوية.

## 6 معلومات إضافية

يحتوى نيزورال كريم باليافضة للمادة الفعالة أينضاً:

Propylene glycol, stearyl alcohol, cetyl alcohol, sorbitan stearate, polysorbate 60, isopropyl myristate, 2 mg sodium sulphite anhydrous, polysorbate 80, purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

- كريم أبيض متجلانس
- يتوفر نيزورال كريم بعلبة كرتون وبداخلها ماسورة بسعة 15 غرام المستوردة وصاحب الإمتياز وعنوانه: جي - سي هيلث كير م.ض..، كيبوتس شفافيم 6099000 إسرائيل.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 042-19-25862-00

تم إعدادها في حزيران 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة