

## איפאדיין 2% פורטה

תמייסה

הרכב:  
החוורם הפעליים ורכיביהם:  
כלורקהידין דיגלוקונט  
(Chlorhexidine Digluconate 6% w/v  
- איזופרופנול 70% v/v (Isopropanol)

לרשימת החומרים הבלטי, פעילים ואלרגניים  
בתרפיה: ראה סעיף 6 "מידע נוספים".

קרא בעין את הולן דע סופו בטרם

תשמש בתרפיה.

על זה מכיל תמצית על התרופה. אם יש לך שאלות מוסכום, פה אל הרופך או אל ברוקט. לשימוש בתכשיר בקרה, נכונה היוציא ברוקט אם הנזק לא יוביל לפגיעה באיבר או לא יתאפשר להימנע מכך.

על זה מכיל תמצית על התרופה. אם יש לך שאלות מוסכום, פה אל הרופך או אל ברוקט. לשימוש בתכשיר בקרה, נכונה היוציא ברוקט אם הנזק לא יוביל לפגיעה באיבר או לא יתאפשר להימנע מכך.

### 1. למה ייעודת התרופה?

איפאדיין 2% פורטה תרופה סינרגית ואלהήחן לא עד ייבוש  
אותה להיליך וווחטל של התכשיר. לא לשימוש בפה ואין לבולע.  
לשימוש חיצוני בלבד. עליך לדבוך עם הרופא או  
התרופה אין שימוש בטוח בפה, בוגר או מושג  
בתכשיר. אין לטבול דבוך גאגה סטראול וחתוך את  
האזור הראשי.

### 2. לפן שימוש בתרפיה:

אם השתמשת במנגנון יתר או אם בעקבות בעלILD מזנ

### 3. כיצד תשמש בתרפיה?

התרופה, פה מייד לאחר מין שע בית זוחלים, והבא  
אריזת התרופה את. אך, אם תרטוב להקל האורה  
מפורשת מהרopia אין ליטול מושג תומך בחודק  
תתיויתת תמןנה בבל. עם הרופא או ברוקט.  
הרכב מסkipים בבל עט שחר מושג תומך בחודק.  
אם יש לך שאלות מוסכום בוגר לשימוש בתרפיה,  
הויעץ ברופא או ברוקט.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תכשיר תכשיר זה על גורם  
לטיפול לעוא בחלק המושגים. אל תבהל  
למקרה רשותת תופעת הלוא, יתכן ולא תסבב  
מאר את ההוא.

העון נערך ב: 06/2021 בהתאמם להנחיות  
משרד הבריאות.  
מפור רישום התרופה בפקוק התרופות הממלכתי  
במשרד הבריאות: 19-36501-99-  
167-16501-99.  
לשס הפשות והקלת הקיא, עליז זה סוף  
בלשון דבר על אף זאת, התרופה מיעדת לבני שני  
המינים.

אם הופעה תופעת לוא, אם אחות מתופעות הלוא  
וממירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוא, שלא  
הוזכרה לעלן, עליך להתריע על הרופא.  
דוח על תופעות לוא:

ינתן לזרע על תופעת לוא של משרד הבריאות  
בഅמצעות הטופס מקוון בלבד על תופעת לוא  
במאד זרבת הניתן על רשותת המתקוון  
לוריון על תופעת לוא, או ע"י כיסיה ליקישור:  
<https://sdeeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

ונגע להלן תרופה זו ולול התרופה אחריה יש לשמר  
במקומות סגורים מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות  
ועל ידי כר ומען הרעלת. אל תגרם להקלת לא  
הזרה מופרשת לוא.

אין לשמש בתרפיה אחריו תאריך התופה  
(exp. date) המופיע על כל התרופה אחריה. לאחר התופה  
מיוחסה לה המתארח לאחר תקופה של אוטו-ջודש.  
יש לאחסן בתפרטורה, מתחת 25° C.

אחריה חומר דלק, שמן ובפני אש.  
גם ליפוי תאי האיריה / חומצה המולציטם.  
תופעת מושגתו תקופת גובה של הנטשלר בכל קראת  
ספיק, עליך להויעץ ברופך שיטיק לך את  
התרופה. אין לאחסן תופעת שנות בואה איריה.

### 6. מידע:

נוסך על החומרים הפעילים התרופה מכילה  
גם את החומרם הלא פעיל הבאים:

Purified Water, Carmoisine  
(E122 ; Azorubine).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האיריה:

נכוד שפכט בעקבות דוד כהה, ובו ריח  
אפני של אלהוג. התמיסה ארצה בבקבוק לבן עוכר עם פיק הרגבה.  
נשים מארזים ברם התרופה מבוגרתם במרקם הפיק.

לא כל האיריות משוכקות. תכשיר המבוגרת  
גודל האיריה: בבקבוק המכיל 500 מ"ל תמיוסה.

היצרן ובצל תעשייה משבグ' ד.ג. שטבוב 20174000.  
העון נערך ב: 06/2021 בהתאמם להנחיות  
משרד הבריאות.

תגובה לאירועים כבשויים או גורמים רפואיים, כוללים  
לולם (שוק), נזירות ביפוי, חרלה (גדר בעור), גירוי  
ופחירויות, ריריה ועוד דלקת מוקנית בעור (נדיר): הפסק  
הטיפול ונפה לרופא.

תופעת לוא וNEGATIVE: על הרופאים לדוח להרופא המספק על כל  
וביתווקה: על הרופאים לדוח להרופא המספק הינו נתן ליל.  
תופעת לוא וכן על כל תרופה נוספת מושגת הינו נתן ליל.