

**Инструкция по применению
в соответствии с фармацевтическими
стандартами (препараты) 1986 г.**

Безрецептурный препарат

Ипадин Форте 2%

Раствор

Активные ингредиенты и их концентрация:
хлоргексидин диглюконат (Chlorhexidine Digluconate)
2,0% w/v и изопропанол (Isopropanol) 70% v/v

Для списка неактивных и аллергенных ингредиентов
в препарате см. пункт 6.

**Перед применением препарата
внимательно прочтите инструкцию
полностью.** Данный вкладыш содержит краткую
информацию о препарате. Если у вас имеются
дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или
к фармацевту. Вы должны использовать данный
препарат правильным образом. Если вам
необходима дополнительная информация,
проконсультируйтесь с фармацевтом.

1. Для чего предназначен препарат?

Ипадин Форте 2% – это раствор,
предназначенный для применения в возрасте 2
месяцев и старше – для дезинфекции кожи перед
проведением инвазивных медицинских процедур,
в целях уменьшения микробной нагрузки для
предотвращения кожной инфекции.

Терапевтическая группа: Антисептические препараты.

2. Перед использованием препарата

**Не используйте препарат
в следующих случаях:**

- Если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активным ингредиентам или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. Для ознакомления со списком неактивных ингредиентов см. пункт 6 – «Дополнительная информация».
- Не используйте данный препарат на тканях головного мозга, мозговых оболочках, среднем ухе или гениталиях.
- Не используйте на ранах на коже, потрескавшейся, поврежденной кожей или в качестве очищающего средства для кожи.
- Использование данного препарата не заменяет собой стерильные перчатки.

Особые предостережения относительно использования данного препарата:

- Если у вас имеется чувствительность к какому-либо пищевому продукту или препарату, сообщите об этом врачу перед применением препарата.
- В случаях, когда в области раны развивается отек или рана сопровождается повышением температуры тела, следует обратиться к врачу.
- **Препарат следует применять по назначению.**
Не предназначен для применения в области глаз.

Может нанести значительный и необратимый вред глазам, если при контакте препарат не был немедленно смыт. Не предназначен для применения в области рта. Не глотать. Не предназначен для применения в ухе. Может вызвать глухоту при попадании в среднее ухо в случае наличия перфорации барабанной перепонки. В любом из этих случаев следует немедленно промыть холодной водой. • Младенцы до одного года могут быть более чувствительны к препарату. Следует соблюдать осторожность при применении препарата. • Избегайте попадания препарата в глаза, уши и рот. В случае контакта с этими областями, тщательно промойте холодной водой. • Если продукт применяется в области кожи головы, следует по возможности избежать нанесения на волосы. Пропитанный продуктом волос легко воспламеняется, и их высыхание займет около часа.

• Следует избегать длительного контакта кожи с препаратами, содержащими высокую концентрацию спирта. При возникновении признаков раздражения, применение препарата следует прекратить. См. раздел 4 – «Побочные явления».

Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и грудное вскармливание:
Нет противопоказаний к применению препарата при беременности или кормлении грудью. Важная информация о некоторых ингредиентах препарата: • Препарат содержит изопропанол (Isopropanol), который также называется изопропиловым спиртом (Isopropyl Alcohol).

**3. Как принимать лекарственный препарат
Не зажигать сигарету и не подвергать воздействию
огня до полного высыхания препарата.**

Не предназначен для применения в области рта.
Не глотать. Только для внешнего применения.
Если вы не уверены в том, как следует применять препарат и в какой дозировке, обращайтесь к врачу или фармацевту. Смойте препаратом стерильную марлевую салфетку и продезинфицируйте желаемую область.

В случае перодозировки или если препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата.
Не вызывайте рвоту без четкого указания врача!

Не принимайте лекарства в темноте!
Проверяйте этикетку и дозу при каждом применении препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении применения препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарственное средство, данный препарат может вызвать в некоторых случаях побочные явления. Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

Побочные явления, которые требуют особого внимания:
• Аллергическая реакция или острая аллергическая реакция, которая включает такие признаки, как

затрудненное дыхание, хрипы, шок, отек лица, кожный зуд, раздражение и отек, сыпь или местное воспаление кожи (редко); прекратите лечение и обратитесь к врачу.
Побочные явления и лекарственные взаимодействия среди детей и младенцев: родители должны сообщать лечащему врачу о любом побочном явлении и о любом дополнительном препарате, который получает ребенок. Если возникло побочное явление, одно из побочных явлений ухудшается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом. • Побочных явлений можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщения о побочных явлениях дижитаментозного лечения». Ссылка приводится на домашней странице Министерства здравоохранения (www.health.gov.au) и перенаправляет вас к электронной форме сообщения о побочных явлениях. Также вы можете пойти по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.au/>

5. Как хранить препарат?

• Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом месте и вне поля зрения и досягаемости детей и/или младенцев, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.
• Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке / флаконе / коробке / этикетке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца. Условия хранения: хранить при температуре ниже 25°C в оригинальной упаковке для защиты от света. После вскрытия флакона можно использовать препарат в течение трех месяцев, но не позднее даты истечения срока действия. Осторожно!
Легковоспламеняющийся материал. Храните вдали от огня. Даже при соблюдении рекомендуемых условий упаковки и хранения, лекарства хранятся лишь в течение ограниченного периода времени. Обращайте внимание на срок годности препарата! В случае сомнений проконсультируйтесь с фармацевтом, выдавшим вам препарат. Не храните различные лекарства в одной упаковке.

6. Дополнительная информация:

Помимо активного(-ых) вещества(-а), препарат содержит также следующие неактивные ингредиенты: очищенная вода, кармоизин (E122; азорубин).
Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:
• Препарат представляет собой прозрачную жидкость розового до темно-розового цвета с характерным запахом алкоголя. • Раствор находится в полупрозрачном флаконе с закручивающейся пробкой. В некоторых случаях флакон препарата оснащен дозатором. Дозатор вкручивается вместо пробки. • Не все упаковки доступны на рынке.
Размер упаковки: флакон, содержащий 500 мл раствора.
Производитель и владелец патента: "Бен-Шимон Флорид", Лтд., ИП. 511126831, промышленный парк Мисгав, полевая почта: 2017400.

Листок отредактирован: 06/2021, в соответствии с инструкцией Министерства Здравоохранения. Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарств в Министерстве здравоохранения: 167-19-36501-99

Для простоты и удобства чтения данная инструкция сформулирована в мужском роде. Однако препарат предназначен как для мужчин, так и для женщин.

