

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

## АГИСТЕН БЕЙБИ

### Паста

#### Клотримазол (Clotrimazole) 1% W/W

Вспомогательные и аллергенные ингредиенты препарата - см. раздел 2 "Важная информация о части ингредиентов, содержащихся в препарате" и раздел 6 "Дополнительная информация".

**Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата.** Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Правильно применяйте препарат.

Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если симптомы заболевания усиливаются или не улучшаются через 7 дней.

#### 1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?

Для лечения грибковой пеленочной сыпи у детей, длящейся более 72 часов.

**Фармакологическая группа:** Противогрибковое средство из группы имидазолов.

#### 2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

##### Не применяйте препарат:

- Если у Вас или у Вашего ребенка повышенная чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к одному из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.
- Для лечения инфекции кожи головы или ногтей.

#### Особые предупреждения, касающиеся применения данного препарата

Перед первым применением препарата желательно посоветоваться с врачом, чтобы избежать ненужного использования. Препарат применяется только в случаях, когда раздражение не проходит через 72 часа.

Не применяйте данный препарат часто или продолжительный период времени без консультации врача.

Не применяйте на открытых ранах.

Избегайте контакта препарата с глазами и ртом. В случае контакта с глазами или ртом следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

#### До начала лечения препаратом Агистен Бейби сообщите врачу, если:

- Вы не уверены, что пациент страдает грибковой инфекцией.
- У пациента повышенная чувствительность к каким-либо продуктам питания или каким-либо лекарственным препаратам.

#### Если Вы или Ваш ребенок принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

#### Важная информация о части ингредиентов, содержащихся в препарате

Агистен Бейби содержит шерстяной жир (wool fat), который может вызвать локализованные кожные эффекты (например, контактный дерматит).

#### 3. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ?

Уточните у врача или фармацевта, если Вы в чём-либо не уверены.

Если препарат был выписан для Вас врачом, следуйте его указаниям.

Если Вы приобрели препарат без рецепта, тщательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

Принятая дозировка и способ применения, при отсутствии других врачебных инструкций: смазывание пораженного участка два раза в день в течение 7-10 дней.

Способ применения:

Нанесите равномерно тонкий слой пасты на чистую, сухую и проветриваемую кожу и вотрите его в кожу легкими массажными движениями.

Приблизительно полсантиметра пасты будет достаточно для покрытия участка величиной примерно с ладонь.

Рекомендуется чаще менять подгузники. Желательно оставлять младенца без подгузника, насколько это возможно.

Симптомы кожной инфекции, такие, как зуд или болезненность, должны улучшиться через несколько дней лечения. В то же время такие признаки, как покраснение и шелушение кожи могут исчезнуть через более продолжительное время. Если симптомы продолжаются, посоветуйтесь с врачом.

**Не превышайте рекомендуемую дозу.**

**Только для наружного применения.**

**Не вводите препарат в рот и не глотайте его.**

Если по ошибке ребёнок или кто-либо другой проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

**Если Вы забыли применить препарат** в положенное время, примените его как можно скорее и продолжите лечение, как обычно.

#### Как способствовать успешному лечению?

- Несмотря на то, что пораженный участок чешется, старайтесь избегать расчесывания. Расчесывание нанесет вред поверхности кожи и таким образом приведет к еще большему распространению инфекции.
- Содержите пораженный участок в чистоте.
- Влажность способствует размножению грибов, поэтому необходимо содержать пораженный участок сухим, но избегайте излишнего натирания.
- Мойте пораженный участок и высушивайте его перед каждым нанесением препарата.
- Мойте руки после обработки инфицированного участка, во избежание распространения инфекции.
- Не используйте общие с младенцем полотенце, коврик в ванной и тому подобное, так как это может привести к распространению инфекции.

Не принимайте препараты в темноте! Проверяйте этикетку и дозу **каждый раз** перед применением препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

#### 4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым другим лекарством, применение препарата Агистен Бейби может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Как и любое другое лекарство, препарат может вызывать аллергию у некоторых людей. Если у Вас или у Вашего ребенка есть аллергия, реакция появится сразу же после начала лечения. Если у Вас или у Вашего ребенка возникнет аллергическая реакция, прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Признаки аллергической реакции могут включать:

сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, лица, горла или языка, слабость, тошноту, головокружение или обморок.

Кроме того, прекратите лечение и обратитесь к врачу, если после применения препарата возникают: покраснение, раздражение или сыпь на коже (редко), зуд, волдыри, жжение, дискомфорт, припухлость, шелушение кожи.

Если у Вас или у Вашего ребенка возникает одно из вышеупомянутых побочных явлений, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы или Ваш ребенок страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

#### Отчет о побочных явлениях:

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство

Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на

домашней странице сайта Министерства Здравоохранения

([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) и направляющую на онлайн форму,

предназначенную для отчета о побочных явлениях, или, зайдя

по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

Кроме того, Вы можете сообщить в компанию по следующему

адресу: [www.perrigo-pharma.co.il](http://www.perrigo-pharma.co.il)

#### 5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Данный препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- После первого открывания можно пользоваться в течение 6 месяцев.
- Храните при температуре ниже 25°C.

#### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В дополнение к активному ингредиенту, препарат также содержит:

Wool fat, kaolin, paraffin white soft, isopropyl myristate, zinc oxide, heavy liquid paraffin, titanium dioxide, dimethicone, squalane, propyl parahydroxybenzoate, butyl hydroxy toluene (BHT).

- Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:

Алюминиевый тюбик, содержит 30 граммов пасты бело-кремового цвета.

- Производитель и владелец лицензии: Падагис Израиль Фармацевтика Лтд., п/я 16, Иерусхам.

- Откорректировано в Октябре 2021, в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения.

- Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 12594.26744