

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

АГИСТЕН ПАСТА

Клотримазол (Clotrimazole) 1% W/W

Вспомогательные и аллергенные ингредиенты препарата - см. раздел 2 "Важная информация о части ингредиентов, содержащихся в препарате" и раздел 6 "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Правильно применяйте препарат. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если симптомы заболевания усиливаются или не улучшаются через 7 дней.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?

Для лечения опрелостей и инфекционных поражений кожи, вызванных штаммами грибков, чувствительных к клотримазолу.

Фармакологическая группа: Противогрибковое средство из группы имидазолов.

2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Не применяйте препарат:

- Если у Вас или у Вашего ребенка повышенная чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к одному из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.
- Для лечения инфекции кожи головы или ногтей.

Особые предупреждения, касающиеся применения данного препарата:

- Как и другие жироодержащие препараты, например, кремы и Вазелин, Агистен Паста может снизить эффективность контрацептивных средств, изготовленных из резины, таких, как презерватив или диафрагма. Поэтому, если препарат предназначается для применения на половых органах, используйте альтернативные средства контрацепции в течение хотя бы пяти дней после применения данного препарата.
- Не применяйте данный препарат часто или продолжительный период времени без консультации с врачом.
- Не применяйте на открытых ранах.
- Избегайте контакта препарата с глазами и ртом. В случае контакта с глазами или ртом следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

До начала лечения Агистен Пастой сообщите врачу, если:

- Вы не уверены, что Вы (или Ваш младенец, в случае пеленочной сыпи) страдаете грибковой инфекцией.
- У пациента повышенная чувствительность к каким-либо продуктам питания или каким-либо лекарственным препаратам.

Если Вы или Ваш ребенок принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью:

Если Вы беременны, пытаетесь забеременеть или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или медицинским персоналом перед применением препарата.

В случае, если Вы уже сообщили врачу/медицинскому персоналу, тщательно следуйте их инструкциям.

Важная информация о части ингредиентов, содержащихся в препарате

Агистен Паста содержит шерстяной жир (wool fat), который может вызвать локализованные кожные эффекты (например, контактный дерматит).

3. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ?

Уточните у врача или фармацевта, если Вы в чём-либо не уверены. Если препарат был выписан для Вас врачом, следуйте его указаниям.

Если Вы приобрели препарат без рецепта, тщательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

- **Принятая дозировка** обычно: следует смазывать пораженный участок 2-3 раза в день.
- Способ применения:

Нанесите равномерно тонкий слой пасты на чистую, сухую и проветриваемую кожу и вотрите его в кожу путём нежного массирования. Обычно достаточно небольшого количества длиной в ½ см пасты для покрытия участка величиной с ладонь.

Продолжительность лечения зависит от вида инфекции. В общем, необходимо применять препарат хотя бы 2 недели, но возможно, что для лечения потребуются 4 недели.

В случае инфекции стопы желательно также использовать противогрибковую пудру. Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом для получения рекомендации определенного средства.

Симптомы кожной инфекции, такие, как зуд и болезненность, должны улучшиться через несколько дней лечения. В то же время такие признаки, как покраснение и шелушение кожи могут исчезнуть через более продолжительное время. Если симптомы продолжаются, посоветуйтесь с врачом.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Только для наружного применения.

Не вводите препарат в рот и не глотайте его.

Если по ошибке ребёнок или кто-либо другой проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Если Вы забыли применить препарат в требуемое время, примените его как можно скорее и продолжите лечение, как обычно.

Как способствовать успешному лечению?

- Несмотря на то, что пораженный участок чешется, старайтесь избегать расчесывания. Расчесывание нанесет вред поверхности кожи и таким образом приведет к еще большему распространению инфекции.
- Содержите пораженный участок в чистоте.

- Влажность способствует размножению грибков, поэтому необходимо содержать пораженный участок сухим, но избегайте излишнего натирания.
- Мойте пораженный участок и высушивайте его перед каждым нанесением препарата. В промежутках между процедурами можно пользоваться противогрибковой пудрой для подсушивания.

- Всегда мойте руки после обработки инфицированного участка, во избежание распространения инфекции.
- Не используйте общие с другими людьми полотенца, коврик в ванной и тому подобное, поскольку инфекция может перейти на них.

- При лечении ног -
 - Важно их тщательно мыть и насухо вытирать, в особенности, участки между пальцами.
 - Желательно пользоваться носками из хлопка; избегайте носков из шерсти или синтетических материалов. Желательно менять носки несколько раз в день (в зависимости от интенсивности потоотделения).
 - Тщательно стирайте носки, нейлоновые носки и колготки в горячей воде, чтобы удалить всю отшелушившуюся кожу или споры грибков.
 - В подходящие сезоны рекомендуется носить сандалии без носков.

- Не принимайте препараты в темноте! Проверяйте этикетку и дозу каждый раз перед применением препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Отчет о побочных явлениях:

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или, зайдя по ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il>

Кроме того, Вы можете сообщить в компанию по следующему адресу:

www.perrigo-pharma.co.il

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Данный препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.

- Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке/тюбике. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

- Храните при температуре ниже 25°C. После первого открывания можно пользоваться в течение 6 месяцев.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В дополнение к активному ингредиенту, препарат также содержит:

Wool fat, kaolin, paraffin white soft, isopropyl myristate, zinc oxide, titanium dioxide, heavy liquid paraffin, dimethicone, squalane, propyl parahydroxybenzoate, butyl hydroxy toluene.

- Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:
Алюминиевый тюбик, содержит 30 граммов пасты бело-кремового цвета.

Производитель и владелец лицензии:

Падагис Израиль Фармацевтика Лтд, п/я 16, Иерусалим.

Откорректировано в Октябре 2021, в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения.

Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения:

14739.33586