

עלון לצרכן לפי התנודות התרופתיות (מכשירי)

השתי"ל – 1986

התרופה משוקלת על פי מרשם רופא בלבד

יורוציט-קיי mEq 10

טבליות בשחרור מושהה

החומר הפעיל נקבעת:

כל כטילה ששחרר מחשורה מכלילה אשלגן סיטראט 1000 מ"ג (כמו 1000 Potassium citrate) לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנו ראה טעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סוף כטרים שתמשם בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות פנה אל הרופא או אל חוקרת.
התרופה זו נרשמה לטיפול בנזק, אל תעביר אותה לאחרים.
חיי עלולה להיקל להם אפילו אם רואה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה מיועדת למבוגרים מעל גיל 18.

1. למה מועדת התרופה?

• לטיפול בחמצת אכזבית היליה (renal tubular acidosis) עם אבני סלנין.
• לטיפול בסיון סידן אוקסלאט בבליות (נפרוליתזאיס) אשר נקבעים מרומח נמוכות של ציטראט בשתן, מכל סיבה שהיא.
• לטיפול באבני מוצצה אורית עם או ללא אבני סלנין.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אשלגן סיטראט) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים, החומר הפעיל מופיע בתחילת העלון לפני טעיף 1 והמרכיבים הבלתי פעילים מפורטים בטעיף 6.
• יש לך הפרקלמיה (יתר אשלגן בדם) או מבצים אשר מעלים את הסיכון להפרקלמיה, כגון: אי ספיקת כליות כרונית, סוכרת, לא סמונת, התחבצות הרפיה, פעילות גופנית מומצנת, באגשיים שאינם, כנסני-איסטיקה בלומת צורת הכתיה, פירוק גורר של קרומת או נטייה הרופח משומרת סמוג "אגרי אשלגן" (כגון טראמטורן, ספיומולאקטון או אמילוריד). זאת מנחר וזליה מספר של ידחי האשלגן בדם עלולה לרומח דומם לב, • יש לך בעיות במערכת הרפיה אשר עלולות לרומח לרומח לרומח או נעירה של מעבר הטבליה במערכת העינקל, כגון נעקב בריקון הרכיה, היצרות החשם, חסימת או היצרות העטפים או אם אתה נטיל תרופה אנטיאקטורית.
• יש לך כבד עומלי.
• יש לך דלקת פעילה בדרתי השתן.
• אתה נכבד מאי ספיקת כליות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• לפני תחילת הטיפול ב"ורוציט-קיי" ספרי לרופא אם:
• אתה נכבד מבעיה בהרפשת אשלגן, צורוציט-קיי עלול לגרום להפרקלמיה (יתר אשלגן בדם) דומם לב, הפרקלמיה אשר עלולה להיות מסכנת חיים, ישולה ישולה להתפתח בהירוקת וילא הסמוסיים, יש להמנע משימוש צורוציט-קיי במוליים אשר סמוגים מאי ספיקת כליות כרונית או כי מצב אחר שעשוע בהרפשת האשלגן (כגון, נזק חמור בעירי הרלב או אי ספיקת לב), הרופא יבצע בדיקות תוספתות (אם ספיר "בדיקות מעוקב").
– השימוש בתרופה עלול לגרום לזקק בדרגות שונות בריאות גופו העינקל, בפריה ומופיעים סימנים כמו תסמנת חמורת, כאב כגון או ידיומח ממערכת הרפיה, יש להפסיק מיד את השימוש בתשישי וזעפות מדי לרופא.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות אלל מרשם ומספיק תזונה, ספרי על כך לרופא או לוקח ביחוד אם אתה לוקח:
**•תרופות משתנות סמוג "אגרי אשלגן" כגון טראמטורן, ספיומולאקטון או אמילוריד, שימשוך בתרופות אלה עם צורוציט-קיי עלול לגרום להאיסטיקה המזיה וזקן אין להשתמש בכן ביחומית (ראה טעיף 1) אין להשתמש בתרופה.
• תרופות אשר מוזגות או זמן המעבר במערכת העינקל, כגון תרופות אנטיאקטוריות (ראה טעיף 1) אין להשתמש בתרופה.
• השימוש בתרופות אלה עם צורוציט-קיי עלול לגרום לזקק במערכת הרפיה, יש להפסיק מיד את השימוש בתשישי וזעפות מדי לרופא.
• תרופות סמוג "דיסטיס".**

שימוש בתרופה ומזון

יש לקחת בידוד עם אחרות או תוך 30 דקות לאחר האכלה.
שימוש בסופה בתרופה זו, על להמנע מסוכלה מזון סמוג כמוט בנהיה של מלח וכן מחוספת מלח למזון, כמו כן, יש להשתות הרבה במשך הטיפול בתרופה.

הריון ותקרה

אם את הריגין או מניקה יש להיוועץ בתופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.
לא ידוע האם צורוציט-קיי עלול להזקק לעובר או האם התרופה עשורת לרומח באם זול כן השימוש בתרופה בנישים בהריון מומקדת ריגון על פי הוראת הרופא בלבד ורק לאחר שהרופא החליט כי הדבר הכרחי.

שימוש גופרתי

בטיעות עלולות השימוש בתרופה צורוציט-קיי לא נבדקו בילדים.

3. כיצד שתמשם בתרופה?

• תמיד יש להשתמש לפי הוראת הרופא, עלוך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אקיר בטוח.

המינון ומזון הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המוקבל בדרך כלל הוא:
סמוג לטריטט ממוג בשתן

המינון ההתחלתי חינו mEq 60 יום, יש לקחת 3 טבליות פעמיים כיום או 2 טבליות שלוש פעמים כיום, על פי תוצאות בדיקות השתן, הרופא יחליט האם יש לשנות את המינון סמוג צורוציט-קיי על עד תוצאת בשתן.
המינון ההתחלתי חינו mEq 30 יום, יש לקחת טבליה אחת שלוש פעמים כיום, על פי תוצאות בדיקות השתן, הרופא יחליט האם יש לשנות את המינון.

אין לטבור על המנה המומלצת.

• יש לרובות משומות סמוג.
• אין לכתוש, ללעס או למצוץ את הטבליה.
• מניסולים עלולים לרואת באמה חלזי טבליה שאינם מתמוססים, יש להיוועץ בתופא אם קשור לך רכיבוע את הטבליה או אם אתה חשו בטבליה נקבעת ברוק.

בדיקות מעוקב:

הרופא יבצע בדיקות שתן בתחילת הטיפול, לאחר שינוי מינון וכן באופן קבוע כל מספר חודשים, כמו כן, הרופא יבצע בדיקות אגב, הסמוסיים.

הרופא יבדוק את רומח האלקטרוליטים בדם (נתרון, אשלגן, סלנין, מופרן וזן המנון), קרואניום בדם ומספרת דם מלאה כל ארבעה חודשים ובחידויות כבודה חיה בחולים עם מחלת לב, כליות או חמרת.

היבטים להשיגות הבדיקות, הרופא יחליט בבעד להמנען הסיכוי, אם נטלית בשעות מינון גבוה יצוה, אתה עלול לסבול מהפרקלמיה, בדרך כלל הפרקלמיה היא ללא תסמינים ועיתות לחיחי בדיקות דם זעל ידי שינויים באק.ג, חופעת לחיחי הסמוסיים בשלבים מתקדמים של הפרקלמיה כוללות שימוש שריצים דומם לב.

אם נטלית מנת יתר או אם בטעות בעל ידל מן התרופה, פנה לרופא או לזרמי משך של ביה-חיים, והבא אריות התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ בתופא.

יש להמנען בסופיה כפי שהמונען על ידי הרופא, גם אם חוו שינוי במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

• אין ליטול תרופות בחושךן בזקק התחית והמנה בכל פעם שירקן חטל תרופה, הרובב משקשים אם היך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בבעד לשימוש בתרופה, ראוועץ בתופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

סמוג כבד תרופה, השימוש בצורוציט-קיי עלול לרומח לתוספת לזויי חלקל מהמשמשים, אל תחביל למקרא שימיות תוספתות הזוזויי, יתקן וילא הסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:
– אתה נכבד להיקראת חמורת, כאב כגון או דומם ממערכת העינקל (למשל אם יש לך צואה בצבע אדום כהה או שחור), חופעת אלז עלולות להעיד על מיקוב או חסמנת העיני.

תופעות לוואי הסמוג

אי חחנת בניגון בחילות, הקאות, שלושליים יציאות רכות, תוספתות אלז נובעת מנזידי של מערכת העינקל וניתן להפסיקן על ידי לקחת תרופה עם האשלגן או התחמת המינון.

אם הוסיפה תופעת לוואי, אם אחת מופיעות הלזויי חמרתיה או כאשר אתה סובל מתוספת לוואי שלא עלניה בעלון, עלוך להתיעץ עם הרופא או חרוקח.

פיתח לרומח על תוספתות זוזויי למשרד הבריאות באמצעות לזווה על היטעור, זוזויי על תוספתות לוואי עקרי סמוג "רופות" שנמצא בודי הרבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטפס מקוון לזיזוח על תופעות לוואי, או ע"י כופסר לזוזויי.

https://sideeffects.health.gov.il

5. איר לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלהו תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום ספרי, מחוץ להישג ידם וריאיים של ילדים וזן ותוספתות זעל ידי כך חמנת הרעלהו, אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורקת הרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date), חופעת על גבי האריות, תאריך התפוגה מתייחס לזמן הסמוסיים של אותו טעיף.

• יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

• לזווה הפסידה הרפשהה ניתן להשתמש עד לתאריך התפוגה של הסמוסיים.

• יש לאחסן ביחכל סונו חרוב.

• יש להשיקול תרופות כגון או לזושפה, שגאל את חרוקח כידד להשיקול תרופות שאינם שישמשו, אמצעים אלז יעזרו לשמור על הסוכיה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכלילה גם:
Camauba Wax and Magnesium Stearate

כיצד בריאות התרופה זומה חתון הריאה:
טבליות יורוציט-קיי 10 mEq חינו ללא צופי בצבע צהבהב, כבורה אליפטיה, 6'10" סמוסיים כצד אחד, 4" MISSION בצד שני, הסבוליות מיישוח בבקבוקי פלסטיק של 100 יציאות.

בעל היקוסות נתחבול: פרומבסטי ימא (2003) ג"מ, רח' עוקב 14, חתון חרוק: 1304-493.

הינון והתחמתו: חמרת מינון פרנהקל, פאזון, טקוס, אירל"ב.

מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 156-56-34526-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עתון זה נסח בלשון זכר, על זאת, אתה התרופה מיועדת לכבי שני המניעים.

נערוך ב: 10/2021: בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

קוד גרסה: URCT-10-BS+PL-10/21
מערקון | לתאריך [14/10/2021]