

يوروسيت-كي 10 mEq

أقرص بتحرير ممتد

المادة الفعالة وكميتها:

كل قرص بتحرير ممتد يحتوي:
يوتاسيوم سيترات 1080 ملغ (Potassium citrate 1080 mg)

لقائمة المواد الغير فعالة رجا انظر بند 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كان لديك أسئلة إضافية توجه للطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وُصف من أجلك لا تعطه للآخرين. قد يسبب لهم الضرر حتى لو بدا لك أن وضعهم الطبي مشابه.

الدواء مخصص للبالغين فوق جيل 18 سنة.

1. لأي عرض مخصص الدواء؟

- لعلاج الحمض النببي الكئوي (renal tubular acidosis) مع حصوات الكالسيوم.
- لعلاج حصوات أوكسالات الكالسيوم (تحصى الكلية) التي تنتج بسبب مستويات متدنية من السيترات في البول، جزءاً من سبب كان.
- لعلاج حصوات حمض اليوريك مع أو بدون حصوات الكالسيوم.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة (يوتاسيوم سيترات) أو لأحد مركبات الدواء الأخرى. المادة الفعالة ظاهرة في بداية النشرة قبل بند 1 والمركبات غير الفعالة مفصلة في البند 6.
- كان لديك فرط بوتاسيوم الدم أو حالات تزيد الإخطار لفرط بوتاسيوم الدم، مثل: قصور كلوي مزمن، سكري غير متوازن، جفاف حاد، نشاط رياضي مُجدد للأشخاص بدون لياقة بدنية، قصور في الغدة الكظرية، تفكك واسع للأنسجة أو تناول أدوية مدرة للبول من نوع "خازنات اليوتاسيوم" (مثل: تريامتيرين، سيبرونولاكتون أو أميلوريد). ذلك لأن زيادة إضافية بتركيز اليوتاسيوم في الدم قد تسبب سكتة قلبية.
- يوجد لديك مشاكل في جهاز الهضم التي قد تسبب تأخر أو توقف انتقال القرص في جهاز الهضم، مثل: تأخر في تفريغ المعدة، تضيق المريء، انسداد أو تضيق الأمعاء إذا كنت تتناول أدوية مضادة للخلوئين.
- كان لديك قرحة هضمية.
- كان لديك التهاب نشط في المسالك البولية.
- كنت تعاني من قصور كلوي.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

• قبل البدء بالعلاج بيوروسيتكي أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشكلة في إفراز اليوتاسيوم. يوروسيتكي قد يسبب فرط اليوتاسيوم في الدم وسكتة قلبية. فرط اليوتاسيوم في الدم قد يكون مهدداً للحياة، يمكن أن يتطور بسرعة وبدون أعراض. يجب الامتناع عن استعمال يوروسيتكي في المرضى الذين يعانون من قصور كلوي مزمن أو كل وضع آخر الذي قد يعرض بافراز اليوتاسيوم (مثل: ضرر وخيم في عضلة القلب أو قصور في القلب). سيقيم الطبيب بإجراء فحوصات دورية (انظر بند "فحوصات ومتابعة").
- استعمال الدواء قد يسبب الضرر بدرجات مختلفة لمخاطب أنبوب الهضم. في حال وظهرت أعراض مثل تقيؤ وخيم الم البطن أو نزيف من جهاز الهضم، يجب التوقف فوراً عن استعمال المستحضر والتوجه إلى الطبيب.

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية أو إضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. خصوصاً إذا كنت تتناول:

- أدوية مدرة للبول من نوع "خازنات اليوتاسيوم" مثل: تريامتيرين، سيبرونولاكتون أو أميلوريد. استعمال هذه الأدوية مع يوروسيتكي قد يسبب فرط بوتاسيوم وخيم في الدم لذلك لا يجوز استعمالها في نفس الوقت (انظر بند "لا يجوز استعمال الدواء").
- أدوية التي تنطوي زمن الانتقال في جهاز الهضم، مثل أدوية مضادة للخلوئين (انظر بند "لا يجوز استعمال الدواء"). استعمال هذه الأدوية مع يوروسيتكي قد يزيد التهيح في جهاز الهضم الذي تسببه أملاح اليوتاسيوم.
- أدوية من نوع "إنجيباليس".

استعمال الأدوية والطعام:

- يجب الأخذ سوية مع الوجبات أو خلال 30 دقيقة بعد الطعام.
- خلال العلاج بهذا الدواء، يجب الامتناع عن تناول طعام الذي يحتوي كمية عالية من الملح وكذلك عن إضافة ملح للغذاء. كذلك، يجب الابتعاد عن الشرب خلال العلاج بالدواء.

الحمل والارتضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الأدوية.
من غير المعروف إذا كان يوروسيتكي قد يعرض بالجنين أو إذا كان الدواء ينتقل لحليب الأم ولذلك استعمال الدواء في النساء الحوامل والمرضعات يكون حسب تعليمات الطبيب فقط فقط بعد أن يقرر الطبيب أن الأمر ضروري.

الاستعمال لدى الأطفال:

سلامة ونجاعة استعمال الدواء يوروسيتكي لم يُفحص لدى الأطفال.

3. كيف تستعمل الدواء؟

- دائماً يجب استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة وطريقة العلاج سيتم تحديدهما من قبل الطبيب فقط. الجرعة المتبعة عادة هي:

نقص سيترات وخيم في البول:

الجرعة الابتدائية هي 60 mEq في اليوم. يجب أخذ 3 أقراص مرتين في اليوم أو 2 أقراص ثلاث مرات في اليوم. حسب نتائج فحوصات البول، سيقدر الطبيب إذا كان يجب تغيير الجرعة.

نقص سيترات خفيف حتى متوسط:

الجرعة الابتدائية هي 30 mEq في اليوم. يجب أخذ قرص واحد ثلاث مرات في اليوم. حسب نتائج فحوصات البول، سيقدر الطبيب إذا كان يجب تغيير الجرعة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

- يجب الابتعاد عن شرب الماء.
- لا يجوز سحق، مضغ أو مص القرص.
- قد يرى المتعالجون في البراز أجزاء من القرص التي لا تذوب.
- يجب استشارة الطبيب إذا كان من الصعب عليك بلع القرص أو إذا كنت تشعر بان القرص يعلق في الحلق.

فحوصات ومتابعة:

سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات بول في بداية العلاج. بعد تغيير الجرعة وكذلك بشكل ثابت كل عدة أشهر. كذلك، سيقيم الطبيب بإجراء تخطيط كهربية القلب بشكل دوري.
سيقيم الطبيب بفحص مستوى الكهارل في الدم (صوديوم، بوتاسيوم، كلوريد، ثنائي أوكسيد الكربون)، كرياتينين في الدم وعد دم كامل كل أربعة أشهر وبوتيرة أعلى، بمرضى مع مرض في القلب الكلى أو الخماض.
حسب نتائج الفحوصات، سيقدر الطبيب بخصوص استمرار العلاج.

إذا أفرطت بتناول الجرعة عن طريق الخطأ، قد تعاني من فرط اليوتاسيوم في الدم. عادة فرط اليوتاسيوم في الدم يكون بدون أعراض ويمكن تشخيصه بخص دم أو عن طريق تحريات في مخطط كهربية القلب. الأعراض الجانبية التي تظهر في مراحل متقدمة من فرط اليوتاسيوم في الدم تشمل شلل عضلات القلب وسكتة قلبية.

إذا أفرطت بتناول الدواء أو إذا تناول طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه للطبيب فوراً أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.
إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب.
حتى لو طرأ تحسين على وضعك الصحي، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

- لا يجوز تناول أدوية في الطلاء! تحقق من الملصق والجرعة الوائفة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

ككل أي دواء، قد يسبب استعمال يوروسيتيكي أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحدة منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً للطبيب إذا:

– كنت تعاني من تقيؤ وخيم، آلام بطن أو نزيف من جهاز الهضم (على سبيل المثال إذا كان لديك براز يلون أحمر داكن أو أسود). هذه الأعراض قد تدل على قف أو انسداد في الأمعاء.

أعراض جانبية إضافية:

عدم راحة في البطن، غثيان، تقيؤ، اسهال وبرايز رخو. هذه الأعراض تنتج عقب تهيج جهاز الهضم ويمكن تقليلها عن طريق أخذ الدواء مع الطعام أو تقليل الجرعة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة عن طريق الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) التوجه للاستشارة الإلكترونية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسعير! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وإلا الرضع وبذلك تمنع التسعير. لا يجوز التسبب بالتقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.
- بعد الفتح لأول مرة يمكن الاستعمال حتى تاريخ انتهاء الصلاحية للمستحضر.
- يجب التخزين في وعاء مغلق جيداً.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الطرق تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة، الدواء يحتوي أيضاً:

Carnauba Wax and Magnesium Stearate

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص يوروسيتيكي 10 mEq هي بنون غلاف بلون يعطى إلى الأصفر، على شكل بيضوي، "610" موسوم على جهة واحدة و- "MISSION" على الجهة الأخرى.

تأتي الأقراص بقفائي بلاستيك تحتوي 100 وحدة.

صاحب التسجيل وعنوانه: فارما بيست، إستراد (2003) م.ض.، شارع شنتكار 14، بيباح تكفا 4951394.

المنتج وعنوانه: شركة ميشن فارما كال، بورن، تكساس، الولايات المتحدة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

156-56-34526-00

للتبسيط وتسهيل القراءة، صيغت هذه النشرة بلسان المذكر، بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تنقيحها في: 10/2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.