

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הוטרינרית, צורתה וחוזקה
פטרקסימין טבליות תוך רחמיות וטרינרי.

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון
כל טבליה (4 גרם) וגינלית מכילה:
ריפקסימין 300 מ"ג

Rifaximin 300 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13.

3. למה מיועדת התרופה
לטיפול ומניעה של זיהומים גניטליים לאחר המלטה קשה, צניחת רחם, לטיפול בעצירת שליה, זיהומי רחם (Lochiometra), מטריטיס, אנדומטריטיס, צרביציטיס או וולווגיניטיס.

קבוצה תרפויטית- אנטיביוטיקה לשימוש תוך רחמי.

4. התוויות נגד
אין להשתמש בבעלי חיים הידועים כבעלי רגישות יתר לריפקסימין (החומר הפעיל) או לאחד מהמרכיבים הבלתי פעילים.

5. תופעות לוואי

לא דווחו תופעות לוואי.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה:

מעלי גרה גדולים וסוסות, חזירות ומעלי גרה קטנים.

7. מינון ואופן המתן

את הטבליות התוססות יש להחדיר דרך הנרתיק לרחם.

מעלי גירה גדולים וסוסות:

מטריטיס, אנדומטריטיס, צרביציטיס: 4 טבליות תוססות במנה אחת או 2+2 במרווח של 24 שעות.

וולווגיניטיס: 1+1 במרווח של 24 שעות.

עצירת שליה: 4 טבליות במנה אחת.

עזרה בהמלטה: 2 טבליות במנה אחת.

חזירות ומעלי גירה קטנים:

מטריטיס, אנדומטריטיס, צרביציטיס, וולוגיניטיס: 2 טבליות במנה אחת או 1+1 במרווח של 24 שעות.
עצירת שיליה: 2 טבליות במנה אחת.
מניפולציות מילדות ידניות או מכניות: 1 טבליה במנה אחת.
במקרי עצירת שיליה אם אין הפרדות תוך 24-12 שעות ממתן הטיפול, יש להחדיר 2 טבליות נוספות לרחם.

8. אופן השימוש בתכשיר

טבליות תוססות להחדרה דרך הנרתיק לרחם.

9. זמן המתנה:

אין צורך בזמן המתנה לחלב או לבשר.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחית המטרה
 - אין
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
 - אין
- הריון והנקה של בעל החיים המטופל
 - מיועד לשימוש בתקופה שלאחר ההמלטה. השימוש בפטרוקסמין טבליות תוססות מותר בתקופת ייצור החלב.

• תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות

○ לא ידועות.

• מינון יתר

○ לא דווח על השפעות כתוצאה ממתן של מינון יתר.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C, במקום יבש ולהגן מפני אור וחום.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם: Anhydrous Lactose, Microcrystalline cellulose, Sodium hydrogen carbonate, Anhydrous citric acid, Magnesium stearate, Colloidal anhydrous silica

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

קופסאות של 12 או 36 טבליות תוססות באריזת מגשית (בליסטר).
טבליות מלבניות בצבע כתום המיועדות למתן תוך רחמי, בעלות קצוות בהירים
מעוגלים ומתמשכים. עם קו חציה במרכזן.

יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

- **בעל הרישום:**

ROMAT LTD., HA'MAAPILIM 39/104 , HERZLIYA 4654327

- **יצרן:**

FATRO S.P.A., ITALY
VIA EMILIA 285 - 40064 ,OZZANO EMILIA, BOLOGNA, ITALY

- **מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:**
081-41-92212

- **נערך ביולי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**
