

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986**  
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبية فقط

يوصى بأن تطلب من شخص قريب منك أن يقرأ هذه النشرة.

أريبيپرازول ساندوز® 5

أريبيپرازول ساندوز® 10

أريبيپرازول ساندوز® 15

أريبيپرازول ساندوز® 30

أقراص

**المادة الفعالة وكميتها:**

يحتوي كل قرص أريبيپرازول ساندوز 5 على أريبيپرازول 5 ملغ aripiprazole 5mg، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على 71.02 ملغ مونوهيدرات اللاكتوز.

يحتوي كل قرص أريبيپرازول ساندوز 10 على أريبيپرازول 10 ملغ aripiprazole 10mg، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على 65.97 ملغ مونوهيدرات اللاكتوز.

يحتوي كل قرص أريبيپرازول ساندوز 15 على أريبيپرازول 15 ملغ aripiprazole 15mg، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على 97.75 ملغ مونوهيدرات اللاكتوز.

يحتوي كل قرص أريبيپرازول ساندوز 30 على أريبيپرازول 30 ملغ aripiprazole 30mg، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على 196.50 ملغ مونوهيدرات اللاكتوز.

لقائمة المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في المستحضر، انظر من فضلك البند "معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحيّة وحالتهم.

هذا الدواء غير مُعدّ للأطفال دون سن 6 سنوات.

**1. لم أعد أريبيپرازول ساندوز؟**

أريبيپرازول ساندوز 5، 10، 15، 30 معدّة:

لعلاج الفصام.

لعلاج حالات الهوس بدرجة معتدلة حتى شديدة، كجزء من اضطراب ثنائي القطب من النوع 1، ولمنع نوبات هوس جديدة لدى معالجين مرضهم الأساسي هو نوبات هوس، وقد استجابت نوبات الهوس لديهم في الماضي للعلاج بأريبيپرازول.

بالإضافة إلى ذلك، أريبيپرازول ساندوز 5، 10، 15 معدّة:

لعلاج مدمج للاكتئاب السريري الشديد (major depressive disorder MDD) لدى مرضى استجابوا جزئياً للعلاج بمضادات الاكتئاب.

لعلاج عدم الهدوء (irritability) المتعلق باضطراب التوحد لدى الأطفال (في أعمار 6-17 سنوات).

**الفصيلة العلاجية:** مضادات دهان لا نمطية.

## 2. قبل استعمال أريبيرازول ساندوز

### يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسا (لديك حساسية) لأريبيرازول أو لكل واحد من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6: "معلومات إضافية").

### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال أريبيرازول ساندوز قبل العلاج بأريبيرازول ساندوز، أخبر الطبيب إذا:

- يجب إبلاغ الطبيب فوراً في حال كانت لديك أفكار انتحارية، أفكار لإلحاق الضرر بنفسك، لأنه تم الإبلاغ عن أفكار وسلوكيات انتحارية أثناء العلاج بأريبيرازول.
- كنت تعاني من مستوى مرتفع من السكر في الدم (الذي يتميز بأعراض مثل العطش المتزايد، كثرة التبول، زيادة الشهية، وضعف) أو إذا كان لديك ماضٍ عائلي من السكري.
- كنت تعاني من نوبات صرع، لأن الطبيب سيرغب في متابعة حالتك بعناية كبيرة.
- كنت تعاني من حركات عضلية غير مسيطر عليها وغير منتظمة، لا سيما في منطقة الوجه.
- كنت تعاني من أمراض قلبية وعائية (القلب والأوعية الدموية)، كان لديك ماضٍ عائلي من أمراض قلبية وعائية، ضغط دم غير سليم، سكتة دماغية أو سكتة دماغية عابرة (mini stroke).
- كنت تعاني من خثرات دموية أو ماضٍ عائلي من الخثرات الدموية، لأن هناك علاقة بين الأدوية المضادة للذهان وبين تشكّل خثرات دموية.
- عانيت في الماضي من الإدمان على القمار.

أخبر الطبيب إذا لاحظت أنه طرأ ارتفاع على وزنك، إذا واجهت صعوبات في الابتلاع أو تعرضت لأعراض تحسسية، حركات لا إرادية، تُعاس يؤثر في النشاطات اليومية.

إذا كنت مسناً تعاني من الخرف (فقدان الذاكرة والقدرات الذهنية الأخرى)، عليك أنت أو على من يعتني بك إبلاغ طبيبك إذا تعرضت لسكتة دماغية أو لسكتة دماغية عابرة (mini stroke).

يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا عانيت من تصلب العضلات أو نقص المرونة المصحوب بالحمى، التعرق المفرط، التغييرات في الحالة النفسية، أو نظم قلب غير منتظمة أو متزايدة.

يجب إبلاغ طبيب العائلة إذا لاحظ أفراد عائلتك/المعالج الخاص بك، أنك تعاني من دوافع أو رغبات للقيام بسلوكيات شاذة، أو إذا كنت غير قادر على مقاومة دوافع للقيام بخطوات معنية قد تلحق ضرراً بك أو بالآخرين. تدعى هذه السلوكيات "اضطرابات السيطرة على الدوافع"، وقد تتضمن سلوكيات مثل القمار المرضي، فرط الأكل، أو التبذير المالي المفرط، الدافع الجنسي الشاذ أو الانتشغال المفرط بالجنس إضافة إلى زيادة الأفكار أو المشاعر الجنسية.

قد يلائم الطبيب الجرعة أو قد يوصي بإيقاف استعمال الدواء.

قد يسبب أريبيرازول ساندوز النعاس، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، دوخة وتغييرات في قدرتك على التحرك والحفاظ على التوازن، وقد تسبب هذه الأعراض السقوط. يجب توخي الحذر بشكل خاص إذا كنت مسناً أو كنت تعاني من أي ضعف كان.

يُمنع استعمال المستحضر لغرض يختلف عن الغرض الذي وُصف من أجله.

### الفحوصات والمتابعة

أثناء العلاج بهذا الدواء قد ينخفض ضغط الدم، لهذا عليك أن تخضع لمتابعة طبية، وتنجز فحوصات ضغط دم منتظمة.

### الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير معدّ للاستعمال لدى الأطفال دون سن 6 سنوات.

## التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع: قد يزيد أريبيرازول ساندوز تأثير هذه الأدوية.
- أدوية لعلاج اضطرابات وتيرة نظم القلب (مثل كينيدين، أميودارون، فليكاينيد)، أدوية ومكملات غذائية لعلاج الاكتئاب والقلق (مثل: فلوكسيتين، پاروكستين، فينلافاكسين، St. John's Wort)، أدوية لعلاج العدوى الفطرية (مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول)، أدوية معينة لعلاج عدوى الـ HIV (مثل إيفافيرينز، نفيراپين، مثبطات بروتياز مثل إندينافير، ريتونافير)، أدوية لعلاج الصرع (مثل كاربامازيبين، فينيتوين، فينوباربيتال)، أدوية مضادات حيوية معينة لعلاج السل (ريفابوتين، ريفامبيسين) – قد تزيد هذه الأدوية خطر حدوث أعراض جانبية أو قد تخفف تأثير أريبيرازول ساندوز. إذا شعرت بأعراض استثنائية أثناء استعمال هذه الأدوية مع أريبيرازول ساندوز، عليك مراجعة الطبيب.

- أدوية ترفع مستوى السيروتونين: تربيتانات (مثل سوماتريبتان وزولميتريبتان) المستعملة لعلاج الشقيقة، ترامادول (لعلاج الآلام)، تريپتوفان، مضادات الاكتئاب من مجموعة SSRIs (مثل پاروكستين، فلوكسيتين)، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل كلوميبرامين وأميترپيتلين)، بيتيدين (مضاد للآلام)، هيبيريكوم (St. John's Wort)، فينلافاكسين. قد تزيد هذه الأدوية خطر حدوث أعراض جانبية. إذا شعرت بأعراض استثنائية أثناء استعمال هذه الأدوية مع أريبيرازول ساندوز، عليك مراجعة الطبيب.

## استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام.

## استعمال أريبيرازول ساندوز واستهلاك الكحول

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الكحولية أثناء فترة العلاج بالدواء.

## الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تخطين للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل العلاج بهذا الدواء.

قد تحدث هذه الأعراض لدى أطفال كانت قد تناولت أمهاتهم الدواء خلال الثلث الأخير (الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل): رجفان، تصلب و/أو ارتخاء العضلات، نعاس، عصبية، صعوبات في التنفس، وصعوبات في إطعام الرضيع. في حال كان رضيعك يعاني من أحد هذه الأعراض - راجعي الطبيب فوراً.

إذا كنت تتناولين أريبيرازول ساندوز، عليك استشارة الطبيب لمعرفة إذا كان يمكنك إرضاع طفلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الفائدة التي تجنيها من العلاج والفائدة التي يجنيها طفلك من الرضاعة. لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بالدواء. عليك استشارة الطبيب حول الطريقة الأفضل لإطعام طفلك خلال العلاج بالدواء.

## السياقة واستعمال الماكينات

قد يضعف استعمال هذا الدواء اليقظة، وقد يؤدي إلى دوخة ومشاكل في الرؤية، لذلك لا يجوز لك السياقة أو تشغيل الماكينات الخطيرة أو ممارسة النشاطات التي تتطلب اليقظة حتى تعرف كيف يؤثر الدواء فيك.

## معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء

يحتوي هذا الدواء على لاكتوز. إذا أخبرك الطبيب أنك تعاني من عدم القدرة على تحمل سكريات معينة، اتصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

## 3. كيف تستعمل أريبيرازول ساندوز؟

عليك استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

الفصام واضطراب ثنائي القطب: الجرعة المتبعة للبالغين هي 15 ملغ، مرة في اليوم. غير أنه، قد يصف لك الطبيب جرعة منخفضة أكثر أو مرتفعة أكثر، حتى حد أقصى مقداره 30 ملغ، مرة في اليوم.

للمراهقين من عمر 15 عاما وما فوق، في بداية العلاج، قد يُعطى أريبيپرازول ساندوز بجرعات منخفضة أكثر، ثم تتم زيادتها تدريجيا حتى جرعة اعتيادية مقدارها 10 ملغ مرة في اليوم. ولكن، قد يصف لك الطبيب جرعة منخفضة أكثر أو مرتفعة أكثر، حتى حد أقصى مقداره 30 ملغ، مرة في اليوم.

علاج مدمج للاكتئاب السريري (major depression): الجرعة الابتدائية المتبعة هي 2.5 ملغ (يمكن استعمال مستحضر آخر يتضمن أريبيپرازول للحصول على هذه الجرعة) حتى 5 ملغ في اليوم. إذا دعت الحاجة، قد يرفع الطبيب الجرعة تدريجيا.

علاج عدم الهدوء المتعلق باضطراب التوحد لدى الأطفال: الجرعة الابتدائية المتبعة هي 2.5 ملغ في اليوم (يمكن استعمال مستحضر آخر يتضمن أريبيپرازول للحصول على هذه الجرعة). يرفع الطبيب الجرعة تدريجيا إلى 5 حتى 15 ملغ في اليوم، وفق استجابة كل معالج للدواء.

إذا شعرت أن تأثير الدواء قوي جدا أو ضعيف جدا، استشر الطبيب أو الصيدلي.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

يجب ابتلاع الدواء مع الماء. لا يجوز سحق القرص/شطره/مضغه.

حاول تناول الدواء في أوقات ثابتة كل يوم.

**إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى**

أبلغ معالجون تناولوا جرعة مفرطة من الدواء عن الأعراض التالية:

- نبض سريع، اهتياج/عدوانية، مشاكل في الكلام.
- حركات استثنائية (لا سيما في منطقة الوجه واللسان) وانخفاض مستوى الوعي.

تشتمل الأعراض الأخرى على:

- ارتباك حاد، تشنجات (داء الصرع)، غيبوبة (coma)، دمج من الحمى، التنفس السريع، والتعرق.
- تصلب العضلات، نوم خفيف أو نُعاس، تنفس بطيء، اختناق، ضغط دم مرتفع أو منخفض، وتيرة نظم قلب غير سليمة.

إذا تناولت جرعة مفرطة عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى فورًا، مصطحبًا عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المداومة على العلاج تبعاً لتوصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

**يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.**

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### **4. الأعراض الجانبية**

كجميع الأدوية، يمكن أن يسبب استعمال أريبيپرازول ساندوز أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

أعراض جانبية منتشرة (تظهر لدى 10-1 مستعملين من أصل 100):

سكري، تشنجات أو حركات غير إرادية، صداع، تعب، تقيؤات، غثيان، شعور بالانزعاج في المعدة، إمساك، إفراز لعاب مفرط، دوخة، صعوبات في النوم، قلق وشعور بعدم الهدوء، صعوبة في الوقوف أو الجلوس في مكان واحد، تعذر الجلوس (شعور بانزعاج داخلي من عدم الهدوء وحاجة ملحة لمتابعة التحرك كل الوقت)، نُعاس، رجفان، تشوش الرؤية.

أعراض جانبية ليست شائعة (تظهر لدى 10-1 مستعملين من أصل 1,000):

فرط إفراز هرمون البرولاكتين؛ مستويات مرتفعة من السكر في الدم؛ زيادة الاهتمام الجنسي أو تغيير الاهتمام به؛ حركات غير إرادية في الفم، اللسان والأطراف (dyskinesia tardive)؛ اضطراب في العضلات يؤدي إلى تشنجات (dystonia)؛ متلازمة تملل الساقين، انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، الذي قد يؤدي إلى دوام أو إغماء؛ نبض سريع؛ رؤية مزدوجة؛ حساسية العينين للضوء؛ اكتئاب؛ تجشؤات.

أعراض جانبية وتيرة انتشارها غير معروفة (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):  
مستويات منخفضة من خلايا الدم البيضاء؛ مستويات منخفضة من الصفائح الدموية؛ رد فعل تحسسي (مثل تورم الفم، اللسان، الوجه والحنجرة، حكة، طفح)؛ إصابة بالسكري أو تفاقم سكري قائم، حمض كيتوني سكري (أجسام كيتونية في الدم والبول) أو سبات؛ مستوى سكر مرتفع في الدم؛ مستوى صوديوم منخفض في الدم؛ فقدان الشهية (anorexia)؛ انخفاض الوزن؛ ارتفاع الوزن؛ أفكار انتحارية، محاولات انتحارية وانتحار؛ شعور بالعدوانية؛ نقص الهدوء؛ عصبية؛ متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (Neuroleptic malignant syndrome, NMS) – هذه المتلازمة هي دمج من أعراض مثل الحمى، تيبس العضلات، تنفس أسرع، تعرّق، انخفاض حالة الوعي وتغييرات مفاجئة في ضغط الدم وتيرة نظم القلب؛ اختلاجات، متلازمة السيروتونين (التي تتميز بشعور مفرط بالابتهاج، نعاس، انعدام الرشاقة، نقص الهدوء، شعور بالسكر، حمى، تعرّق أو تيبس العضلات)؛ اضطرابات في الكلام؛ ثبات مقلتي العينين في وضعية واحدة؛ موت مفاجئ مجهول السبب؛ نبض غير سليم يشكل خطراً على الحياة؛ نوبة قلبية؛ بطء وتيرة نظم القلب؛ خثرات دموية في الأوردة، لا سيما في الساقين (تشتمل الأعراض على تورم، ألم واحمرار الساق)، وقد تنتقل هذه الخثرات الدموية من الأوردة إلى الرئتين وقد تسبب ألماً في الصدر وصعوبات في التنفس (إذا اختبرت هذه الأعراض، توجه إلى الطبيب حالاً)؛ ضغط دم مرتفع؛ إغماء؛ استنشاق غير إرادي للطعام إلى المسالك التنفسية مع خطر حدوث التهاب في الرئتين؛ تشنج العضلات في منطقة الأوتار الصوتية؛ التهاب البنكرياس؛ صعوبة في الابتلاع؛ إسهال؛ انزعاج في البطن؛ انزعاج في المعدة؛ قصور عمل الكبد؛ التهاب في الكبد؛ اصفرار الجلد والعيون؛ مستويات غير سليمة في إنزيمات الكبد؛ طفح جلدي؛ حساسية الجلد للضوء؛ صلغ؛ تعرّق مفرط؛ ردود فعل تحسسية خطيرة مثل متلازمة رد الفعل الدوائي مع فرط الحمضات والأعراض الجهازية (متلازمة DRESS) تبدأ هذه المتلازمة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا مع طفح في الوجه، ثم ينتشر هذا الطفح، حمى، تضخم الغدد الليمفاوية، ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد في فحوصات الدم وارتفاع نوع معين من خلايا الدم البيضاء (eosinophilia)؛ انحلال العضل بشكل غير طبيعي، الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الكلى؛ آلام في العضلات؛ تيبس العضلات؛ سلس البول؛ صعوبة في التبول؛ أعراض الفطام لدى المواليد في حال تعرضهم للدواء خلال الحمل؛ انتصاب مستمر و/أو مؤلم؛ صعوبة في ضبط حرارة الجسم أو دفاء متزايد؛ آلام في الصدر؛ تورم راحتي اليدين، الكاحلين أو راحتي القدمين؛ في فحوصات الدم - ارتفاع أو تغييرات في مستوى السكر، ارتفاع مستويات الهيموجلوبين السكري في الدم؛ نقص القدرة على مقاومة الدوافع أو الإغراءات للقيام بأعمال قد تلحق ضرراً بك أو بالآخرين (مثل: دافع مبالغ به للمقاومة رغم التأثيرات الشخصية أو العائلية الخطيرة؛ تغيير أو زيادة الاهتمام الجنسي أو السلوك الجنسي الذي يقلقك أنت والآخرين، مثلاً: زيادة الدافع الجنسي؛ مشتريات مبالغ بها وغير مسيطر عليها، فرط تناول الطعام [تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة] أو تناول الطعام القهري [تناول كميات من الطعام أكبر من المعتاد وأكثر من الكمية التي تحتاجها للشعور بالشبع]، ميل إلى التشرد).

أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال والمراهقين:  
لدى المراهقين في سن 13 عاماً وأكثر، شوهدت أعراض جانبية شبيهة من حيث الوتيرة والنوع بتلك التي شوهدت لدى البالغين، فيما عدا: النعاس، التشنجات أو الحركات غير الإرادية، عدم الهدوء والتعب وكانت منتشرة جداً (حدثت لدى أكثر من مُعالج من بين 10 مُعالجين)، كذلك كانت أعراض الألم في البطن العلوية، جفاف الفم، ارتفاع وتيرة نظم القلب، ارتفاع الوزن، زيادة الشهية، تشنجات في العضلات، حركات غير إرادية في الأطراف ودوار (لا سيما عند الانتقال من وضعية الاستلقاء أو الجلوس إلى وضعية الوقوف)، وكانت منتشرة (حدثت لدى أكثر من مُعالج من بين 100 مُعالج).

لدى الأطفال (الأعمار 6-17) الذين عولجوا بأريبيرازول شوهدت الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):  
نعاس، تعب وتقيؤات.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من أصل 100):  
نعاس، رجفان، حمى، زيادة سيلان اللعاب، انخفاض الشهية، تشنجات أو حركات غير إرادية، سبات.

أعراض جانبية ليست شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من أصل 1,000):  
تشوّش الرؤية؛ غثيان وتقيؤات، إسهال، ألم في البطن العلوية، إمساك، جفاف الفم؛ عصبية، عطش؛ التهاب في المسالك التنفسية؛ ارتفاع الوزن؛ زيادة الشهية، انخفاض الشهية؛ ألم أو تصلب العضلات؛ صداع، عدم الهدوء، دوار، تشنجات في العضلات، حركات غير إرادية، حاجة متزايدة إلى النوم؛ آلام طمثية؛ زكام، طفح جلدي.

تم الإبلاغ أكثر لدى المعالجين المسنين الذين يعانون من الخرف عن حالات الوفاة أثناء العلاج بالدواء. بالإضافة إلى ذلك تم الإبلاغ عن حالات من السكتة الدماغية أو السكتة الدماغية العابرة ("mini" stroke).

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يُخزّن أريبيرازول ساندوز؟

تجنّب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### شروط التخزين:

لا يجوز تخزين الدواء فوق 30°C.

#### 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

#### أريبيرازول ساندوز 5:

Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; Indigo Carmine (E132) aluminium lake.

#### أريبيرازول ساندوز 10:

Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172).

#### أريبيرازول ساندوز 15:

Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide yellow (E172).

#### أريبيرازول ساندوز 30:

Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172).

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أريبيرازول ساندوز معبأ في لويحات (بليستر) داخل عبوة كرتونية. تتضمن كل عبوة 30 قرصاً. أقراص أريبيرازول ساندوز 5 مستديرة، لونها أزرق، مطبوع على جانب واحد منها "SZ"، أما الجانب الآخر مطبوع عليه "444". أقراص أريبيرازول ساندوز 10 مستديرة، لونها قرنفلي، مطبوع على جانب واحد منها "SZ"، أما الجانب الآخر مطبوع عليه "446". أقراص أريبيرازول ساندوز 15 مستديرة، لونها أصفر، مطبوع على جانب واحد منها "SZ"، أما الجانب الآخر مطبوع عليه "447". أقراص أريبيرازول ساندوز 30 مستديرة، لونها قرنفلي، مطبوع على جانب واحد منها "SZ"، أما الجانب الآخر مطبوع عليه "449".

اسم صاحب التسجيل والمستورد: نوفارتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

أريبيرازول ساندوز 5: 162-95-35898-00/01

أريبيرازول ساندوز 10: 162-96-35899-00/01

أريبيرازول ساندوز 15: 162-97-35911-00/01  
أريبيرازول ساندوز 30: 162-99-35971-00/01

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.  
تم تحريرها في أيار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة