

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

بيمكتين معجون (پاستا) للخيول بيطري
6.42 غرام بمحفنة للإعطاء عن طريق الفم لعلاج الطفيليات لدى الخيول

التركيب:

Ivermectin 18.7 mg/g المركب الفعال:

مواد غير فعالة:

Apple Flavour (O/S F808-126), Polysorbate 80 Ph.Eur. Colloidal Silicon Dioxide Ph.Eur. Maize Oil Ph.Eur

المجموعة العلاجية: مضاد للطفيليات واسع المدى.

الفعالية الطبيعية: لعلاج طفيليات داخلية، التي تشمل:

Large redworms: adult and arterial and 4th larval [arterial] stage of *Strongylus vulgaris*, adults and 4th larval [tissue] stages of *S.edentatus*, [adults] of *S.eguinus*.

Small redworms: adult and developing immatures (4th stage larval) of the following species of small strongyles or cyathostomes: *Triodontophorus spp.* (adults), *Coroncyclus spp.*, *Cyathostomum spp.*, *Cylicocyclus spp.*, *Cylicostephanus spp.*, *Cylicodontophorus spp.*, *Gyalocephalus capitatus*, *Parapoteriostomum spp.*, *Petrovinema spp.*, *Poteriostomum spp.* (Ivermectin is not effective against encysted larval stages of the small strongyles).

Pinworms: adult and immature *Oxyuris equi*.

Lungworms: adult and immature *Dictyocaulus arnfieldi*.

Ascarids: adult and immature *Parascaris equorum*.

Stomach worms: *Trichostrongylus axei* and *Habronema muscae*.

Intestinal threadworms: *Strongyloides westeri*.

Cutaneous worms: microfilariae of *Onchocerca spp.*

Bots: mouth and stomach stages of *Gasterophilus spp.*

تحذيرات وموانع الاستعمال:

• الدواء معد للخيول فقط. من الممكن ظهور تأثيرات خطيرة لدى الكلاب، القطط والسلحف إذا ابتلعوا من الدواء أو إذا تناولوا من الوصول إلى عبوات مستعملة من الدواء.

• من المحتمل أن تتطور الطفيليات مقاومة لأنواع مستحضرات مضادة للديدان عند الاستعمال المتكرر والمترافق لمضادات الديدان من نفس النوع أو في أعقاب إعطاء جرعة منخفضة جداً، نتيجة لتقدير خاطئ لوزن الخيل أو فقدان كمية من الدواء أثناء إعطائه.

• يُمنع التدخين، الشرب أو تناول الطعام أثناء ملامستك للمستحضر. يجب الامتناع من ملامسة المستحضر للجلد أو للعينين.

• إذا لامس المستحضر جلدك، يجب فوراً غسل الجلد الذي لامس المستحضر بالماء والصابون.

• إذا دخل المستحضر عن طريق الخطأ للعينين، يجب غسلهما فوراً بالماء، والتوجه للحصول على مساعدة طبية إذا لزم الأمر.

• يجب غسل اليدين بعد الاستعمال.

• احفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

• سام جداً للأسماك والحيوانات التي تعيش في الماء. يُمنع تلوث مجمعات الماء أو القوافل بالمستحضر أو بعبوات مستعملة منه.

تعليمات الاستعمال

يجب تحديد وزن الخيل والجرعة بشكل دقيق قبل العلاج.

تحتوي المحفنة على كمية كافية لعلاج خيل بوزن 600 كغم، بحسب الجرعة الموصى بها (200 ميكروغرام Ivermectin لكل كيلوغرام وزن جسم). كل خط علامة للوزن على مكبس المحفنة يعطي كمية مرهق لعلاج 100 كيلوغرام وزن جسم. يجب تحرير الحلقة المسننة بواسطة تدويرها $\frac{1}{4}$ دوره، ودفع الحلقة على امتداد قنчив المكبس بحيث يكون جانب الحلقة الأقرب إلى وعاء المحفنة، بموازاة خط العلامة للوزن المرغوب.

قم بتدوير الحلقة المسننة $\frac{1}{4}$ دوره لإغلاقها في المكان. يجب التأكد من عدم وجود طعام في فم الخيل.

إنزع غطاء البلاستيك عن طرف المحفنة وأدخل المحفنة إلى جوف ما بين الأسنان (الفراج ما بين الأسنان الأمامية والأسنان الخلفية). اضغط على المكبس وادهن المعجون خلف لسان الخيل. ارفع فوراً رأس الخيل وأمسكه مرفوعاً لبعض ثوانٍ بعد إعطائه الدواء.

المستحضر هو للاستعمال لمرة واحدة فقط. يجب الاستعمال فوراً بعد فتح المحفنة للمرة الأولى. يجب رميه بعد الاستعمال. من أجل تحقيق نتائج أفضل يجب تحديد جدول زمني للعلاج بحسب الحالة الوبائية المحلية. للحصول على معلومات يجب استشارة الطبيب البيطري.

يمكن علاج إناث الخيل والأئن (إناث الحمير) في كل مراحل الحمل، كما ولم تتأثر خصوبة خيول التزاوج التي تم علاجها بالمستحضر.

فرط الجرعة: لوحظت أعراض جانبية معتدلة وعايرة في جرعة مفرطة. يمكن علاجها عرضياً.

أعراض جانبية: لوحظت لدى قسم من الخيول، أعراض انتفاخ وحكة في الجلد فترة قصيرة بعد Onchocerca العلاج. في معظم هذه الحالات، تم تشخيص الخيل كحاملين لعدوى حادة من microfilariae، وفترض أن ردود الفعل هي نتيجة لموت microfilariae بكميات كبيرة.

بالرغم من أن الأعراض تختفي بعد بضعة أيام، إلا أنه يمكن علاج الأعراض.

يجب استشارة طبيب بيطري في حالة عدم انتفاء الأعراض.

التخزين: تحت درجة حرارة -25°C.

الممنوع:

BIMEDA MTC ANIMAL HEALTH, 420 BEAVERDALE RD., CAMBRIDGE, ONTARIO N3C 2W4, CANADA

صاحب التسجيل والمستورد: إلبيزر ليفتيشن م.ض.، أدوم 6، ص.ب. 7006، المنطقة الصناعية

كانوت

رقم تسجيل الدواء: 083 51 92381

تم تحريرها في 2/2021 وفق تعليمات وزارة الصحة