

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

בימקטין פסטה לסוסים וטרינרי 6.42 גרם במזרק למתן דרך הפה לטיפול בפרזיטים בסוסים

הרכב:

המרכיב הפעיל: Ivermectin 18.7 mg/g

חומרים בלתי פעילים:

Apple Flavour (O/S F808-126), Polysorbate 80 Ph.Eur. Colloidal Silicon Dioxide Ph.Eur. Maize Oil Ph.Eur

קבוצה תרפויטית: נוגד טפילים רחב טווח.

פעילות רפואית: לטיפול בפרזיטים פנימיים הכוללים:

Large redworms: adult and arterial and 4th larval [arterial] stage of *Strongylus vulgaris*, adults and 4th larval [tissue] stages of *S.edentatus*, [adults] of *S.eguinus*.

Small redworms: adult and developing immatures (4th stage larval) of the following species of small strongyles or cyathostomes: *Triodontophorus* spp. (adults), *Coronocyclus* spp., *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Gyalocephalus capitatus*, *Parapoteriostomum* spp., *Petrovinema* spp., *Poteriostomum* spp. (Ivermectin is not effective against encysted larval stages of the small strongyles).

Pinworms: adult and immature *Oxyuris equi*.

Lungworms: adult and immature *Dictyocaulus arnfieldi*.

Ascarids: adult and immature *Parascaris equorum*.

Stomach worms: *Trichostrongylus axei* and *Habronema muscae*.

Intestinal threadworms: *Strongyloides westeri*.

Cutaneous worms: microfilariae of *Onchocerca* spp.

Bots: mouth and stomach stages of *Gasterophilus* spp.

אזהרות והתוויות נגד:

- התרופה מיועדת לסוסים בלבד. השפעות חמורות עלולות להופיע בכלבים, חתולים וצבים אם בלעו מהתרופה או אם הייתה להם גישות לאריזות משמשות של התרופה.
- עמידות פרזיטים לסוגי תכשירים נגד תולעים עלולה להתפתח בשימוש תכוף וחוזר בנוגדי תולעים מאותו סוג או בעקבות מתן של מינון נמוך מידי, כתוצאה מהערכה שגויה של משקל הסוס או איבוד מכמות התרופה בזמן המתן.
- אין לעשן, לשתות או לאכול בזמן שהנך במגע עם התכשיר. יש להימנע ממגע התכשיר עם העור או העיניים.
- אם התכשיר בא במגע עם עורך, יש לשטוף מייד את העור שבה במגע עם התכשיר במים וסבון.
- אם בטעות נכנס תכשיר לעיניים, יש לשטוף מיד במים, ולפנות לעזרה רפואית אם יש צורך.
- יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- רעיל ביותר לדגים ובע"ח החיים במים. אין לזהם מאגרי מים או תעלות עם התכשיר או אריזות משמשות שלו.

הוראות שימוש

יש לקבוע במדויק את משקל הסוס והמינון לפני הטיפול.

המזרק מכיל כמות מספקת לטיפול בסוס במשקל 600 ק"ג, לפי המנה המומלצת (200 מיקרוגרם Ivermectin לכל קילוגרם משקל גוף). כל קו סימון משקל על בוכנת המזרק נותן כמות משחה לטיפול ב-100 קילוגרם משקל גוף. יש לשחרר את הטבעת המשוננת ע"י ¼ סיבוב שלה, ולדחוף את הטבעת במעלה מוט הבוכנה כך שצד הטבעת הקרוב ביותר למיכל המזרק הוא בקו הסימון של המשקל הרצוי.

סובב את הטבעת המשוננת ¼ סיבוב לנעילה על המקום. יש לוודא כי אין מזון בפה של הסוס.

הוצא את מכסה הפלסטיק מקצה המזרק והכנס את המזרק לחלל האינטרדנטלי (הרווח בין השיניים הקדמיות לשיניים האחוריות). לחץ על הבוכנה ומרח את הפסטה בחלק האחורי של לשון הסוס. הרם מייד את ראש הסוס והחזק אותו מורם למספר שניות לאחר המתן.

התכשיר הינו לשימוש חד פעמי. יש להשתמש מיד לאחר פתיחת המזרק לראשונה. יש להשליך לאחר השימוש. על מנת להגיע לתוצאות מיטביות יש לקבוע את לוח הזמנים לטיפול בהתאם למצב האפידמיולוגי המקומי. לקבלת מידע יש להתייעץ עם וטרינר.

ניתן לטפל בסוסות ואתונות בכל שלב של ההיריון, ופוריותם של סוסי הרבעה שטופלו בתכשיר לא נפגעה.

מנת יתר: תופעות לוואי מתונות ארעיות נצפו במנת יתר. ניתן לטפל באופן סימפטומטי.

תופעות לוואי: בחלק מהסוסים נראו תופעות של התנפחות וגירוד בעור זמן קצר לאחר הטיפול. ברוב המקרים הללו, הסוסים אובחנו כנושאי זיהום חריף של *Onchocerca microfilariae*, ומניחים כי התגובות הן כתוצאה של תמותת *microfilariae* בכמויות גדולות.

למרות שהתופעות נעלמות לאחר מספר ימים ניתן לטפל בסימפטומים.

יש להתייעץ עם וטרינר אם התופעות לא נעלמות.

אחסנה: מתחת ל-25°C.

יצרן:

BIMEDA MTC ANIMAL HEALTH, 420 BEAVERDALE RD., CAMBRIDGE, ONTARIO N3C 2W4, CANADA

בעל הרישום ויבואן: אליעזר לינביץ בע"מ, אדום 6, ת.ד. 7006, א.ת. כנות, ישראל

מס' רישום התרופה: 083 51 92381

נערך ב 2/2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות