

**بخاخ معاير لأنف للبالغين**

المادة الفعالة وتركيزها

يحتوي بخاخ لاينكس على كسيلوميتازولين هيدروكلوريد 1 ملغم/مل (0.1%) Xylometazoline HCl 1 mg/ml

لاينكس® للأطفال

**بخاخ معاير لأنف للأطفال**

المادة الفعالة وتركيزها

يحتوي بخاخ لاينكس للأطفال على كسيلوميتازولين هيدروكلوريد 0.5 ملغم/مل (0.05%) Xylometazoline HCl 0.5 mg/ml

لقانمة المواد غير الفعالة، انظر من فضلك البند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بأمعانٍ حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

عليك استعمال المستحضر حسب تعليمات في بند الجرعة، من هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد مرور 3 أيام.

لاينكس معد للبالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً فقط.

لاينكس للأطفال معد للأطفال في عمر 2-12 عاماً. هذا الدواء ليس معداً للأطفال دون سن عامين.

**1. لم أعد هذا الدواء؟**

الدواء معد لتخفيض احتقان الأنف بسرعة، لمدة تصل حتى 10 ساعات.

**المجموعة العلاجية:**

يحتوي الدواء على كسيلوميتازولين هيدروكلوريد، الذي ينتمي إلى مجموعة محاكيات الودي.

يساعد الدواء على فتح مسارات الأنف وإخلائها عبر تقليل حدوث التزلازل المفرطة وإعادة الأوعية الدموية المتورمة إلى حجمها الأصلي.

**2. قبل استعمال الدواء**

لا يجوز استعمال المستحضر إذا:

• كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (كسيلوميتازولين هيدروكلوريد) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء - انظر من فضلك البند 6.

• كنت قد خضعت لاستنصال الغدة النخامية بطريق الوتد (عبر تجويف الأنف) أو عملية جراحية تم فيها الكشف عن غشاء الدماغ الخارجي في جهاز الأعصاب المركزي.

• كنت تعاني من الزرق متضيق الزوايا (narrow angle glaucoma).

• كنت تعاني من التهاب الأنف المزمن مع جفاف كبير في الممرات الأنفية (rhinitis sicca) أو (atrophic rhinitis).

• كنت تعاني من تضخم غدة البروستات.

• كنت تعاني من ورم نادر في الغدة الكظرية الذي يؤدي إلى فرط إنتاج الأدرينالين والنورأدرينالين (pheochromocytoma).

• كنت تتناول أدوية تعيق إنزيم أكسيداز أحادي الأمين (MAO inhibitors) أو إذا توفرت عن تناولها في الأيام 14 الأخيرة.

• لا يجوز استعمال لاينكس لدى الأطفال دون سن 12 عاماً.

• لا يجوز استعمال لاينكس للأطفال لدى الأطفال الذين أعمارهم أقل من عامين.

**تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء**

قبل استعمال الدواء أخير الطبيب إذا:

• كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (hyperthyroidism).

• كنت تعاني من السكري أو مرض في الأوعية الدموية (مثل متلازمة إطالة مقطع QT)

• كنت حاملاً أو مريضاً من ضغط دم مرتفع

كما هي الحال مع الأدوية الأخرى التي تخفف الاحتقان، فقد يسبب هذا الدواء اضطرابات في النوم، دوخة ورغفة لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية بدرجة كبيرة لحدث ذلك. استشر الطبيب إذا كانت هذه الأعراض تثير قلقاً لديك.

لا يجوز استعمال الأدوية التي تقلل الاحتقان لأكثر من 3 أيام متتالية. وذلك، لأن التناول المتواصل أو المفرط قد يسبب عودة أو تفاقم الاحتقان الأنف.

**الأطفال والمرافقون**

لا يجوز استعمال لاينكس لدى الأطفال دون سن 12 عاماً.

لا يجوز استعمال لاينكس للأطفال لدى الأطفال الذين أعمارهم أقل من عامين.

**التفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، أو تتناول مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

أدوية لعلاج الاكتئاب، لا سيما أدوية من مجموعة مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOI).

**الحمل، الإرضاع، والخصوبة**

لا يوصى باستعمال لاينكس أو لاينكس للأطفال أثناء الحمل.

إذا كنت حاملاً أو مريضاً، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال لاينكس أو لاينكس للأطفال.

**السيارة واستعمال الماكينات**

لا تؤثر مستحضرات لاينكس في القدرة على السيارة أو تشغيل الماكينات.

**3. كيف تستعمل الدواء؟**

عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

**الجرعة الموصى بها عادة هي:**

**بخاخ لاينكس معد للبالغين والأطفال والأطفال فوق سن - 12 عاماً:**

بخة واحدة في كل منخر، كل 10-8 ساعات، وفق الحاجة. لا يجوز بخ أكثر من 3 مرات خلال 24 ساعة في كل منخر.

**بخاخ لاينكس للأطفال معد للأطفال الذين أعمارهم 2-12 عاماً:**

بخة واحدة في كل منخر، كل 10-8 ساعات، وفق الحاجة. لا يجوز بخ أكثر من 3 مرات خلال 24 ساعة في كل منخر.

هذا الدواء ليس معداً غالباً للأطفال والرضع دون سن عامين، إلا بتوصية من الطبيب وتحت إشرافه.

لا يجوز اختيار الجرعة الموصى بها.

**مدة التناول**

الدواء ليس معداً للابتلاع، وهو معد للاستعمال في الأنف فقط.

**طريقة الاستعمال:**

• ليست هناك حاجة إلى قص فوهة القنينة. البخاخ المعاير جاهز للاستعمال.

• قبل الاستعمال للمرة الأولى، أزل الغطاء الواقي وجهز المضخة للعمل عبر الضغط عليها عدة مرات (4 مرات على الأقل)، حتى يخرج رذاذ متتجانس في الهواء. يجب توخي الحذر وتجنب ملامسة الرذاذ للعينين أو الفم.

• نظف الأنف بلطف.

• أمسك القنينة بشكل مستقيم بينما تضع الإبهام أسفل قاعدة القنينة، أما فوهة القنينة فضبعها بين كلا إصبعيك (انظر الرسم أدناه).

• انحن إلى الأمام قليلاً، ثم أدخل الفوهة في المنخر.

• اضغط على المضخة ضعفه واحدة، وفي الوقت ذاته استنشق بلطف.

• كرر العملية في المنخر الثاني.

اشطف طرف القنينة بالماء الدافئ، انتبه لا يدخل الماء إلى القنينة. جفف القنينة بمديبل ورقى نظيف. بعد ذلك، أغسلها. لتجنب نشر العدو، لا يجوز استعمال قنينة الدواء ذاتها لأكثر من شخص واحد.

**خطوات واق**

فتحة البخاخ

اتجاه الضخ

طريق الاستعمال

إذا تناولت جرعة مفرطة عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى فوراً، مصطحبًا عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في القظاء! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الجانبية**

جميع الأدوية، يمكن أن يسبب استعمال بخاخ لاينكس وبخاخ لاينكس للأطفال أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تتفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل أن لا تعاني من أي منها.

توقف عن استعمال الدواء وتوجه حالاً إلى استشارة الطبيب إذا شعرت:

• ردود فعل تحسسية قد تسبب مصعوبة في التنفس أو التنفس، تورم الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة، حكة جلدية خطيرة مصحوبة بطفح أحمر أو نتوءات جلدية.

**أعراض جانبية شائعة (common)** أو تحدث لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

• صداع

• جفاف المucus المخاطية في الأنف

• ازتعاج في الأنف

• غثيان

• تهيج موضعي بعد استعمال البخاخ

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أو تحدث لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10000:

• اضطرابات في الرؤية

• حكة مفرطة بما في ذلك طفح جلدي، حكة

• ضربات قلب (palpitations) ووتيرة نظم قلب سريعة

أعراض جانبية وبنية انتشارها غير معروفة (أعراض لم يُحدَّد شيوعاً بعد):

• شعور بالحرقة في الأنف والحنجرة

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال والرضع: يتعين على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأي عارض جانبي، وبأي دواء أضافي يحصل عليه ابنهما!

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

**الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:**

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالآثار الجانبية غير المرغوب بها عن طريق الخطأ أو عن طريق الصيادلة، على الموقع الإلكتروني "العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى استماراة على الإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

**5. كيف يخزن الدواء؟**

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأي الأطفال، وعكزاً تتجربة التسمم. لا تسبب التسمم دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريـخ انتهاء الصلاحـية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحـية هو اليوم الأخير من ذات الشهر المشار إليه.

• يجب التخزين في مكان بارد وجاف، بدرجـة حرارة أقل من 25°C.

• يمكن استعمال المستحضر حتى سنة منـذ فتح القـنينة للمرة الأولى، ولكن لا يجوز استعمالها بعد تاريـخ انتهاء سريان مفعول المستحضر.

**6. معلومات إضافية**

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Glycerol 85%, Sodium citrate 2 H<sub>2</sub>O, Citric acid monohydrate, Water

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

يبدو الدواء على شكل محلول صاف، عديم اللون تقريباً، ضمن قنينة زجاجية مع مضخة وغطاء بلاستيكي.

صاحب التسجيل وعنوانه: أميك للتسويق م.ض.، ص. ب. 8077، نتانيا (من مجموعة تيفع).

اسم المفتاح وعنوانه: ميركل GmbH، بلاوبورن 89143، ألمانيا.

تم تحرير هذه النشرة في آذار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة:

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

بخاخ لاينكس: 158.41.34689

بخاخ لاينكس للأطفال: 158.40.34687

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لبناء كلا الجنسين.