

لاتانو-أقثير، 50 ميكروغرام/مل،  
قفارات للعينين

المادة الفعالة وتركيزها:

يحتوي كل 1 مل على:

50 ميكروغرام لاتانو-أقثير (Latatanoprost 50mcg)

لقائمة المواد غير المغالة وسببيات الحساسية،  
انظر من فضلك البند "معلومات مهمة عن قسم من  
مركيبات الدواء" والمفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بمتعن حتى نهايتها وذلك قبل  
البدء باستعمال الدواء، تجنب هذه النشرة على  
معلومات موجزة عن الدواء إذا كنت تتناول الدواء

السيادة واستعمال الماكينات:  
إثناء استعمال لاتانو-أقثير، قد تعاني بشكل مؤقت  
من تشوش الرؤية، إذا حدث ذلك ثالث، لا يجوز لك

القيادة أو تشغيل الماكينات الخطيرة حتى تصيب  
رؤيتك صافية مجددا.

معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء:  
يحتوي الدواء على كلوريد البنزوكربونيوم (مادة  
حافظة)، الذي يودي به إلى تهيج العينين وقد

تتصبص العدسات الاصفحة مما يؤدي إلى تغير  
لونها. يجب تجنب الملائمة بين الدواء والعدسات  
الاصفحة اللينة. انظر البند 3 "كيف تستعمل  
الدواء؟"

قد يتسبب كلوريد البنزوكربونيوم كذلك تهيجا في  
العين، لا سيما إذا كنت تعاني من جفاف العينين  
أو من مشكل في القرنية (الطفقة الشائعة في مقدمة  
العين). إذا شاذ لديك شعور غير عادي في العين،  
وخز، أو ألم في العين بعد استعمال الدواء، اخبر  
طبيبك بذلك.

إذا كنت تعاني من ضرر خطير في القرنية (الطفقة  
الشائعة في مقدمة العين)، فقد يؤدي الوسفات في  
الحالات نادرة جدا إلى ظهور متقطع عكرقا على  
القرنية نتيجة لترانكيمالاسيوم خلال فترة العلاج.

3. كيف تستعمل الدواء؟  
• يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات  
الطبيب! عليك أن تفحص مع الطبيب أو  
بطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.  
الجرعة الموصى بها عادة هي:

قطرة واحدة في العين/العينين التي يتم علاجها/  
علاجهما مرة في اليوم، مسأة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!  
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!

• لا تستعمل الدواء أكثر من مرة واحدة في اليوم لأن  
تجاهز العلاج تخفيض إذا تم تقطير العدارات في  
أحيانا متقاربة أكثر.

انتبه: يُمنع الإبتلاء! هذا الدواء معد للاستعمال  
الخارجي فقط.

يجب استعمال الدواء وفق تعليمات طبيبك حتى  
يوصي لك بإيقاف الاستعمال.

عليك إكمال العلاج الذي أوصى لك به الطبيب.  
طريقة استعمال المستحضر - تعليمات عامة:

• لتجنب حدوث حدوبي، يجب منه لامسة طرف  
القرنية بأي شكل أفضل (بما في ذلك ملامسة الإصبع  
أو عين ذاتها). يجب المحافظة على إلقاء

قد لا تكون قنطرة ملئية؛ تهيف هذه الخطوة  
إلى العبرة بشكلاً أفضل على وترية التقطير.

• عند العلاج المدمج مع قطرات عيون أخرى،  
يجب الانتظار 5 دقائق على الأقل بين  
العلاجات.

• إذا كنت تستعمل عدسات لاصقة - يجب إزالة  
العدسات قبل استعمال المستحضر، ويمكن إعادة  
العدسات إلى العين بعد مرور نحو 15 دقيقة  
على الأقل من تقطير الدواء في العين.

• لتجنب تشتت العدوبي، لا يجوز استعمال هرمون  
الدواء ذاتها لأكثر من شخص واحد.

## كيف تستعمل قطرات:

- أولاً، أغلب يديك، أهل رأسك إلى الخلف.  
باستخدام السبابية، اسحب الجفن السفلي نحو  
الأضفاف، لاتخراج ما هو أشهى بـ "الجيب" يجب  
تقطير الدواء داخل هذا "الجيب" المتشكل. أبق عينيك  
اغضضين يديك برقف. لا تترش. أبق عينيك  
غمضتين لمدة دقيقة حتى تهيفهما.
- بعد تقطير قطرة داخل العين، فروا، اضغط  
باستعمال السبابية الضاغط لمدة دقيقة حتى تهيف العين.  
يجب مواصلة الضاغط لمدة دقيقة حتى تهيفهما  
بعد وضع القطرة داخل العين. تساعد هذه  
العملية على تجنب انتصاص الدواء في الجسم  
وبذلك تساعد على منع حدوث أعراض جانبية.
- بعد استعمال الدواء، اشطف يديك جيداً لتنقيتها  
من بقايا الدواء.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى على  
إذا سرت أكثر من قطرة واحدة في العين،  
فقد تشعر بانزعاج في العين، وقد تندم عينك  
وقد يصبح لونها أحمر. يفترض أن تزول هذه  
الأعراض، ولكن إذا كنت فلما استقرت الطبيب.  
إذا تناولت جرعة مفرطة، أو إذا ابتلع طفل بالخطأ  
من هذا الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى  
غرفة الطوارئ في المستشفى بمصحطمباً معك عبوة  
الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد،  
عليك تناوله العلاج واستعمال الجرعة القادمة  
كما هو مخطط. لا يجوز لك إطلاقاً تناول جرعة  
مضاعفة!

يجب الدعاومة على العلاج وفق توصيات الطبيب.  
حتى إذا طرأ سوء على حالتك الصحية، يمنع  
التوقف عن العلاج الدوائي من دون استشارة  
الطبيب أو الصيدلي.

• يُمنع تناول الأدوية في الظل! تحقق من  
المقص على عبوة الدواء ومن الجرعة  
الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع  
النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلنة إضافية تتعلق باستعمال  
الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية:

جميع الأدوية، قد يتسبب استعمال لاتانو-أقثير  
أعراضها الجانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع  
عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتل  
الأن تعي من أي منها.

يجب توقف حال حدوث:  
ركاماً، لفولونزاً، ألم في العضلات أو المفاصل،  
ألم في الصدر، ضربات قلب (palpitations)،  
فرط تحسس الجلد مثل تهيج التاردا.

عليك التوجه إلى الطبيب فوراً إذا:  
تطور عدوى، تعرضت لسمدة، لالتهاب الجفن،  
المتحمة، في العين أو القرنية.

أعراض جانبية شائعة جداً (حدث لدى أكثر من  
مستعمل واحد من بين 10):

• تغير لون العين تدريجياً، ثابت أحياناً، غير  
زيادة كمية التصبغ البنية في الجزء الملون من  
العين المصبى بالقولون.

إذا لم يكن لون عينيك موحداً (أزرق-بني، رمادي-بني، أصفر-بني،  
أخضر-بني) فمن المحتمل أن تحدث هذه الحالة  
لديك أكثر مقاومة لو كان لون عينيك موحداً

(عين زرقاء، رمادية، خضراء، أو بنية). قد  
ينتظر كل تغيير في لون عينيك طوال سنوات  
رغم أن هذا يحدث خلال 8 أسابيع من العلاج.

يمكن أن يكون التغيير في اللون ثابتاً وقد يكون  
بارزاً أكثر إذا كنت تستعمل دواء في عين واحدة  
فقط. يبدو أنه ليست هناك أية مشكل في اعتقاد

تغير لون العين.

• احمرار العين.  
• تبديد شعور بالحرقة، برملي في العين.  
إذا عانيت من تهيج خطير في العين بدرجة تكفي  
إلى التسبب بفتر الشعور "جسم غريب" في العين).

إذا عانيت من تهيج خطير في العين بدرجة تكفي  
إلى التسبب بفتر الشعور "جسم غريب" في العين).

- يُحفظ في العبوة الخارجية لحمايته من الضوء.
- بعد الفتح المرارة الأولى، لا يجوز التخزين بدرجة حرارة أكثر من 25°C ولا يجوز الاستعمال بعد مرور 4 أسابيع، بعد فتح الفنتنة للمرة الأولى.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء عندما يطرأ تغيير على لون المحلول أو إذا أصبح عاكراً.
- يُمنع إبقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو حاوية القمامه. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

## 6. معلومات إضافية

**إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:**

Sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate anhydrous, benzalkonium chloride solution, water for injections.

**كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:**  
تحتوي كل قنينة على 2.5 مل محلول. المحلول صاف، ويسوّق في قنينة بولي إيثيلين مع قطارة وسدادة مقاومة للصدمات.

**صاحب التسجيل و عنوانه:**  
بمواصفات مرض، شارع الملك داود 1، هرتسليا بيترات 4666101.

**الم المنتج و عنوانه:**  
فيانكس، S.A، نبا، إيرثرايا، اليونان.

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:** 00-34068-154-66-11/2020

تم تحريرها في 11/2020  
لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسييلها ورد النص بصيغة المذكورة. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

• تطور عدوى فيروسية في العين بسبب فيروس الهرس البسيط (HSV).

**أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى أقل من 10,000 مستعمل من أصل 10,000):**  
نفسم ذبحة صدرية لدى مرضى يعانون من مرض القلب، الم في الصدر، ظهور عين غائرة (زيادة شق العين).

**أعراض جانبية وترتها غير معروفة:**  
دوار، صداع، ضربات قلب، آلام في العضلات والمفاصل، ركام، حمى.

في حالات نادرة جداً، تضرر خلال العلاج لدى بعض المتعالجين الذين عانوا من ضرر شديد في مقème العين (القرنية) يقع عكراً على القرنية نتيجة لتراتم الكالسيوم.

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبى لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب. يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالاعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "إبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى استماراة على الإنترنت لإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو غير الدخول إلى الرابط.

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يخزن الدواء؟

• يجب التسليم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتطلب التسليم. لا تنسى التقييم من دون تعليمات صريحة من الطبيب!

• يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

**شروط التخزين**  
• يجب التخزين في الثلاجة (2°C-8°C).

أو تهيج يجعلك تفك في إيقاف استعمال الدواء، توجه إلى طبيبك خلال أسبوع. يُنصح أن يتم التفكير في علاج مجدداً لمنمن أن تواصل الحصول على علاج ملائم لحالتك.

• تغير تدريجي في الرؤوس وفي الشعر الدقيق حول العين المعلقة. تستقبل هذه التغييرات على حقق اقتناع لون رموشك، طولها، سماكة، اتجاهها وعدها.

**أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من أصل 100):**  
تهيج أو اضطراب في سطح العين، التهاب الجفنين (blepharitis)، الم في العين، حساسية للضوء (photophobia) والتهاب الم lahمة.

**أعراض جانبية ليست شائعة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من أصل 1,000):**  
• تتشوش الرؤية، تورم الجفن، ونمـة في الجفن، جفاف العين، التهاب أو تبيـج سطح العين (التهاب القرنية)، التهاب الم lahمة، التهاب الجزء الملـون من العين (التهاب العينية)، تورم الشبـكة.

• طفح جلدي.

• ذبحة صدرية (angina)، شعور بدقـات القـلب (نبضات القـلب، خفقـان).

• روـ، ضيقـ في التنفس (dyspnea).

• المـ في الصـدر.

• صـداع، دوار.

• المـ في العـضـلات، المـ في المـفـاـصل.

**أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):**

• التهاب القرحـية، أعراض تورـم، حـكة/ضرـر في سطـح العـين، تـورـم حول العـين، طـبـقـة إـضاـفـية من الرـمـوش، تـنـبـقـ سـطـح العـين، منـطـقة مـلـيـة بالـسـائل فيـ جـزـء المـلـونـ منـ العـينـ (كـيسـةـ فيـ القرـحـيةـ).

• عـمـاقـقـ لـونـ الجـفـنـ أوـ روـدـ فعلـ جـلـديـ فيـ الجـفـنـ.

• روـ، تـفـاقـمـ روـ قـائـمـ دـيـكـ، ضـيقـ فيـ التنـفـسـ.

• حـكةـ جـلـديـ خـطـيرـةـ.