

ספטמבר 2021

רופא /ה, רוקח/ת נכבד/ה

טאדם 5 טבליות Tadam 5 Tablets - לפי אתר משרד הבריאות

(Tadalafil 5 mg)

טאדם 10 טבליות Tadam 10 Tablets - לפי אתר משרד הבריאות

(Tadalafil 10 mg)

טאדם 20 טבליות Tadam 20 Tablets - לפי אתר משרד הבריאות

(Tadalafil 20 mg)

עדכונים בעלון לצרכן

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים. שאר השינויים שנעשו בעלון הינם שינויים בפורמט העלון ושינויי נוסח, ואינם מפורטים מטה. תוספות המידע מודגשות **בצהוב**.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה **טאדם**
טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

טאדם 5: כל טבליה מכילה טאדאלאפיל 5 מ"ג Tadalafil 5 mg לשימוש "יומי"

טאדם 10: כל טבליה מכילה טאדאלאפיל 10 מ"ג Tadalafil 10 mg לשימוש "על פי צורך"

טאדם 20: כל טבליה מכילה טאדאלאפיל 20 מ"ג Tadalafil 20 mg לשימוש "על פי צורך"

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2, סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טאדם מיועד לטיפול בהפרעה בזקפה אצל גברים, להשגת זקפה ושמירתה.

טאדם שייך לקבוצת תכשירים המכונה מעכבי האנזים פוספודיאסטרזאז מסוג 5 (PDE5).

טאדם "יומי" במינון של 5 מ"ג מיועד בנוסף:

לטיפול בתסמינים של הגדלה שפירה של הערמונית (פרוסטטה).

לטיפול בגברים הסובלים מהפרעה בזקפה ותסמינים של הגדלה שפירה של הערמונית (פרוסטטה).

הפרעה בזיקפה הוא מצב בו הגבר לא יכול להשיג או לשמור על איבר מין זקוף בצורה הנדרשת לפעילות מינית.

הוכח כי **טאדם** משפר משמעותית את היכולת להשיג איבר מין זקוף וקשה הדרוש לפעילות מינית.

לאחר גירוי מיני, **טאדם** פועל על ידי הרפיית כלי הדם באיבר מין, וכך מאפשר זרימת דם אליו.

התוצאה המתקבלת היא תפקוד זקפה משופר. **טאדם** לא יעזור לך אם אין לך הפרעה בזקפה.

חשוב לציין כי **טאדם** אינו פועל בהעדר גירוי מיני.

עליך ועל הפרטנר/ית שלך לפעול להשגת גירוי מיני, בדיוק כפי שהייתם עושים אם לא היית נוטל תרופה להפרעה

בזיקפה.

הגדלה שפירה של הערמונית (פרוסטטה) הוא מצב בו בלוטת הערמונית הולכת וגדלה עם הגיל.

התסמינים כוללים קושי להתחיל את זרימת השתן, תחושה של אי ריקון השלפוחית לחלוטין וצורך תכוף יותר

להטיל שתן גם בלילה. **טאדם** משפר את זרימת הדם אל הערמונית ואל שלפוחית השתן ומרפה את השרירים, מה

שעשוי להפחית את התסמינים של ההגדלה השפירה של הערמונית (פרוסטטה). הוכח כי **טאדם** משפר את

התסמינים הללו כ-2-1 שבועות לפני תחילת הטיפול.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה אלרגי לטאדאלאפיל או לכל אחד מהמרכיבים הבלתי פעילים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").
- הנך נוטל סוג מסויים של ניטרט אורגני או מסוג המשחרר ניטריק אוקסיד כגון אמיל ניטריט. זוהי קבוצת תכשירים ("ניטרטים") המשמשת לטיפול באנגינה פקטוריס ("כאב בחזה"). **הוכח כי טאדאלאפיל מגביר את האפקט של תכשירים אלו.** אם הינך נוטל סוג מסויים של ניטרט או שאינך בטוח, ספר על כך לרופא שלך.
- הינך סובל ממחלת לב חמורה או עברת התקף לב במהלך 90 הימים האחרונים.
- עברת לאחרונה אירוע מוחי שהתרחש בששת החודשים האחרונים.
- אתה סובל מלחץ דם נמוך או יתר לחץ דם בלתי מבוקר.
- הנך סובל או סבלת בעבר מאבדן ראייה כתוצאה מ non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION). מצב רפואי הנקרא "שבץ של העין".
- הנך נוטל תרופה בשם ריוסיגואט (riociguat). זוהי תרופה המשמשת לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי (כלומר לחץ דם גבוה בריאות) ויתר לחץ דם ריאתי כרוני קרישי (כלומר לחץ דם גבוה בריאות הנובע מקרישי דם). **הוכח כי מעכבי PDE5 כגון טאדם, מגבירים את השפעת הורדת לחץ הדם של תרופה זו.** אם הנך נוטל ריוסיגואט או שאינך בטוח, ספר על כך לרופא שלך.

התרופה אינה מיועדת לשימוש מתחת לגיל 18 או לנשים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

שוחח עם רופאך לפני נטילת טאדם.

עליך לדעת כי פעילות מינית מהווה סיכון אפשרי עבור חולי לב היות והיא דורשת מאמץ מוגבר מהלב. אם הנך סובל מבעיה לבבית עליך להתייעץ עם הרופא שלך. מאחר שלהגדלה שפירה של הערמונית (פרוסטטה) ולסרטן הערמונית עלולים להיות תסמינים זהים, הרופא שלך יערוך בדיקה לסרטן הערמונית לפני שירשום לך טיפול בטאדם להגדלה שפירה של הערמונית. טאדם אינה מיועדת לטיפול בסרטן הערמונית.

לפני התחלת הטיפול ספר לרופא אם:

- הנך סובל מאנמיה חרמשית (תאי דם אדומים שאינם תקינים).
- הינך סובל ממיאלומה נפוצה (סרטן של מח העצם).
- יש לך לוקמיה (סרטן של תאי הדם).
- קיים עיוות במבנה איבר המין שלך.
- הינך סובל מבעיית כבד חמורה.
- הינך סובל מבעיית כליות חמורה.

לא ידוע האם טאדם יעילה במטופלים שעברו:

- ניתוח באגן הירכיים
- הסרה חלקית או מלאה של בלוטת הערמונית (פרוסטטה), שבה חותכים את עצבי הבלוטה.

אזהרות:

- אם אתה חווה ירידה/אובדן פתאומי בראיה, הפסק את השימוש בטאדם ופנה מיד לרופא שלך.
- ירידה בשמיעה או אובדן פתאומי של השמיעה נצפו במספר מטופלים שנטלו טאדאלאפיל. על אף שלא ניתן לשייך את השימוש ב- טאדאלאפיל ישירות לתופעה זו, אם אתה חווה ירידה בשמיעה או אובדן פתאומי של השמיעה, הפסק את השימוש בטאדם ופנה מיד לרופא שלך.

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

אינטרקציות/ תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח: אין ליטול טאדאם אם אתה נוטל תכשירים מסוג ניטרטים (ראה פרק 1, סעיף "אין להשתמש בתכשיר אם").

תרופות מסוימות עלולות להיות מושפעות מטאדם או שהן עשויות להשפיע על מידת הפעולה של טאדם. ספר לרופא או לרוקח אם אתה כבר לוקח:

- תרופות ממשפחת חוסמי אלפא (משמשות לטיפול ביתר לחץ דם או בתסמיני שתן הקשורים להגדלה שפירה של הערמונית (פרוסטטה)).
- תרופות אחרות לטיפול ביתר לחץ דם.

- ריוסיגואט (riociguat).
- תרופות ממשפחת מעכבי-5 אלפא-רדוקטאז (משמשות לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית)
- תרופות כגון טבליות קטוקונאזול (לטיפול בזיהוומים פטרייתיים) ומעכבי פרוטאז (לטיפול בנגיף האיידס [HIV]).
- פנובארביטאל, פניטואין וקארבאמאזפין (לטיפול בכפיון).
- ריפאמפיצין, אריתרומיצין, קלריתרומיצין או איטראקונאזול.
- תכשירים נוספים לטיפול בהפרעה בזיקפה.

שימוש בתרופה עם מזון ושתייה:

טבליות **טאדם** מיועדות לשימוש פומי בגברים בלבד. יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מעט מים. ניתן ליטול את הטבליות עם או ללא מזון. מיץ אשכוליות עשוי להשפיע על האופן שבו **טאדם** יפעל ויש לקחת אותו בזהירות. שוחח עם הרופא לקבלת מידע נוסף.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

שתיית אלכוהול עלולה לפגוע ביכולת שלך להשגת זיקפה ועלולה להוריד באופן זמני את לחץ הדם שלך. אם נטלת או שאתה מתכנן ליטול **טאדם** יש להימנע משתיית אלכוהול מופרזת (רמת אלכוהול בדם של 0.08% או יותר), מאחר שזו גם עלולה להעלות את הסיכון לסחרחורת בקימה משכיבה לעמידה.

פוריות

בבדיקות שנערכו בכלבים נמצאה ירידה בייצור הזרע. ירידה בייצור הזרע נצפתה גם במספר גברים. לא סביר שתופעות אלו יובילו לפגיעה בפוריות.

נהיגה ושימוש במכונות

ישנם גברים שנטלו טאדאלאפיל במחקרים קליניים ודיווחו על סחרחורת. בדוק היטב כיצד אתה מגיב לתרופה לפני נהיגה או שימוש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

טאדם מכיל לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי הנך סובל מרגישות לסוכרים מסוימים, התייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש בתרופה. ראה פרק 6 "מידע נוסף".

טאדם מכילה נתרן.

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, כך שלמעשה היא נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל, בהיעדר הוראה אחרת מרופא, לטיפול בהפרעה בזיקפה אצל גברים, להשגת זקפה

ושמירתה:

טאדם "על פי צורך" - טבליה אחת, לפחות 30 דקות לפני קיום מגע מיני. אין לעבור על המנה המומלצת. אין ליטול יותר מטבליה אחת ליום. ניתן לקחת בכל שעה משעות היום. השפעת **טאדם** יכולה להימשך עד 36 שעות. מאחר והשפעת **טאדם** נשמרת יותר מיממה, יש להימנע משימוש יום יומי בתכשיר.

טאדם "יומי" – המנה המומלצת היא טבלית **טאדם** אחת ליום. יש ליטול **טאדם בכל יום** באותה שעה לערך. חשוב להדגיש כי **טאדם**, כאשר נלקחת לטיפול בהפרעה בזיקפה, אינו פועל בהעדר גירוי מיני. עליך ועל הפרטנר/ית שלך לפעול להשגת גירוי מיני בדיוק כפי שהייתם עושים אם לא היית נוטל תרופה להפרעת זקפה. **המינון המקובל, בהיעדר הוראה אחרת מרופא, לטיפול בתסמינים של הגדלה שפירה של הערמונית (פרוסטטה):**

טבלית **טאדם 5** אחת ליום. יש ליטול **טאדם 5 בכל יום** באותה שעה לערך. **המינון המקובל, בהיעדר הוראה אחרת מרופא, לטיפול בגברים הסובלים מהפרעה בזקפה ותסמינים של הגדלה שפירה של הערמונית (פרוסטטה):**
טבלית **טאדם 5** אחת ליום. יש ליטול **טאדם 5 בכל יום** באותה שעה לערך (בלי קשר לתזמון פעילות מינית).

אין לעבור על המנה המומלצת

אין לחצות את הטבליות. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל. **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עליך לפנות לרופא שלך. ייתכן ותחוה תופעות לוואי כפי שמפורטות בסעיף 4. **אם נטלת מנת יתר** או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. **אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש**, קח את התרופה ברגע שנזכרת אבל אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. אין ליטול **טאדם** יותר מפעם אחת ביום.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו לכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות לוואי אלה בדרך כלל קלות עד בינוניות.

יש להפסיק טיפול ולפנות לרופא מיד אם הנך סובל מ:

- תגובה אלרגית (כולל פריחה על העור) (מופיע לעיתים רחוקות).
- כאבים בחזה – אין להשתמש בתרופות מסוג ניטריטים ויש לפנות מיידית לקבלת טיפול רפואי (מופיע לעיתים רחוקות).
- זקפה ממושכת וכואבת לאחר נטילת **טאדם**. אם הזקפה מתמשכת מעל 4 שעות, יש לפנות מיידית לרופא (מופיע לעיתים נדירות).
- אובדן פתאומי של הראייה (מופיע לעיתים נדירות).

תופעות לוואי שכיחות (הופיעו ב- 10-1 מטופלים מתוך 100): כאב ראש, כאב גב, כאבי שרירים, כאבים בידיים וברגליים, סומק בפנים, גודש באף והפרעות בעיכול.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (הופיעו ב- 10-1 מטופלים מתוך 1,000): סחרחורות, כאב בטן, הקאות, בחילה, צרבת, טשטוש ראייה, כאב בעיניים, דימומים מהאף, קושי לנשום, דם בשתן, זקפה ממושכת, תחושה של הלמות לב, דופק מהיר, לחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך, **דימומים מהאף**, צפצוף או זמזום באוזן (טנטון), בצקת בידיים, ברגליים או בקרסוליים ותחושת עייפות.

תופעות לוואי נדירות (הופיעו ב- 10-1 מטופלים מתוך 10,000): עילפון; התקף כפיון (התקף אפילפטי) ואובדן זיכרון חולף; התנפחות עפעפיים; אדמומיות בעיניים; ירידה פתאומית בשמיעה או אובדן השמיעה, חרלת (חבורות אדומות מגרדות על פני העור; הגברת הזעה; דם בזרע; דימום מהפין. דווחו מקרים נדירים של התקף לב ושבץ בקרב גברים הנוטלים טאדאלאפיל - ברוב המקרים הייתה קיימת בעיה לבבית טרם נטילת התרופה.

דווחו תופעות לוואי נדירות בקרב גברים שנטלו טאדאלאפיל, שלא הופיעו בניסויים הקליניים. אלו כוללים: מיגרנה, בצקת בפנים, תגובה אלרגית חמורה המתבטאת בבצקת בפנים או בלוע, פריחה חמורה, הפרעות בזרימת הדם אל העיניים, דופק לב שאינו סדיר, תעוקת חזה ומוות פתאומי על רקע לבבי. סחרחורות הופיעו לעיתים קרובות יותר בגברים מעל גיל 75 שנטלו טאדאלאפיל שלשולים הופיעו לעיתים קרובות יותר בגברים מעל גיל 65 שנטלו טאדאלאפיל.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "[דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי](#)" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי. או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

לחילופין, ניתן לדווח לחברת "[אוניפארם בע"מ](#)".

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרופא או הרוקח כיצד יש להיפטר מהתרופה. זה יסייע לשמירה לשמירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Mannitol, Lactose anhydrous, Sodium lauryl sulphate, Croscarmellose sodium, Hydroxypropyl cellulose, Sodium stearyl fumarate, Magnesium stearate, Opadry OY 6503 blue, Opadry FX purple 63F10239.

התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז.

כל טבליה של טאדם 5 מכילה 24 מ"ג לקטוז (כאנהידרוז).

כל טבליה של טאדם 10 מכילה 48 מ"ג לקטוז (כאנהידרוז).

כל טבליה של טאדם 20 מכילה 96 מ"ג לקטוז (כאנהידרוז).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טאדם ארוז בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון.

טאדם 5 הינן טבליות מצופות אובליות, קמורות משני צידיהן, בצבע כחול בהיר.

בכל אריזה יש 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 20, 28 או 30 טבליות.

טאדם 10 הינן טבליות מצופות עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע כחול בהיר.

בכל אריזה יש 2, 4, 6 או 8 טבליות.

טאדם 20 הינן טבליות מצופות אובליות, קמורות משני צידיהן, בצבע כחול בהיר.

בכל אריזה יש 2, 4, 6 או 8 טבליות.

יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

שם בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א, 6121301.

שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

טאדם 5: 157-79-34602-01

טאדם 10: 157-81-34538-01

טאדם 20: 157-80-34537-01

נערך בספטמבר 2021

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

