

**نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصادلة (مستحضرات) - 1986**  
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

سياليس 20 ملغ أقراص مطليّة	سياليس 10 ملغ أقراص مطليّة
<b>التركيب:</b>	<b>التركيب:</b>
يحتوي كل قرص على: تادالافيل 20 ملغ "حسب الحاجة" (tadalafil 20 mg) للاستعمال	يحتوي كل قرص على: تادالافيل 10 ملغ "حسب الحاجة" (tadalafil 10 mg) للاستعمال
سياليس 5 ملغ أقراص مطليّة	سياليس 2.5 ملغ أقراص مطليّة
<b>التركيب:</b>	<b>التركيب:</b>
يحتوي كل قرص على: تادالافيل 5 ملغ "اليومي" (tadalafil 5 mg) للاستعمال	يحتوي كل قرص على: تادالافيل 2.5 ملغ "اليومي" (tadalafil 2.5 mg) للاستعمال

الموادّ غير الفعّالة ومُسببات الحساسية في المستحضر: انظر الفصل 2، البند "معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافيّة".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدّواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة، فتوجّه إلى الطبيب أو الصيدليّ. وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

### 1. لم أعدّ هذا الدّواء؟

سياليس بجرعة 2.5، 10 و 20 ملغ معدّ لعلاج اضطراب الانتصاب لدى الرجال.

سياليس "يومي" بجرعة 5 ملغ معدّ:

لعلاج اضطراب الانتصاب لدى الرجال.

لعلاج أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد.

لعلاج الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب ومن أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد.

المجموعة العلاجية: مجموعة أمراض المسالك البولية، أدوية تُستعمل لمشاكل الانتصاب.

### ما هو سياليس

يحتوي سياليس على المادة الفعّالة تادالافيل، التي تنتمي إلى مجموعة أدوية تدعى مثبطات فوسفودي إستراز من النوع 5.

اضطراب الانتصاب هو حالة لا يستطيع فيها الرجل التوصل إلى انتصاب العضو الذكري أو الحفاظ عليه منتصب بشكل ملائم لممارسة العلاقات الجنسية. لقد أثبت أن سياليس يحسّن بشكل ملحوظ القدرة على أن يجعل العضو الذكري منتصبا وصلبا بحيث يتيح ممارسة علاقات جنسية. بعد الإثارة الجنسية، يعمل سياليس على إرخاء الأوعية الدموية في عضو الذكري، وهكذا يحسن تدفق الدم إليه. ونتيجة لذلك يتحسن أداء الانتصاب. لن يساعدك سياليس في حال لم يكن لديك اضطراب في الانتصاب.

تجدد الإشارة إلى أن سياليس لا يعمل عند نقص التهيج الجنسي. عليك أنت وشريكة حياتك أن تبادرا إلى الإثارة الجنسية تماما كما كنتمما ستفعلان لو أنك لم تتناول دواء لاضطراب الانتصاب.

تضخم البروستات (prostate) الحميد هو حالة يزداد فيها حجم غُدّة البروستات مع التقدم في العمر. تشتمل الأعراض على صعوبة في بدء التبول، الشعور بعدم إفراغ المثانة كليا، والحاجة إلى التبول أكثر في الليل أيضا. يحسن سياليس تدفق الدم إلى البروستات والمثانة، ويرخي العضلات، ومن شأن هذا أن يقلل أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد. أثبت أن سياليس يحسّن أعراض البول هذه خلال 1-2 أسابيع تقريبا بعد بدء العلاج.

## 2. قبل استعمال الدواء

### يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لتادالافيل أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).
- كنت تتناول نوعا معينا من نترات عضوي أو نوعا آخر يطلق أكسيد النيتريك مثل: نترات الأميل. هذه هي مجموعة مستحضرات ("نترات") تُستخدم لعلاج الذبحة الصدرية ("ألم في الصدر"). أثبت أن سياليس يزيد تأثير هذه المستحضرات. إذا كنت تتناول نوعا معينا من النترات أو إذا لم تكن متأكدًا، أخبر طبيبك بذلك.
- كنت تعاني من مرض قلب حاد أو تعرضت لنوبة قلبية في الأيام الـ 90 الأخيرة.
- أصبت مؤخرا بسكتة دماغية كانت قد حدثت في الأشهر الستة الأخيرة.
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو مرتفع لا يمكن السيطرة عليه.
- عانيت ذات مرة من فقدان الرؤية نتيجة non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION)، حالة طبية تدعى "سكتة العين".
- كنت تتناول ريوسيجوات (riociguat). هذا هو دواء يُستعمل لعلاج ضغط الدم الشرياني الرئوي المرتفع (أي ضغط دم مرتفع في الرئتين) وضغط الدم الرئوي الانصمامي الخثاري

المزمن (أي ضغط دم مرتفع يحدث بسبب خثرات دموية). لقد أثبتَ أن مثبطات PDE5، مثل سياليس، تزيد تأثير هذا الدواء على انخفاض ضغط الدم. إذا كنت تتناول ريبوسيجوات أو إذا لم تكن متأكدًا، أخبر طبيبك بذلك.

الدواء ليس معدا للاستعمال دون جيل 18 سنة أو لدى النساء.

### تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء:

تحدث مع طبيبك قبل تناول سياليس.

يجدر بك أن تعرف أن النشاط الجنسي يشكل خطرا محتملا لدى مرضى القلب لأنه يتطلب جهدا قلبيا كبيرا. إذا كنت تعاني من مشكلة قلبية عليك استشارة طبيبك.

بما أن أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد وأعراض سرطان البروستات قد تكون شبيهة، سيجري طبيبك فحص سرطان البروستات قبل أن يُسجل لك علاجاً بـ سياليس لعلاج تضخم البروستات الحميد. سياليس ليس معداً لعلاج سرطان البروستات.

### قبل تناول الأقراص، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من فقر الدم المنجلي (خلايا دم حمراء غير سليمة).
- كنت تعاني من الورم النقوي المتعدد (سرطان نخاع العظم).
- كنت تعاني من اللوكيميا (سرطان الدم).
- كان لديك خلل في مبنى عضوك التناسلي.
- كنت تعاني من مشكلة حادة في الكبد.
- كنت تعاني من مشكلة حادة في الكلى.

ليس معروفا فيما إذا كان سياليس ناجعا لدى مرضى اجتازوا:

- عملية جراحية في الحوض.
- استئصالاً جزئياً أو تاماً لغدة البروستات (prostate) الذي تتم فيه إزالة أعصاب الغدة.

إذا شعرت بانخفاض/فقدان الرؤية المفاجئ، توقف عن تناول سياليس وتوجه فوراً إلى طبيبك.

شوهده انخفاض في السمع أو فقدان السمع المفاجئ لدى بعض المتعالجين الذين تناولوا تادالافيل. رغم أنه لا يمكن نسب استعمال تادالافيل مباشرة إلى هذه الظاهرة، فإذا شعرت بانخفاض السمع أو فقدان السمع المفاجئ، توقف عن استعمال سياليس وتوجه فوراً إلى طبيبك.

### الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون جيل 18 عاماً.

### التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية،

## أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا يمكن تناول سياليس إذا كنت تتناول مستحضرات من نوع التترات.

قد يتأثر بعض الأدوية بسياليس أو قد يؤثر بعض الأدوية في مدى عمل سياليس. أخبر الطبيب أو الصيدلي، إذا كنت تتناول:

- أدوية من مجموعة محصرات ألفا (تُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع أو لعلاج أعراض البول المرتبطة بتضخم البروستات (Prostate)) الحميد.
- أدوية أخرى لعلاج ضغط الدم المرتفع.
- ريبوسيجوات.
- أدوية من مجموعة مثبطات 5 ألفا ريدوكتاز (تُستعمل لعلاج تضخم غدة البروستات الحميد).
- أدوية مثل أقراص كيتوكونازول (لعلاج العدوى الفطرية) ومثبطات البروتياز لعلاج فيروس الإيدز أو عدوى HIV.
- فينوباريتال، فينيتوين، وكاربامازيبين (أدوية لعلاج الصرع).
- ريفاميسين، إريثروميسين، كلاريثروميسين أو إيتراكونازول.
- مستحضرات إضافية لعلاج اضطراب الانتصاب.

## استعمال الدواء مع الطعام والشراب

أقراص سياليس معدة للاستعمال الفموي لدى الرجال فقط. يجب ابتلاع القرص كاملاً مع القليل من الماء. يمكن تناول الأقراص مع أو من دون طعام. قد يؤثر عصير الجريب فروت في طريقة عمل سياليس، لهذا يجب تناوله بحذر. تحدث مع الطبيب للحصول على مزيد من المعلومات.

## استعمال الدواء واستهلاك الكحول

قد يلحق استهلاك الكحول ضرراً بقدرتك على الانتصاب، وقد يؤدي إلى انخفاض ضغط دمك بشكل مؤقت. إذا تناولت أو كنت تخطط لتناول سياليس عليك تجنب الإفراط في استهلاك الكحول (نسبة كحول في الدم 0.08% أو أكثر)، لأن هذا الاستهلاك قد يزيد أيضاً خطر الإصابة بالدوخة عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.

## الخصوبة

في الفحوصات التي أجريت على الكلاب طرأ انخفاض على إنتاج الحيوانات المنوية. كما شوهد هذا الانخفاض لدى بعض الرجال أيضاً. لا يتوقع أن تلحق هذه الأعراض ضرراً بالخصوبة.

## السياقة واستعمال الماكينات

هناك رجال تناولوا سياليس في أبحاث سريرية وأبلغوا عن دوخة. افحص جيداً كيف تستجيب للأقراص قبل السياقة أو استعمال الماكينات.

### معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

#### يحتوي سياليس على اللاكتوز

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من حساسية لسكريات معينة، استشره قبل استعمال الدواء.

#### يحتوي سياليس على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل جرعة، لهذا يُعتبر "خالياً من الصوديوم".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

**الجرعة المتبعة لعلاج اضطراب الانتصاب لدى الرجال عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب:**  
**سياليس 10 ملغ** - الجرعة البدائية الموصى بها هي قرص واحد مقداره 10 ملغ قبل إقامة علاقة جنسية. إذا كان تأثير هذه الجرعة ضعيفاً جداً، قد يزيد طبيبك الجرعة حتى 20 ملغ.

**سياليس 20 ملغ** - الجرعة البدائية الموصى بها هي قرص واحد مقداره 10 ملغ قبل إقامة علاقة جنسية. رغم ذلك، وصف لك الطبيب جرعة مؤلفة من قرص واحد مقداره 20 ملغ لأنه قرر أن الجرعة الموصى بها وهي 10 ملغ ضعيفة جداً لك.

يجب تناول قرص واحد من سياليس، 30 دقيقة، على الأقل، قبل ممارسة العلاقة الجنسية. قد يستمر تأثير سياليس حتى 36 ساعة بعد تناول القرص. لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم. يمكن تناول القرص في أي ساعة من اليوم. بما أن تأثير سياليس يستمر لأكثر من 24 ساعة، يجب تجنب استعمال هذا المستحضر يومياً.

**سياليس 2.5 و 5 ملغ** - الجرعة الموصى بها هي قرص واحد مقداره 5 ملغ، للتناول مرة في اليوم، في ذات الساعة من اليوم تقريباً. قد يلائم طبيبك الجرعة بحيث تتناول 2.5 ملغ استناداً إلى رد فعلك تجاه سياليس. لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم. يتيح لك تناول سياليس "يومي" الانتصاب أثناء الإثارة الجنسية، وذلك في أي وقت تشاء خلال 24 ساعة في اليوم.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

تجدد الإشارة إلى أن سياليس عندما يؤخذ لعلاج ضعف الانتصاب لا يعمل من دون إثارة جنسية. عليك أنت وشريكة حياتك أن تعملوا للحصول على الإثارة الجنسية تماما كما كنتم ستفعلان لو أنك لم تتناول دواء لاضطراب الانتصاب.

**الجرعة الاعتيادية لعلاج أعراض تضخم البروستات (Prostate) الحميد عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب:**

قرص سياليس 5 ملغ مرة واحدة في اليوم. يجب تناول القرص كل يوم في ذات الساعة تقريباً.

**الجرعة الاعتيادية لعلاج الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب وأعراض تضخم البروستات (Prostate) الحميد عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب:**

قرص سياليس 5 ملغ مرة واحدة في اليوم. يجب تناول القرص كل يوم في ذات الساعة تقريباً.

لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم.

#### **السحق/الشطر/المضغ:**

ليست هناك معلومات حول سحق / شطر/ مضغ القرص. يجب تناول القرص بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، ليست هناك معلومات حول استعمال المستحضر عبر أنبوب معدي مريئي. يجب استعمال هذا الدواء في أوقات ثابتة وفق توصيات الطبيب المعالج.

#### **إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى**

إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ، عليك التوجه إلى طبيبك. قد تشعر بأعراض جانبية كما هو مفصّل في البند 4.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل خطأ من الدواء، توجهْ حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحباً معك عبوة الدواء.

#### **إذا نسيت تناول الدواء**

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، تناوله فور تذكرك، ولكن لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن القرص المنسي. لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم.

يجب المداومة على العلاج حسب توصية الطبيب.

**يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كلِّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلّق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.**

#### 4. الأعراض الجانبية

مثل أيّ دواء، يمكن أن يسبّب استعمال هذا الدواء أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أيّ منها. تكون ردود الفعل هذه طفيفة حتى معتدلة غالباً.

**يجب التوقف عن العلاج والتوجّه إلى الطبيب فوراً في حال عانيت من:**

- رد فعل تحسسي بما في ذلك طفح جلدي (يحدث في أحيان متباعدة).
- آلام في الصدر - لا يجوز استعمال أدوية من نوع نترات، ويجب التوجه فوراً لتلقي علاج طبي (يحدث في أحيان متباعدة).
- انتصاب متواصل، وربما مؤلم بعد تناول سياليس (يحدث في أحيان نادرة). إذا كان لديك انتصاب كهذا لأكثر من 4 ساعات متتالية، عليك مراجعة الطبيب فوراً.
- فقدان النظر المفاجئ (يحدث في أحيان نادرة).

الأعراض الجانبية الأخرى التي تم الإبلاغ عنها:

**أعراض جانبية شائعة (حدثت لدى 1-10 مستعملين من بين 100):**

- صداع، ألم في الظهر، آلام في العضلات، آلام في اليدين والساقين، احمرار الوجه، احتقان الأنف، واضطرابات في الهضم.

**أعراض جانبية ليست شائعة (حدثت لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):**

- دوخة، ألم في البطن، تقيؤات، غثيان، حرقة، ضبابية في الرؤية، ألم في العينين، صعوبة في التنفس، دم في البول، انتصاب متواصل، شعور بخفقان في القلب، نبض سريع، ضغط دم مرتفع، ضغط دم منخفض، أنزفة من الأنف، صغير أو طنين في الأذن (tinnitus)، وذمة في اليدين، الساقين أو الكاحلين، وشعور بالتعب.

**أعراض جانبية نادرة (حدثت لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):**

- إغماء، نوبة صرع وفقدان الذاكرة العابر، تورم الجفنين، احمرار العينين، انخفاض السمع المفاجئ أو فقدان السمع، شرى (كدمات حمراء تسبب حكة على الجلد)، نزيف من القضيب، دم في المنى، وزيادة التعرق.

تم الإبلاغ عن حالات نادرة من نوبة قلبية وسكتة دماغية لدى الرجال الذين يتناولون سياليس. عانى معظم هؤلاء الرجال من مشاكل قلبية قبل أن بدأوا بتناول الدواء.

تم الإبلاغ في حالات نادرة عن انخفاض جزئي، مؤقت أو ثابت في الرؤية أو فقدان الرؤية في عين واحدة أو في كلا العينين

تم الإبلاغ عن بعض الأعراض الجانبية النادرة لدى الرجال الذين تناولوا سياليس، ولكنها لم تظهر في التجارب السريرية. تشتمل هذه الأعراض على:

- الشقيقة، وذمة في الوجه، رد فعل تحسسي حاد يتجسد في وذمة في الوجه أو البلعوم، طفح حاد، اضطرابات في تدفق الدم إلى العينين، نظم قلب غير منتظمة، ذبحة صدرية، وموت

مفاجيء لأسباب قلبية.

حدثت دوخة في أحيان قريبة أكثر لدى الرجال فوق سن 75 عاما الذين تناولوا سياليس. كما حدث إسهال في أحيان قريبة أكثر لدى الرجال فوق سن 65 عاما الذين تناولوا سياليس.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيُّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبيٍّ لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il))

الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يُخزّن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواءٍ آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا يجوز التسبب بالتقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة واللوحية (البليستر). تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من ذات الشهر المُشار إليه.
- سياليس 2.5 ملغ، 10 ملغ و 20 ملغ: يجب تخزينه تحت 30°C.
- سياليس 5 ملغ: يجب تخزينه تحت 25°C.
- يُمنع إلقاء الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلّة النفايات المنزلية. استشر الطبيب أو الصيدلي لمعرفة كيفية التخلّص من الدواء. تساعد هذه التدابير في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Tablet Core: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate.

Film-coat:

Cialis 2.5 mg: Color Mixture Yellow (32K12891), talc.

Cialis 5 mg: Color Mixture Yellow (Y-30-12863-A), talc.

Cialis 10 mg: Color Mixture II Yellow (32K92031), talc.

Cialis 20 mg: Color Mixture II Yellow (32K12884), talc.



يحتوي الدواء على اللاكتوز وقد يسبب حساسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية للاكتوز.

يحتوي كل قرص 2.5 ملغ على 87 ملغ لاکتوز (ك مونوهيدرات).

يحتوي كل قرص 5 ملغ على 121 ملغ لاکتوز (ك مونوهيدرات).

يحتوي كل قرص 10 ملغ على 170 ملغ لاکتوز (ك مونوهيدرات).

يحتوي كل قرص 20 ملغ على 233 ملغ لاکتوز (ك مونوهيدرات).

**كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:**

سياليس 2.5 ملغ هو قرص لوزي الشكل، مطليّ بلون برتقالي-أصفر. العلامة "C 2 ½" مطبوعة على جانب واحد من القرص.

يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 12، 28، أو 30 قرصاً.

سياليس 5 ملغ هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر فاتح. العلامة "C 5" مطبوعة على جانب واحد من القرص.

يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 4، 14، 28 أو 30 قرصاً.

سياليس 10 ملغ هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر فاتح. العلامة "C 10" مطبوعة على جانب واحد من القرص.

يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 2، 4 أو 8 أقراص.

سياليس 20 ملغ هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر. العلامة "C 20" مطبوعة على جانب واحد من القرص.

يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 2، 4 أو 8 أقراص.

قد لا يتمّ تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: إيلي ليلي إسرائيل م.ض.، شارع هشيراف 4، ص.ب. 4246، رعنانا 4366411.

اسم المُنْتِج وعنوانه: ليلي م.ض.، ألكوينداس، مدريد، إسبانيا.

تم تحريرها في حزيران 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

**أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

سياليس 2.5 ملغ: 139-19-31765-00

سياليس 5 ملغ: 139-20-31766-00

سياليس 10 ملغ: 128-19-30677-21

سياليس 20 ملغ: 128-20-30678-21

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.