

## عراقا 10 ملغ، عراقا 20 ملغ، أقراص مطلية

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص مطلي من عراقا 10 ملغ على:

ليفونوميديد 10 ملغ Leflunomide 10 mg

يحتوي كل قرص مطلي من عراقا 20 ملغ على:

ليفونوميديد 20 ملغ Leflunomide 20 mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة** يتمنع حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجله. لا تعاطوا الدواء من غير وصفه حتى ولو بدلك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتهم.

**بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر عراقا بطاقة معلومات حول الأمان للمتعاطين.** تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وفترة العلاج بـ عراقا والتصريف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعاطين والنشرة للمستهلك يتمنع قبل بدء استعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها يتمنع ثانية إذا دعت الحاجة.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يتمنى عراقا إلى فمفصيلة أوعية المسماة مضادات الرثية. وهو يتجنون على المركب الفعال ليفونوميديد.

يستعمل عراقا لمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي النشط لدى الكبار لإبطاء تقدم المرض ولتسكين الآداء الوظيفي الجسدي، وللمعالجة التهاب المفاصل الصدفي (psoriatic) النشط.

**الفصيلة العلاجية:** من المثبطات الإنتقائية لجهاز المناعة. أعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي تشمل: التهاب المفاصل، إنتفاخ، صعوبة في الحركة وآلم. أعراض أخرى التي تؤثر على كامل الجسم تشمل: فقدان الشهية للطعام، سخونة، تناقص الحيوية وفقر الدم (قلة خلايا الدم الحمراء).

أعراض التهاب المفاصل الصدفي النشط تشمل: التهاب المفاصل، إنتفاخ، صعوبة في الحركة، آلم وبقع حمراء وقشرة على الجلد (أفات جلدية).

### 2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة، حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لـ ليفونوميديد (بالأخص رد فعل جلدي شديد، متراقق في أحيان متقاربة بسخونة، مفصلية، بقع جلدية حمراء، أو حويصلات، مثلا متلازمة Stevens-Johnson) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية")، أو إذا كنت البرجي لتيريفونوميديد (يستعمل لعلاج التصلب المتعدد).

- لديك أية مشاكل في الكبد،
- لديك مشاكل في الكلى متوسطة حتى شديدة الدرجة،
- لديك كمية منخفضة جدا من البروتينات في الدم (hypoproteinaemia)،

كنت تعاني من أية مشكلة تؤثر على الجهاز المناعي لديك (الإيدز مثلا)،

- لديك مشكلة في نخاع العظم، أو تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء أو البيضاء في الدم أو عدد منخفض للصفائح الدموية،
- كنت تعاني من تلوث خطير،
- كنت في فترة الحمل، تعتقدون بأنك يمكن أن تكوني حاملا، أو في فترة الرضاعة.

### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ عراقا، إحك للتطابق إذا:

- عانيت ذات مرة من مرض التهابي رئوي المسمى مرض رئوي خلالي (Interstitial lung disease).
- مرضت ذات مرة بالسل أو إذا كنت على تماس قريب من شخص مريض أو مرضى في الماضي بالسل من شأنه يسبب أن يجري فحوصات ليتأكد فيما إذا لديك مرض السل (أنظر الفقرة "الفحوصات والمتابعة").

- إذا كنت نكرا ولديك الرغبة في إنجاب الأطفال. بما أنه لا يمكن نفي إمكانية إنتقال عراقا إلى السائل المنوي، يجب إستعمال وسائل متوقفة بها لمنع الحمل خلال العلاج بـ عراقا.

يجب على الرجل الذي يخطط إنجاب طفل التوجه إلى الطبيب الذي من شأنه أن يوصيه بالتوقف عن تناول عراقا وتناول أدوية معينة من أجل تصريف عراقا بسرعة وبشكل كاف من جسمه. بعد ذلك، يتوجب عليه إجراء فحص دم للتأكد من أنه قد تم تصريف عراقا بشكل كاف من جسمه وحينها الإنتظار 3 أشهر أخرى على الأقل قبل المحاولة لإنجاب طفل.

- كنت مقدما على إنجذاب فحص دم معين (نسبة الكالسيوم). فإن النتيجة قد تدل بشكل خاطئ على إنخفاض نسب الكالسيوم.

- كنت قد عملت على إجراء أو أنك أجريت مؤخرا عملية جراحية كبيرة، أو إذا وجد لديك حاليا جرح لم يشفى بعد عملية جراحية. قد يضر عراقا بشكك الجروح.

عراقا يمكن أن يسبب أحيانا مشاكل معينة في الدم، في الكبد، في الرئتين أو في أعضاء النزاعين أو الرجلين. وهو قد يسبب أيضا عدد من ردود الفعل التحسسية الخطيرة (تشمل drug reaction with eosinophilia and – DRESS systemic symptoms)، أو يزيد من خطورة حدوث تلوث حاد. لمعلومات إضافية أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية".

DRESS هو عبارة عن رد فعل يتميز في بدايته بأعراض تشبه الإنفلونزا وطغح في الوجه، في السيق طغح منتشر بشكل أكبر مع سخونة مرتفعة، إرتفاع نسب إنزيمات الكبد في الدم، زيادة خلايا الدم البيضاء من نوع الحمضات (eosinophil) وإنتفاخ الغدد اللمفاوية.

توجه لطبيبك إذا وجد لديك إسهال مزمن غير مشخص. من الجائز أن يجري الطبيب فحوص إضافية. توجه لطبيبك إذا تطور لديك تقرح في الجلد خلال العلاج بـ عراقا (أنظر أيضا الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

### الأطفال والمرهقون

عراقا غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

### الفحوصات والمتابعة

يوجهك الطبيب لإجراء فحوص الدم ووظائف الكبد قبل بدء استعمال الدواء وخلايه.

قبل بدء العلاج، يجب إجراء تقييم لتواجدها سل نشط أو غير نشط. يتوجب على المتعاطين الذين عانوا من السل في الماضي أو يكونوا تحت المراقبة الحثيثة جراء إمكانية عودة السل لوضعهم نشطة.

خلال فترة العلاج يوجهك الطبيب أيضا لإجراء فحوص ضغط الدم وذلك لأن الدواء قد يرفع من ضغط الدم.

إذا كنت تتناول وارقارين أو أدوية أخرى للإعطاء عن طريق الفم (التي تستعمل لتبميع الدم) بالتزامن مع العلاج بـ عراقا، فيجب إجراء مراقبة حثيثة لـ INR (قيمة التخثر المعيارية، النسبة المعيارية الدولية) لديك.

### التفاعلات والتفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرا، أدوية أخرى بما للطيبي أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي مثل أدوية ضد الملاريا (مثلا، كوروكوين وهيدروكسيكلوروكوين)، الذئب بالحقن العظلي أو بالإعطاء عن طريق الفم، D-بنيسيلامين، آزاثيوبرين وأدوية أخرى مشثلة لجهاز المناعة (مثلا، ميتوتريكسات)، وذلك لأن هذه المشاركات غير موصى بها،
- وارقارين وأدوية أخرى للإعطاء عن طريق الفم المستعملة لتبميع الدم، والتي يتطلب تناولها مراقبة ومتابعة وذلك لتقليل خطورة حدوث الأعراض الجانبية الخاصة بها،
- تريفلونوميديد (للتصلب المتعدد).

- ريباجليبيد، بيبوجليتان، ناتيجليبيد أو روزيجليتانوزون (السكري).

- داونوروبيسين، دوكلوروبيسين، باكليتاكسيل أو توبوتيكان (للسرطان).

- دولوكستين (للإكتئاب، لسلل البول أو لمرض كلوي لدى مرضى السكري).

- ألوستيرون (لعلاج الإسهال الشديد).

- توليفلين (لرئوي).

- تيزانيدين (مرخي العضلات).

- أقراص منع الحمل (التي تحتوي إيثينيل إستراديول وليفونورجيستريل).

- سيفاقلور، نيزوليبينيسيلين (بينيسيلين G)، سيبروفلوكساسين (للتلوثات).

- إندوميثاسين، كيتويفرين (للآلم أو للإنتهاب).

- فوروسيميد (مادة مدرة للبول، لمرض القلب).

- زيدوفودين (تلوث HIV).

- ريزورفاستاتين، سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، برفاستاتين (لإرتفاع الكولسترول).

- سولفاكسازين (مرض معوي التهابي أو التهاب المفاصل الروماتيزمي).

- كوليستيرامين (لتخفيض الكولسترول) أو الفحم الفعال، لأن هذه الأدوية قد تخفض من كمية عراقا الممتصة في الجسم.

إذا كنت تتناول حاليا دواء مضاد التهاب لاسيتروبيدي (NSAID) و/أو كورتيكوستيرويدات، بالإمكان مواصلة تناولها بعد بدء العلاج بـ عراقا.

### اللقاحات

إذا توجب عليك تلقي لقاح، إستشر الطبيب. بعض اللقاحات لا يمكن إعطاؤها أثناء العلاج بـ عراقا وبعد فترة معينة بعد التوقف عن العلاج بـ عراقا.

### استعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

### استعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يوصى بشرب الكحول خلال فترة العلاج بـ عراقا. إن شرب الكحول خلال فترة العلاج بـ عراقا قد يزيد من خطورة حدوث إصابة في الكبد.

### الحمل والإرضاع

لا تستعملي الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أو تعتقدن بأنك حاملا. إذا كنت في فترة الحمل أو أصبحت حاملا أثناء العلاج بالدواء، فستزداد الخطورة لولادة رضيع مع تشوهات خلقية خطيرة. ممنوع على النساء في فترة الخصوبة تناول عراقا بدون إستعمال وسائل متوقفة بها لمنع الحمل.

إستشيري الطبيب إذا كنت تخططين للحمل بعد توقف عن العلاج بـ عراقا، وذلك لأنه عليك التأكد من خروج كامل آثار الدواء من جسمك قبل أن تتوالى الحمل. يمكن لهذه الفترة أن تصل حتى الستينين. بالإمكان تقصير هذه الفترة لعدة أسابيع بواسطة تناول أدوية معينة تسرع من تصريف عراقا من جسمك. على أية حال يجب إجراء فحص دم للتأكد من تصريف عراقا على الأقل قبل الحمل.

راجعي طبيبك، لمزيد من المعلومات عن الفحوص المخبرية. إذا كنت تشكين بأنك أصبحت حاملا أثناء العلاج بـ عراقا أو خلال الستينين التي تلت التوقف عن العلاج بـ عراقا، فعليك التوجه حالا إلى الطبيب وذلك من أجل فحص الحمل. إذا أثبت الفحص بأنك حامل، فمن الجائز أن يقترح الطبيب علاجا بأدوية معينة وذلك لتصريف عراقا بسرعة وبشكل كاف من جسمك لتقليل الخطورة الممكنة للرضيع.

لا يجوز تناول عراقا أثناء فترة الرضاعة وذلك لأن الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

### السياقة وإستعمال الماكينات

لا يجوز السياقة أو تشغيل ماكينات خطيرة خلال فترة استعمال الدواء لأن هذا الدواء قد يسبب لك الشعور بدوار، الأمر الذي قد يضعف من قدرتك على التركيز والإستجابة.

### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

الأقراص تحوي لكتوز. إذا وجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة، راجع الطبيب قبل بدء العلاج.

### 3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو عادة مقدار دوائي واحد من عيار 100 ملغ مرة في اليوم لمدة 3 أيام، وبعد ذلك، يحتاج غالبية المتعالجين لمقدار دوائي ذو:

● الإنتهاب المفصلي الروماتيزمي: 10 أو 20 ملغ، مرة في اليوم، كأمر متعلق بشدة المرض.

● الإنتهاب المفصلي الصدفي: 20 ملغ، مرة في اليوم.

● لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب بلع العقاقير الكاملة بشكله الكامل مع الكثير من الماء.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/ شطرق/ مضغ القرص.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، توجه إلى الطبيب وأخضري عليه الدواء معك.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأخضري عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول مقداراً دوائياً حال تذكرك، إلا إذا اقترب موعد المقدار الدوائي القادم.

لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المفقود.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. من الجائز أن تمر 4 أسابيع أو أكثر حتى تبدأ الشعور بتحسن حالتك.

بعض المرضى يشعرون بتحسن إضافي بعد 4-6 أشهر من العلاج.

عادة، يستغرق العلاج بـ عاراقا وقتاً طويلاً.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال عاراقا قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.

لا تتشهد من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا:

- كنت تشعر بضعف، شعاعاً لرد فعل تحسسي خطير، لأن هذه قد تكون علامات لرد فعل تحسسي خطير،

- تطور لديك طفح جلدي أو تقرحات في الفم، لأن هذه يمكن أن تدل على ردود فعل خطيرة، وأحياناً تشكل خطراً على الحياة (مثلاً):

Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, DRESS).

أنظر الفقرة 2.

يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

- جلد شاحب، إرهاق، أو كدمات، لأن هذه يمكن أن تدل على اضطرابات في الدم التي تنتج عن نقص في توازن أنواع مختلفة لخلايا الدم،

- إرهاق، ألم في البطن أو يرقان (إصفرار العينين أو الجلد)، لأن هذه يمكن أن تدل على حالات خطيرة مثل قصور كبد، الذي قد يكون مميئاً،

- أعراض لتلوث مثل سخونة، ألم في الحنجرة أو سعال، لأن هذا الدواء قد يزيد من خطورة حدوث تلوث خطير الذي قد يشكل خطراً على الحياة،

- سعال أو مشاكل في التنفس، لأن هذه يمكن أن تدل على مشاكل في الرئتين (مرض رئوي خلالي، إرتفاع ضغط الدم الرئوي)،

- وخز غير عادي، ضعف أو ألم في راحتي اليدين أو القدمين، لأن هذه يمكن أن تدل على مشاكل في الجهاز العصبي (إنتلال عصبي محيطي).

### أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1

من بين 10 متعالجين)

- انخفاض بسيط في عدد خلايا الدم البيضاء (leukopenia)،

- ردود فعل تحسسية بسيطة،

- قلة الشهية للطعام، انخفاض في الوزن (عادة ليس ذو أهمية)،

- إرهاق (asthenia)،

- صداع، دوام،

- شعور مختلف من المعتاد في الجلد مثل وخز (paraesthesia)،

- إرتفاع بسيط في ضغط الدم،

- التهاب الأمعاء الغليظة (colitis)،

- إسهال،

- غثيان، تقيؤات،

- التهاب أو تقرحات في الفم،

- ألم في البطن،

- إرتفاع في بعض نتائج فحص وظائف الكبد،

- تساقط شعر متزايد،

- إكزيما، جفاف الجلد، طفح، حكة،

- التهاب الأوتار (ألم في الأوتار ناتج عن التهاب الغشاء المحيط بالأوتار، عادة في راحتي اليدين أو القدمين)،

- إرتفاع في إنزيمات معينة في الدم (creatine phosphokinase)،

- مشكلة في أعصاب اليدين أو الرجلين (peripheral neuropathy).

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 متعالج)

- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر دم) وانخفاض عدد الصفائح الدموية (thrombocytopenia)،

- انخفاض في نسبة اليوتاسيوم في الدم،

- قلق،

- اضطرابات في حاسة التذوق،

- urticaria (شرى - nettle rash)،

- تمزق الوتر،

- إرتفاع في نسب الشحوم في الدم (كوليسترول وتريجليسيريدات)،

- انخفاض نسب اليوسفات في الدم.

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 متعالج)

- إرتفاع عدد خلايا الدم الحمراء (كثرة الحمضات)؛ انخفاض بسيط في عدد خلايا الدم البيضاء (leukopenia). إنخفاض عدد كافة خلايا الدم (pancytopenia)،

- إرتفاع خطير في ضغط الدم،

- مرض إنتهابي في الرئتين (interstitial lung disease)،

- إرتفاع في نتائج فحص وظائف الكبد التي قد تتطور لحالات خطيرة مثل إنتهاب الكبد - hepatitis و يرقان،

- تلوّثات خطيرة تسمى صمخ دموي (sepsis) التي قد تكون مميئية،

- إرتفاع في إنزيمات معينة في الدم (لاكتات ديهيدروجيناز).

أعراض جانبية نادرة جداً (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 متعالج)

- انخفاض واضح في خلايا دم بيضاء (agranulocytosis)،

- ردود فعل تحسسية خطيرة وذات خطورة كامنة،

- الإنتهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)، بما في ذلك cutaneous necrotizing vasculitis)،

- الإنتهاب في البنكرياس (pancreatitis)،

- تضضر خطير في الكبد مثل قصور الكبد أو نخر الذي قد يكون مميئاً،

- ردود فعل خطيرة، أحياناً تشكل خطراً على الحياة (Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme).

قد تحدث أيضاً أعراض جانبية أخرى بشيوع غير معروف مثل قصور كلوي، تناقص في نسبة حمض البول في الدم، إرتفاع ضغط الدم الرئوي، تضضر في خصوبة الرجل (التي تعتبر قابلة للعكس عند التوقف عن العلاج بالدواء)، نُدبة جلدية (تتميز بطفح/ إحصار في مناطق الجلد المعرضة للشمس)، داء الصدفية (جديد أو متفقم)، أو رد فعل تحسسي خطير للدواء يسمى DRESS (أنظر الفقرة 2، "تحذيرات خاصة تتعلق

بإستعمال الدواء") وتقرح جلدي (جرح دائري ومفتوح في الجلد حيث من خلاله يمكن رؤية الأنسجة التي للأسفل).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

### التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5 كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسيب! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

### شروط التخزين

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية، يجب حفظ القنينة مغلقة بإحكام.

لا يجوز رمي الدواء في مياه المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء. يساعد هذا الأمر في الحفاظ على البيئة.

### 6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

**Tablet core:** Lactose monohydrate, maize starch, crospovidone, polyvidone K25, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.

**Film coating:** Methylhydroxypropylcellulose 5000, titanium dioxide (E171), talc, macrogol 8000.

Arava 20 mg also contains: yellow ferric oxide (E172).

كل قرص من عيار 10 ملغ يحتوي على 78 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

كل قرص من عيار 20 ملغ يحتوي على 72 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

### كيف يبدو الدواء وما هو محتواه العنصري:

عاراقا 10 ملغ أقراص مطلية هي بيضاء ومستديرة. مطبوع على جانب واحد منها ZBN. الأقراص معبأة ضمن قنينة ذات 30 قرصاً أو ذات 100 قرص.

عاراقا 20 ملغ أقراص مطلية هي مائلة إلى الأصفر وعلى شكل مثلث. مطبوع على جانب واحد منها: ZBO. الأقراص معبأة ضمن قنينة ذات 30 قرصاً أو ذات 100 قرص.

من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي إسرائيل م.ح.ص، جَمْع جبرونوروك، ص.ب. 47، ياكوف، إسرائيل.

تم إعدادها في أيلول 2024 بموجب تعليمات وزارة الصحة. لا تشمل هذه النشرة كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفّر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما الرجاء مراجعة الطبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

عاراقا 10 ملغ: 121-78-30132

عاراقا 20 ملغ: 121-79-30133

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة أغلب هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.