

Инструкция по применению препарата, в соответствии с "Положением о фармацевтах (Препараты)" - 1986

Лекарство продается без рецепта врача

Тародент Ополаскиватель для рта

0.2% w/v

Активное вещество

Хлоргексидина глюконат 0.2% w/v chlorhexidine gluconate

Неактивные ингредиенты и аллергены в препарате: см. пункт 6 «Дополнительная информация».

Внимательно прочтите инструкцию до конца, прежде чем начать применение препарата. Инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Необходимо применять данный препарат согласно указаниям в пункте дозировки настоящей инструкции. Если вам потребуется дополнительная информация, проконсультируйтесь у фармацевта.

1. Для чего предназначен данный препарат?

- Для замедления образования зубного налета
- Как вспомогательное средство для лечения воспаления десен (гингивита) и его профилактики
- Как вспомогательное средство для поддержания гигиены ротовой полости
- Для применения после стоматологических операций или процедур, способствует заживлению десен
- Для применения при язвах и воспалениях при использовании зубных протезов и при грибковой инфекции ротовой полости

Терапевтическая группа: Антисептик (против инфекции)

2. Перед применением препарата

Не следует применять препарат если:

Вы страдаете аллергией на активное вещество хлоргексидина глюконат или на любой из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате (см. пункт 6).

Особые предостережения в связи с приемом препарата:

- **Не следует применять препарат у детей младше 12 лет** без рекомендации врача.
- **Следует применять препарат только в ротовой полости.** Не глотать. Следует тщательно промыть глаза и уши водой при контакте препарата с ними.
- **При тяжелой аллергической реакции, вам следует прекратить применение препарата и немедленно обратиться за помощью.** См. пункт 4 «Побочные явления».
- **Зубные пасты могут нарушить действие ополаскивателя для рта.** После чистки зубов основательно прополощите полость рта водой и подождите 5 минут, прежде чем использовать Тародент Ополаскиватель для рта, либо используйте ополаскиватель для рта в другое время в течение дня.
- **Не следует отбеливать ткани,** которые находились в контакте с ополаскивателем для рта.
- **На зубах и языке могут временно появляться пятна.** См. пункт 4 «Побочные явления».
- Возможно, что наступят **изменения вкусовых ощущений или ощущение жжения, покалывания или мурашек в ротовой полости.** См. пункт 4 «Побочные явления».

Дети и подростки

Препарат предназначен для применения у пациентов старше 12 лет. У детей младше указанного возраста следует обратиться к врачу перед использованием.

Межлекарственные взаимодействия/реакции

Если вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и грудное вскармливание

Можно применять препарат, если вы беременны или кормите грудью.

3. Как применять препарат?

Вам нужно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, если вы не уверены в отношении дозировки и способа приема препарата.

Обычная общепринятая дозировка:

Используйте препарат два раза в день. Наполните мерный стаканчик до линии отметки 10 мл. Тщательно прополощите полость рта в течение одной минуты, а затем выплюньте раствор.

Воспаление десен: рекомендуется применять в течение месяца.

Язвы в ротовой полости и грибковая инфекция ротовой полости: продолжайте применение препарата в течение двух дополнительных дней после заживления.

Воспаления ротовой полости вследствие зубных протезов: чистите свои зубные протезы и кладите их в раствор ополаскивателя для рта на 15 минут дважды в день.

После стоматологических операций: полощите в соответствии с указаниями стоматолога.

Если симптомы не проходят, **обратитесь к врачу.**

**Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Не глотать.**

Если вы приняли слишком высокую дозу препарата, или если по ошибке препарат проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку от препарата.

Не следует принимать лекарства в темноте! Необходимо проверять этикетку препарата и его дозу каждый раз, когда вы принимаете препарат. Если вы пользуетесь очками, наденьте их.

Если у вас есть дополнительные вопросы по поводу применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные явления

Как и в случае с любым другим препаратом, применение Тародента Ополаскивателя для рта может вызывать побочные явления у некоторых

пользователей. Не пугайтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что вы не испытаете ни одно из них.

Следует прекратить использование ополаскивателя для рта и немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас появились сыпь, отек губ, языка, гортани или лица или если у вас присутствует затруднение дыхания. Эти явления могут быть симптомами тяжелой аллергической реакции, которая является крайне редкой.

Следует прекратить использование ополаскивателя для рта и обратиться к врачу, если возникли раздражение в ротовой полости, боли или отек внутренней части щек. Эти явления должны пройти после прекращения лечения.

Дополнительные побочные явления:

- Временное появление пятен на языке. Это явление исчезает после прекращения лечения.
- Временное появление пятен на зубах. Обычно можно устранить их посредством чистки зубов. Вы можете предотвратить появление пятен, если будете воздерживаться от питья чая, кофе и красного вина (особенно, в течение одного часа после применения препарата), и посредством ежедневной чистки зубов зубной пастой (см. пункт 3 «Как применять препарат?»). Если пятна не исчезают, то можно удалить их путем профессиональной чистки и полировки зубов у стоматолога или зубного гигиениста. Вы можете чистить зубные протезы с помощью средств для чистки зубных протезов.
- Вы можете почувствовать изменение вкусовых ощущений, ощущение жжения, мурашек или покалывания на языке при первом применении ополаскивателя для рта. Обычно эти явления прекращаются при дальнейшем использовании.
- Если у вас происходит шелушение кожи внутри ротовой полости, разбавьте ополаскиватель для рта равным количеством воды.

При появлении побочного явления, а также если какое-либо из побочных явлений усугубляется или если вы страдаете побочным явлением, не указанным в данной инструкции, вам следует проконсультироваться у врача.

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщение о побочных явлениях лекарственного лечения», которая находится на главной странице интернет-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), чтобы перейти на электронный бланк сообщения о побочных явлениях, или перейдя по ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. Как хранить препарат?

- Не отравитесь! Этот препарат, как и любое другое лекарство, следует хранить в закрытом месте, не доступном для детей и (или) грудных детей, и вне поля их зрения. Таким образом, вы сможете предотвратить отравление препаратом. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.
- Не следует применять препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Сроком годности препарата является последний день указанного на упаковке месяца.
- Храните препарат в прохладном и темном месте.
- Храните препарат в оригинальной упаковке.
- Упаковка 300 мл: можно использовать в течение до 9 месяцев после первого открытия.
Упаковка 50 мл: можно использовать в течение до 1 месяца после первого открытия.

6. Дополнительная информация

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит:

Purified water, sorbitol 70% solution, alcohol, polysorbate 80, peppermint oil

Как выглядит препарат и содержимое упаковки:

Прозрачный раствор (от полностью прозрачного до слегка мутного) с запахом мяты. Препарат продается в пластмассовой бутылке с крышкой, недоступной для открытия детьми, и мерным стаканчиком. Бутылка содержит 300 мл или 50 мл раствора. Возможно, что в продаже находятся бутылки не всех размеров.

Производитель и владелец регистрации и его адрес:

«Таро Таасия Рокхит Лтд.», Ул. Ха-Китор 14, Хайфский залив 2624761.

Отредактирована в сентябре 2024 года.

Регистрационный номер препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения: 060-32-27698-00