

**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

## Алкоголь 70% Флорисх Раствор

### Состав:

Алкоголь 70% об./об. (Alcohol 70% v/v)  
Список неактивных компонентов и аллергенов приведен в пункте 6 («Дополнительная информация»).

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приёмом препарата.** Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Препарат предназначен для взрослых, детей и подростков.

Следует применять данный препарат согласно указаниям из раздела 3 данной инструкции – «Как использовать препарат». Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) обострились или если не наблюдается улучшения.

### 1. Показания к применению:

Препарат предназначен для дезинфекции кожи.

**Терапевтическая группа:** антисептики (дезинфицирующие средства).

### 2. Перед применением препарата

**Не следует принимать препарат в следующих случаях:**

- Гиперчувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому другому компоненту, содержащемуся в препарате. Список неактивных компонентов приведен в пункте 6 «Дополнительная информация».
- В непосредственном контакте с глазами, мозгом, мозговыми оболочками, средним ухом или наружным ухом, когда барабанная перепонка перфорирована.
- В форме инъекций.
- В естественных отверстиях (например, нос, уши).
- При использовании аппарата диатермии (определенный вид хирургической аппаратуры), после применения алкоголя

необходимо удостовериться, что нет скопления алкоголя, а также что кожа пациента сухая, равно как и все изделия из ткани в непосредственной близости от него.

### Особые предостережения относительно использования препарата

- Если лекарство дано по ошибке в инфузии - возможно, необходимо будет переливание крови, чтобы нейтрализовать гемолиз.
- Недопустимо приближать препарат к источникам тепла или к огню.
- Нельзя зажигать сигарету или приближаться к открытому огню до полного высыхания препарата.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

**Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, продаваемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили лечение другим лекарством, сообщите об этом врачу или фармацевту.**

### 3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа применения препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

**Не превышать рекомендуемую дозу.**

#### Прием препарата:

**Не глотать!** Препарат предназначен исключительно для наружного использования. Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки. В случае контакта промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

**Рекомендуемые дозы:** принятая дозировка, как правило - по необходимости.

#### Способ применения:

Всякий раз, когда это необходимо, протирать участок кожи, подлежащий антисептической обработке, ватой, смоченной в спирте. В случае передозировки или случайного приема препарата ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы; покажите упаковку препарата.

**Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом приеме препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке.**

**Если нужно, надевайте очки.**

**Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата,**

**проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.**

### 4. Побочные эффекты:

Как и при применении любого другого препарата, использование спирта может вызвать побочные эффекты у некоторых пользователей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Побочные эффекты неизвестной частоты:

- аллергические реакции (например: кожное воспаление, зуд, покраснение, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, волдыри).
- В случае проявления какой-либо из перечисленных реакций следует прекратить использование и немедленно обратиться за медицинской помощью.

**В случае появления или обострения какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.**

### Извещение о побочных эффектах

Сообщить о побочных эффектах в министерство здравоохранения можно, заполнив форму отчета о побочных эффектах по ссылке «Отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на домашней странице веб-сайта Министерства здравоохранения ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), или по ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. Как хранить препарат?

- Не допускайте отравления! Во избежание отравлений данный препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.
- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. Date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

#### Условия хранения:

- Хранить в прохладном месте, при температуре ниже 25°C.
- Флакон должен быть плотно закрытым.
- Осторожно! Легковоспламеняющееся вещество. Не допускать приближения к огню.
- После первичного вскрытия упаковки можно использовать препарат вплоть до истечения срока годности, указанного на упаковке.

### 6. Дополнительная информация:

**Помимо активных ингредиентов препарат содержит:**

Purified water

**Как выглядит препарат и содержимое упаковки?**

Прозрачная бесцветная жидкость. Содержимое упаковки: выпускается в расфасовках по 100 мл, 200 мл и 1000 мл. В продаже могут быть представлены не все выпускаемые расфасовки.

#### Производитель и держатель лицензии:

Бен Шимон Флорисх ЛТД, Индустриальный парк Мисгав. Почтовый ящик Мисгав 2017400, Израиль.

Данная инструкция была отредактирована 12/2024 в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения: 057-39-27018-00