

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصادئة (مستحضرات) 1986
يُوصى هذا الدواء بدون وصفة طبيب

سبيريت ساليسيل 2% فلوريس سان

التريكية:

حمض الساليسيليك 2% w/v (Salicylic acid 2% w/v)
المركبات غير الفعالة ومسيبات الحساسية في الدواء - انظر البند 2
"معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" وفي البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نفايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطى هذا الدواء دون الحاجة إلى وصفة طبية وهو غير مخصص عادةً للولاد والأطفال الذين عمرهم أقل من عامين.

يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لتطهير وتقشير الجلد.

المفضلة العلاجية:

مستحضر حال للقرنّ عن فصيلة السالييلات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال المستحضر إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة حمض الساليسيليك أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- لا يجوز إشعال سيجارة أو التواجد بالقرب من نار مشكوفة - هناك خطر لحدوث حروق شديدة. القماش (الملابس)، أغطية السرير، الضمادات وما إلى ذلك) الذي يلامس الدواء يحترق بسهولة بالغة ويشكل خطراً شديداً لنشوب حريق. غسل الملابس وأغطية السرير قد يقلل من تراكم الدواء لكنه لا يزيله بشكل تام.
- يجب الامتناع عن دهن المستحضر على جلد متضرر أو ملتهب.
- يجب الامتناع عن دهن مستحضرات إضافية على نفس المساحة الجلدية بالتزامن مع استعمال المستحضر.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الإن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فاخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والحسوبة:

إذا كنت حاملاً أو قد تكونين حاملاً أو مرضعاً، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء. لا يجوز استعمال الدواء في فترة الحمل أو الإرضاع إلا إذا أُرشدك الطبيب إلى فعل ذلك.

الاستعمال لدى الأولاد

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن أي عرض جانبي وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على الكحول الذي قد يسبب إحساساً بالذبح على الجلد المتضرر.

يحتوي هذا الدواء على 70.08 ملل من الكحول في كل 100 ملل، وهذا التركيز يعادل 0.7008 ملل/ملل.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية استعمال الدواء.

الجرعة الدوائية المتبعة عند غياب تعليمات أخرى من الطبيب هي:

يجب غسل الجلد وتجفيفه، والدهن على الجلد 3-1 مرات في اليوم بواسطة قطعة من القطن المبلل بالمادة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال:

لا يجوز البلع، هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

إذا استعملت خطأ جرعة دوائية أعلى

إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع المُلصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سبيريت ساليسيل 2% فلوريس إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلتق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب عند ظهور الأعراض الجانبية التالية:

ردود فعل تحسسية، جلد جاف وتُهيج جلدي.

الدهن على مساحات كبيرة من الجلد أو على جلد طفل رضيع قد يسبب الدهن، الصمم والمشاكل في السمع.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو أي طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقوي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين في مكان بارد في درجة حرارة لا تزيد عن 25°C.
- تنبيه! مادة قابلة للاشتعال، تحفظ بعيداً عن النار.
- يمكن استعمال المنتج بعد فتحه، إلى أن تنتهي صلاحيته.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Ethanol 96% (Alcohol 96%), Purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنينة بئثة اللون تحتوي على محلول كحولي صاف.

محتوى العبوة: 100 ملل

المصنّع وصاحب الامتياز:

بن مشعون فلوريس م.ض، المنطقة الصناعية ميسجاف، بريد متجول ميسجاف 2017400، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في 01/2025 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة. رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

060-92-27486-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.