

Храните данную информацию при себе и передайте ее другим членам медицинского персонала, участвующим в вашем лечении.

Ваши имя и фамилия:

**Имя и фамилия врача
(выписавшего вам Олюмиант):**

Номер телефона врача:

Предназначено только для пациентов, которым был назначен Олюмиант

Дата утверждения данной карточки в соответствии с указаниями
Министерства здравоохранения декабря 2024 г.

PP-BA-IL-0784

Информация для пациентов о препарате Олюмиант™ (барицитиниб)

Настоящий документ содержит важную информацию, которую вы должны знать перед применением Олюмианта и во время его применения.

- Олюмиант используется для лечения взрослых, страдающих ревматоидным артритом от низкой до серьезной степени активности в тех случаях, когда предшествующее применение одного или более антиревматических препаратов из группы БМАРП (DMARD) не было достаточно эффективным или плохо переносилось пациентом. Можно использовать Олюмиант в качестве единственного препарата или в сочетании с метотрексатом (methotrexate).
- Олюмиант используется у взрослых, подростков и детей в возрасте 2 лет и старше для лечения атопического дерматита от низкой до серьезной степени активности, которым показано системное лечение (лечение всего тела).
- Олюмиант используется для лечения взрослых с тяжелой очаговой алопецией (облысением).
- Олюмиант используется для лечения активного ювенильного идиопатического артрита у пациентов в возрасте 2 лет и старше, которые недостаточно отреагировали на предшествовавшее лечение одним или более препаратами из группы синтетических конвенциональных антиревматических препаратов или болезнь-модифицирующих антиревматических биологических препаратов (БМАРП) [disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)], или страдали непереносимостью этих препаратов:
 - хронического идиопатического ювенильного полиартрита (polyarticular) [воспаление суставов с положительным ревматоидным фактором (rheumatoid factor) [RF+]] или отрицательным ревматоидным фактором [RF-], расширенного олигоарткулярного артрита (extended oligoarticular),
 - энтезит-ассоциированного артрита и
 - ювенильного псориатического артрита.Можно использовать Олюмиант в качестве единственного препарата или в сочетании с метотрексатом (methotrexate).

Для получения полной информации о препарате следует ознакомиться с **Инструкцией по применению**, приложенной к упаковке препарата. Помимо этого, Инструкция по применению находится на интернет-сайте Министерства здравоохранения:

[База данных лекарственных препаратов \(health.gov.il\)](https://health.gov.il)


A MEDICINE COMPANY

Инфекции

Олюмиант способен усугубить существующую инфекцию или повысить риск того, что у вас разовьется новая инфекция, или повысить риск активации вирусов. Если у вас диабет или вам больше 65 лет, риск инфекции может быть выше. Нелеченая инфекция может приобрести серьезный характер. Немедленно сообщите врачу, если у вас возникли симптомы инфекции, например:

- Жар, язвы, повышенная утомляемость по сравнению с обычным состоянием или стоматологические проблемы.
- Кашель, который не проходит, ночное потоотделение и уменьшение веса тела. Эти явления могут быть симптомами туберкулеза (инфекционного заболевания легких).
- Кожная сыпь, сопровождающаяся болями и появлением пузырьков. Эти явления могут быть симптомами опоясывающего лишая.

Немеланоцитарный рак кожи

У пациентов, принимавших Олюмиант, наблюдался немеланоцитарный рак кожи. Если во время или после лечения появляются новые поражения кожи или происходит изменение внешнего вида существующих поражений, сообщите об этом врачу.

Тромбоз

Олюмиант может вызвать состояние, при котором в венах на ногах образуется тромб, способный попасть в легкие. Немедленно сообщите врачу, если вы заметили какой-либо из следующих симптомов:

- Отек или боль в одной из ног или рук
- Ощущение жара или покраснение в одной из ног или рук
- Неожиданная одышка
- Учащенное дыхание
- Боль в груди

Беременность

- Не следует принимать Олюмиант, если вы беременны или полагаете, что можете быть беременны.
- Во время лечения Олюмиантом (и в течение недели после прекращения приема данного препарата) используйте эффективные средства контрацепции.
- Немедленно сообщите врачу, если вы забеременели (или если хотите забеременеть).

Инфаркт миокарда или инсульт

Немедленно сообщите врачу, если вы заметили что-либо из следующего:

- Сильную боль или сильное давление в груди (которые могут распространяться на руки, челюсть, шею, спину)
- Одышку
- Холодный пот
- Одностороннюю слабость в руке и/или ноге
- Неразборчивую речь