

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

هكسيداتيل غسول فم خالٍ من الكحول

التريكية:

كلور هيكسيداتيل ديكلورونات 0.2% w/v

(Chlorhexidine Digluconate 0.2% w/v)

المركيبات غير الفعالة ومسيبات الحساسية في الدواء – انظر

البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" وفي

البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة باعنام حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا

توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقًا للتعليمات الواردة في البند 3

"كيف تستعمل الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي

إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة

الطبيب إذا تعاقمت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

• لإعاقَة تَكُون اللويحة السنوية (الپلاك).

• للمساعدة في علاج ومنع التهاب اللثة (جيجيڤيتيس).

• للمساعدة في الحفاظ على النظافة الصحية للفم.

• لاستعمال بعد الجراحات أو العلاجات السنوية، للحث على

تعافي اللثة.

• لاستعمال في حالة التقرحات وفي التهابات الناجمة عن

أطقم الأسنان وفي التثؤن للفطري في الفم.

الفصيلة العلاجية: مطهر.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• وُجِدَت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة كلور هيكسيداتيل

ديكلورونات أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي

عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

• لا يجوز الاستعمال لدى الأولاد الذين عمرهم دون 12

عامًا إلا بتوصية من الطبيب.

• يجب الاستعمال في تجويف الفم فقط. لا يجوز بلعه. في

حالة ملامسة للتؤلّث للعينين أو الأنثين، يجب شطفهما

جيدًا بالماء.

• في حالة نشوء رد فعل تحسسي شديد، عليك التوقف عن

الاستعمال والتوجه فورًا لتلقي المساعدة. انظر البند 4

"الأعراض الجانبية".

• قد تخل معاجين الأسنان بفعالية غسول الفم. بعد تنظيف

الأسنان بالفرشاة، اشطف فمك جيدًا بالماء وانتظر 5 دقائق

قبل استعمال هكسيداتيل غسول فم خالٍ من الكحول. بدلًا

من ذلك، بإمكانك استعمال غسول الفم أيضًا في وقت آخر

من اليوم.

• لا يجوز تبييض الأقمشة التي لامست غسول الفم.

• قد يظهر تطخيش (تصبغ) مؤقت للأسنان واللسان. انظر

البند 4 "الأعراض الجانبية".

• قد يطرأ تغير على الإحساس بالطعم، أو يستشعر بإحساس

بالذغ، والوخز أو التتميل في تجويف الفم. انظر البند 4

"الأعراض الجانبية".

الأولاد والمراهقون:

الدواء مخصص للاستعمال لدى متلّقي العلاج الذين يزيد

عمرهم عن 12 عامًا. إذا كان العمر دون ذلك فيجب مراجعة

الطبيب قبل الاستعمال.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما

في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر

الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع:

يمكن استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعًا.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على المركب "PEG 40 Hydrogenated"

Castor Oil (يسمى أيضًا: Macroglycolerol

Hydroxystearate) الذي قد يسبب ردود فعل جلدية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من

الجرعة الدوائية ومن كيفية استعمال الدواء.

الجرعة الدوائية المبتعة عادة هي: مرتان في اليوم.

• التهاب اللثة: يوصى بالاستعمال لمدة شهر.

• الفروخ في الفم والتثؤن الفطري في الفم: يجب الاستمرار

بالاستعمال لمدة يومين بعد الشفاء.

• التهابات الفم الناجمة عن أطقم الأسنان: يجب تنظيف

ونقع طقم أسنانك في غسول الفم لمدة 15 دقيقة مرتين

في اليوم.

• بعد الجراحات السنوية: يجب اتباع تعليمات طبيب الأسنان

الخاص بك.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول:

لا يجوز بلعه.

يجب الاستعمال فقط إذا كان قفل السداد موجودًا ويشكله

الكامل قبل الفتح.

تعليمات الاستعمال:

يجب تعبئة كأس القياس الصغيرة حتى خط 10 مل، وشطف

الفم جيدًا بالدواء لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك يجب بصق

الدواء.

إذا استمرت الأعراض، فراجع الطبيب.

إذا استعملت خطأ جرعة دوائية أعلى

إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ،

فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى

وأخضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العمارة راجع الملصق وتأكد من

الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية

إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر

الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هكسيداتيل غسول فم خالٍ من

الكحول إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تلقَ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من

أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا لتلقي

المساعدة الطبية إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين

الأعراض التالية:

• طفح جلدي

• انتفاخ في الشفتين، اللسان، الحلق أو في الوجه

• صعوبات في التنفس

قد تكون هذه الأعراض أعراضًا لرد فعل تحسسي خطير

ونادر جدًا.

يجب التوقف عن استعمال الدواء ومراجعة الطبيب إذا ظهر

لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

• تهيج في الفم

• ألم

• انتفاخ الجانب الداخلي للخدين

يُفترض أن تزول هذه الأعراض عند إيقاف العلاج.

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) – أعراض

تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين 10 مستعملين:

تطخيش (تصبغ) مؤقت للسان ويتلاشى عند إيقاف العلاج.

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر عند

10-100 مستعملين من بين 100:

• جفاف في الفم.

تغير في حساسية الذوق، إحساس بالذغ، تتميل، أو وخز

في اللسان عندما تستعمل غسول الفم لأول مرة. يزول ذلك

عادة مع الاستمرار بالعلاج.

إذا استمرت الأعراض – فيجب التوجه إلى الطبيب.

أعراض جانبية مدى شئوعها غير معروف (أعراض لم يتم

تحديد مدى شئوعها بعد):

• تطخيش (تصبغ) مؤقت للأسنان وعادةً يمكن إزالته عن

طريق التنظيف بالفرشاة. يمكن منع حدوث هذا التطخيش

بواسطة الامتناع عن شرب الشاي، القهوة أو النبيذ الأحمر –

خاصةً ساعة بعد الاستعمال، وأيضًا عن طريق تنظيف

الأسنان اليومي بالفرشاة وبمعجون الأسنان (انظر البند 3

"كيف تستعمل الدواء"). إذا بقي التطخيش، فيمكن إزالته

بواسطة التنظيف والصلق لدى طبيب الأسنان أو أخصائية

صحة الأسنان.

بالنسبة لأطقم الأسنان – يمكن تنظيفها بواسطة مادة

لتنظيف أطقم الأسنان.

• انتفاخ في غدد اللعاب.

• تقشر الجلد داخل الفم. لاجتناب حدوث ذلك، يجب تخفيف

غسول الفم بكمية مساوية من الماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تعاقم أحد الأعراض الجانبية أو

إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة،

فعلِك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج

الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(www.health.gov.au) والذي يوجّه إلى الاستمارة

المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق النحول

إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في

مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال

الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب

التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

(exp. Date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء

الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

• خزّنه في درجة حرارة أقلّ من 25 درجة مئوية.

• يجب حفظه في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.

• يجب استعمال الدواء لِمَا لا يزيد عن 6 أشهر منذ فتح

القنينة لأول مرة، ودون تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية

المدوّن على العبوة.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على المواد

غير الفعالة التالية:

Purified Water, Sorbitol Solution, Glycerin

(Glycerol), PEG 40 Hydrogenated Castor

Oil, Flavor Pineapple, Peppermint Oil,

Sucralose.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنينة لونها بني تحتوي على محلول صاف. تأتي مع كأس

قياس صغيرة.

حجم العبوة: 300 ملل.

المصنّع وصاحب الإمتياز: بن شمعون فلوريس م.ض،

المنطقة الصناعية مسيخاف، بريد متجول 2017400،

إسرائيل.

خُررت في كانون الثاني/يناير 2025 وفقًا لإرشادات وزارة

الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة

الصحة:

161-78-35103-00

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة

بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص

لكلا الجنسين.