

Oxycod 2 mg/ml Syrup – עדכון עלונים

מעבדות רפא מבקשת להודיעך על עדכון בעלונים לרופא ולצרכן של התכשירים שבנדון.

מרכיב פעיל: Oxycodone Hydrochloride

חוזק: 2 mg/ml

התוויה: For the relief of moderate to severe pain

פרטי העדכון העיקריים הינם:

(טקסט שהושמט מסומן באדום עם קו חוצה, טקסט שנוסף מסומן בכחול, טקסט המהווה החמרה מודגש בצהוב).

עלון לרופא:

4.4 Special warnings and precautions for use

Hepatobiliary disorders

Oxycodone may cause dysfunction and spasm of the Sphincter of Oddi, thus raising intrabiliary pressure and increasing the risk of biliary tract symptoms and pancreatitis. Therefore, oxycodone has to be administered with caution in patients with pancreatitis and diseases of the biliary tract.

4.8 Undesirable effects

Hepato-biliary disorders:

Uncommon: increased hepatic enzymes, biliary colic.

Frequency not known: cholestasis, spasm of sphincter of Oddi.

עלון לצרכן:

2 . לפני השימוש בתרופה

אזהרות נוספות:

- יש לפנות לרופא אם אתה סובל מכאבים חזקים בבטן העליונה שעשויים להקרין לגב, או מבחילות, הקאות וחום. היות שתסמינים אלה יכולים להעיד על דלקת בלבלב או בדרכי המרה.

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

..... הפרעה בתפקוד מסתם על שם "אודי" (מסתם במערכת העיכול), אשר עלולה לגרום לכאבים חזקים בבטן העליונה (sphincter of Oddi dysfunction).....

למידע המלא יש לעיין בעלונים המפורסמים בצמוד להודעה זו.
 העלונים פורסמו [במאגר התרופות של משרד הבריאות](#) . ניתן לקבל העתק מודפס שלהם באמצעות פנייה
 לחברת מעבדות רפא בע"מ בטל': 02-5893939 או בכתובת דוא"ל RA@rafa.co.il .

בכבוד רב,

מעבדות רפא

