

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רינולסט, תמיסה לאף

חומר פעיל:

Azelastine Hydrochloride 0.1% w/v

לחיצת ספריי אחת (0.14 מ"ל) מכילה:

אזלאסטין הידרוכלוריד 0.14 מ"ג

Azelastine Hydrochloride 0.14 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 6, "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

רינולסט נועד לטיפול בנזלת אלרגית עונתית או שנתית, במבוגרים וילדים מעל גיל 6.

קבוצה תרפויטית:

אנטי היסטמין דור שני, פוטנטי, סלקטיבי.

התרופה פועלת על ידי מניעת האפקט של היסטמין המופרש בגוף כחלק מתגובה אלרגית.

רינולסט נועד לטיפול באלרגיות המופיעות בעונות מסוימות של השנה, לדוגמה אלרגיה לאבקנים הנקראת קדחת השחת. כמו כן, רינולסט נועד לטיפול באלרגיות המופיעות כל השנה, לדוגמה אלרגיה לקרדית אבק הבית או אלרגיה לפרוות חתולים או כלבים.

לרוב, האלרגיה תגרום לך לנזלת, התעטשויות, גירוד או אף סתום. רינולסט יכול להקל על סימפטומים אלו.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (Azelastine Hydrochloride) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה פרק 6 'מידע נוסף').

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש ברינולסט.

ילדים ומתבגרים:

התרופה זו לא מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים.

אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. עד כה לא דווח על אינטראקציות עם תרופות אחרות.

הריון, הנקה ופוריות:

אם הינך בהריון, מניקה, חושבת כי הינך בהריון או מתכננת הריון, יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש.

נהיגה ושימוש במכונות:

לרינולסט אין השפעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.


המינון יופיע על התווית המודבקת על האריזה על ידי הרוקח. אם לא מופיע המינון או אם אינך בטוח, שאל את הרופא או הרוקח. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

ריסוס אחד בכל נחיר, פעמיים ביום (בבוקר ובערב).

אין לעבור על המנה המומלצת.

כיצד להשתמש ברינולסט ספריי

1. ראשית יש לקנח את האף.
2. יש להסיר את כיסוי המגן (איור 1)
3. לפני השימוש הראשון יש ללחוץ כמה פעמים על המשאבה עד לקבלת תרסיס אחיד (איור 2)
4. רסס פעם אחת בכל נחיר כשהראש זקוף. אין להטות את הראש לאחור (איור 3)
5. נגב את פיית המשאבה והחזר את כיסוי המגן



אם נטלת בטעות מיון גבוה יותר, לא צפויים סימפטומים, פנה לרופא אם אתה מודאג. אם בטעות בלעת מן התרופה, או אם ילד בלע מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר המיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם בטעות נכנס לך רינולסט לעיניים, שטוף אותם עם הרבה מים. יתכן כי תחוש עקצוץ בעיניים לזמן מה.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, טול את המנה ברגע שנזכרת ולאחר מכן, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אל תיטול מנה כפולה על מנת לפצות על זו שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל את תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או רוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברינולסט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100:

- טעם לא נעים בפה המורגש במיוחד אם אתה מטה את ראשך אחורה בעת השימוש. במקרים נדירים הטעם הלא נעים בפה עלול לגרום לבחילה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000:

- גירוי של רירית האף (עקצוץ וגירוד) עיטוש ודימום מהאף.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) תופעות שמופיעות בכחות ממשמש אחד מתוך 10,000:

- תגובות של רגישות יתר כגון פריחה, גרד, אורטיקריה (סרפדת, חרלת).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי תווית הבקבוקון והאריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C. אין לשמור בקירור.
- ניתן להשתמש במשך 6 חודשים לאחר הפתיחה.
- אל תשליך תרופות דרך שפכים או פסולות ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאתה כבר לא משתמש בהן. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Purified water, Sodium chloride, disodium phosphate dodecahydrate, Hypromellose, disodium edetate, citric acid
- לחיצת ספריי אחת (0.14 מ"ל) מכילה 0.14 מ"ג של החומר הפעיל Azelastine Hydrochloride
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
רינולסט מכילה תמיסה שקופה הארוזה בבקבוק זכוכית חום המכיל 5 מ"ל, 10 מ"ל או 20 מ"ל. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
- **בעל הרישום וכתובתו:** מגאפארם בע"מ, התדהר 15, רעננה, ישראל.
- **שם היצרן וכתובתו:** Madaus Troisdorf, טרויסדורף, גרמניה.
- נערך אוקטובר 2024.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 118-44-29866-00
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.