

**نشرة للمستهيك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986**

يُتَوقَّع الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## فِيبياكس XR 75

### حسبولات ذات إطلاق ممتد

## فِيبياكس XR 150، فَيبياكس XR 225

### أقراص ذات إطلاق ممتد

**فِيبياكس XR 75**: تحتوي كل حبيسولة ذات إطلاق ممتد على فينلافاكسين كيبيروكلوريد (Venlafaxine as hydrochloride) 75 ملغ **فِيبياكس XR 150**: **فِيبياكس XR 225**: يحتوي كل قرص ذي إطلاق ممتد على فينلافاكسين كيبيروكلوريد (Venlafaxine as hydrochloride) 150 أو 225 ملغ على التوالي.
المواد غير الفعّالة ومسيبات الأرحية في الدواء – انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة **بإمعان حتى نهايتها** قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصفت هذا الدواء من أجل علاجك. لا تطعه لأخرين. قد يضرهم هذا الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

تزيد الأدوية المضادة للاكتئاب (Antidepressants) من خطر نشوء تصرفات وأفكار انتحارية لدى الأولاد والمراهقين والبالغين والقيمين.

عند البدء بالعلاج بالدواء، يجب على متلقي العلاج من جميع الأعمار وعلى أقرابهم أن يتنبهوا للتغيرات السلوكية مثل: تقادم الاكتئاب، الأفكار الانتحارية، العنوانية وما شابه ذلك. إذا حدثت تغيرات كهذه، فراجع التوجه فوراً إلى الطبيب.

### 1. لأي غرض خصص هذا الدواء؟

**فِيبياكس XR** مخصص لعلاج متلقي العلاج الذين يعانون من الاكتئاب وأيضاً لعلاج المادوم للاكتئاب المتكرر. كذلك، لعلاج متلقي العلاج الذين يعانون من مشكلتي القلق التشنجيين؛ القلق العام والقلق الاجتماعي. لا يمكن أن يتناول بالثأثير، عادةً ما يقارب أسبوعين، لكن قد تستغرق حتى وقتاً إلى الزيادة في أنتاج الأحيان. قد تظهر هذه الأفكار أيضاً عندما يتم تقليل الجرعة

**الفصيلة العلاجية:** ينتمي فينلافاكسين إلى فصيلة الأدوية المثبطة لاسترداد السيروتونين والنورإبينيفرين (SNRIs). تستعمل هذه الفصيلة الأوية لعلاج الاكتئاب وحالات أخرى، مثل اضطرابات القلق المختلفة. أيّة عمل مضادات الاكتئاب ليست واضحة بما فيه الكفاية، لكن الأوية تستطيع أن تؤثر عن طريق رفع مستويات السيروتونين والنورإبينيفرين في الدماغ.

هناك أهمية بالغة لعلاج الاكتئاب وأمراض القلق. دون علاج، يُحتمل ألا يزول وضعك بل قد يتفاقم، بحيث يصبح من الصعب علاجك من المستقبل.

### 2. قبل استعمال الدواء

**لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

- وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة (فينلافاكسين) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كنت تستعمل الآن أو استعملت في الماضي أدوية لعلاج الاكتئاب أو الأركينسون من نوع مثبطات الأترزيم مونوامين أوكسيداز (MAOIs). استعمال أدوية من نوع (MAOIs) مع **فِيبياكس XR** قد يسبب أعراضاً جانبية خطيرة وتشكل خطراً على الحياة. يجب الانتظار 14 يوماً من موعد انتهاء العلاج بـ MAOI وحتى بداية العلاج ب**فِيبياكس XR**، وما لا يقل عن 7 أيام من موعد انتهاء العلاج ب**فِيبياكس XR** وحتى بداية العلاج بـ MAOI. انظر البند "التفاعلات بين الأدوية" والمعلومات في هذا البند عن "متلازمة السيروتونين".

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**

**قبل العلاج بفيبياكس XR، أخبر الطبيب إذا:**

• كنت تستعمل أدوية إضافية تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة السيروتونين عند استعمالها سوياً مع **فِيبياكس XR** (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية")

• كنت تعاني من أمراض في العينين، مثل أنواع معينة من الزرق/الجلوكوما (تزايد ضغط داخل العين)

تستطيع السيطرة عليها، فتوجه فوراً إلى الطبيب.

انظر البند 4 "الأعراض

الجانبية" لمزيد من المعلومات.

**الاستعمال لدى الأولاد والمراهقين دون سن الـ 18**
لا يوصى باستعمال هذا الدواء لدى الأولاد والمراهقين دون سن الـ 18. هناك ليكن في علمك أن الأولاد والمراهقين دون سن الـ 18 هم أكثر عرضة لخطر نشوء أعراض جانبية، مثل مشكلة الانتحار، الاكتئاب الانتحارية والعنادية (لا سيما العدوانية، المقاومة والغضب) عند استعمالهم لدواء من هذا النوع.

لا يرغب من ذلك، بإمكان الطبيب أن يصف هذا الدواء لمتلقي العلاج دون سن الـ 18 إذا كان يعتقد أن هذا الشيء لصالحهم. إذا وصف الطبيب الدواء لمتلقٍ للعلاج دون سن الـ 18 وكنت ترغب في استشارة الطبيب بشأن ذلك، فراجعه ثانية. يجب إبلاغ الطبيب إذا ظهر أو تفاقم واحد أو أكثر من بين الأعراض الفعّلة أعلاه لدى متلقي العلاج دون سن الـ 18 الذين يستعملون الدواء. كذلك، لا تتوقف عن تناول المضامين الشخصية طويلاً إلا بعد منظور السلامة الدوائية على النمو والبلوغ والتطور المعرفي والسلوكي في هذه الفئة العمرية.

**المخاطر والمخيبة**

**فِيبياكس XR** قد يسبب في بعض الأحيان أعراضاً غير مرغوبة ولن تكون مندرجا لها، مثل ارتفاع ضغط الدم أو تغير قلبي غير سوي، تغيرات طفيفة في مستويات إنزيمات الكبد أو مستويات السيروتوم أو الكوليسترول في الدم. في أحيان أكثر ناعداً، قد يدخل **فِيبياكس XR** بتفاعلية الصفائح الدموية ويؤدي إلى ارتفاع في خطر نشوء كدمات أو نزيف موهي. لذلك، يُحتمل أن يظلم الطبيب إجراء فحوصات من حين إلى آخر، خاصة إذا كنت تستعمل **فِيبياكس XR** لفترة مطولة.

### التفاعلات بين الأدوية

**إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. يجب التوقف عن استعمال أي أدوية باستعمال أدوية، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبي وإضافات غذائية دون استشارة الطبيب أولاً. سيقدر الطبيب ما إذا كنت تستطيع استعمال فَيبياكس XR سوياً مع أدوية أخرى.**

- لا يجوز استعمال مثبطات مونوامين أوكسيداز (MAOIs) المستعملة لعلاج الاكتئاب أو مرض الباركنسون سوياً مع **فِيبياكس XR**. أخبر الطبيب إذا استعملت أدوية من هذا النوع في الأيام الـ 14 الأخيرة 24 قبل بدء العلاج بـ **فِيبياكس XR** (انظر البند "متلازمة السيروتونين: الأعراض الجانبية") عند العلاج بفينلافاكسين، خاصة عند استعمال أدوية إضافية في نفس الوقت.
- أمثلة على هذه الأدوية تشمل على: تريبتانات (المجبرنة)
- أدوية أخرى لعلاج الاكتئاب، مثل: مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينيفرين (SNRIs)، مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات (MAOIs) من نوع مثبطات مونوامين أوكسيداز (MAOI) (لعلاج الاكتئاب)
- سيبروترامين (لإفصاح الوزن)
- الأفيونات (مثل بوبرينورفين، ترامول، فينتانيل، تالينتابول، بينيدين أو بنتازورسين) لعلاج الألم الشديد
- ديكنترولوميثوفان (لتخفيف السعال)
- ميتيدون (لعلاج الإدمان على الأفيونات أو لعلاج الألم الحاد)
- ميتيلين أزرق (لعلاج المستويات المرتفعة لمتيبيومجولين في الدم)

• مستحضرات تحتوي على St. John's Wort (المسمى أيضاً بالعرن المقوب، وهو خلاصة نباتية تستعمل لعلاج الاكتئاب) (الطفيف)

• مستحضرات تحتوي على تريثوفان (لمشاكل النوم والانتكاب)
• أدوية مضادة للذهان (لعلاج المرض المصوب بأعراض مثل: مساح أو رؤية أشياء أو الإحساس بأشياء غير موجودة في الحقيقة، أفكار وهمية، ارتباك شاذ، منطوق غير واضح، آتراء).

علامات وأعراض متلازمة السيروتونين قد تشمل على مزيج من الهياج (عدم الهدوء)، الهلوسة، والتأنيث التناسق الحركي، نظم قلبي سريع، ارتفاع في حرارة الجسم، تغيرات سريعة في ضغط الدم، تزايد التشنجات، إسهال، غثوية، غثيان، قيء، تورم. يمكن أن تشبهه متلازمة السيروتونين بأشد أشكالها مع المتلازمة الخبيثة (أيضاً المصنفة لمتلازمة NMS). قد تشمل علامات وأعراض هذه المتلازمة على مزيج من الحمى المرتفعة، النظم القلبي السريع، التعرق، التصلب الشديد في العضلات، الارتباك، الارتعاج في الإنزيمات العضلية (قبل تحديده في فحص الدم).

**أخبر الطبيب فوراً أو توجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمتلازمة السيروتونين.**

يجب إعلام الطبيب إذا كنت تستعمل أدوية تؤثر على نظم القلب، مثل: أدوية لعلاج اضطرابات نظم القلب مثل: كيتيدين، أميودارون، سوتالول أو دوفيتيلين.

أدوية مضادة للذهان مثل ثيوريذازين (انظر أيضاً "متلازمة السيروتونين" أعلاه)

• مضادات حيوية مثل إريثروميسين أو موكسيفلوكساسين (لعلاج التلوث الجرثومي)

• مضادات الهيستامين (لعلاج الأرجية)

يُحتمل أن تتفاعل الأدوية التالية مع **فِيبياكس XR**، لذلك يجب استعمالها بحذر. من المهم بشكل خاص إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل أدوية تحتوي على:

- ديكورثازول (دواء مضاد للقلطريات)
- هالوبريدول أو ريسبيريدون (لعلاج الحالات النفسية)
- ميتوبرولول (حاصر بيتا، لعلاج فرط ضغط الدم ومشاكل القلب)

### استعمال الدواء والطعام

يجب تناول **فِيبياكس XR** مع الطعام (انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء").

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يجب الامتناع عن استهلاك الكحول في فترة استعمالك ل**فِيبياكس XR**.

- لا يجوز شرب الكحول خلال فترة العلاج ب**فِيبياكس XR**: لأنه قد يؤدي إلى التعب الشديد والهبوط عن الوعي. الاستعمال بالتوازي مع الكحول أو/أو مع أدوية معينة قد يفاقم أعراض الاكتئاب وحالات أخرى، مثل اضطراب آيات القلق.

**الصحة والإرضاع**
إذا كنت حاملاً أو مرضعاً أو تظنين أنك حامل أو تخططين حملاً، فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

يمكن استعمال **فِيبياكس XR** فقط بعد استشارة الطبيب بخصوص الفائدة المحتملة وبخصوص المخاطر المحتملة على الجنين.

يجب إعلام الطبيب إذا كنت تستعمل **فِيبياكس XR** خلال فترة الحمل. لا يستعمل هذا الدواء خلال فترة الحمل، قد تزيد الأدوية المسماة (مثبطات استرداد السيروتونين SSRIs) من خطر نشوء فرط ضغط الدم الرئوي أو الأديوية التي تحتوي على الليثيوم
أدوية تحتوي على:
• الأميغامينات (لعلاج اضطراب نقص الانتباه والتركيز - ADHD، التحفيق وفرط النشاط)
• لينيزوليد، مضاد حيوي (لعلاج التلوثات)
• موكلوبيديم، نوع من مثبطات مونوامين أوكسيداز (MAOI) (لعلاج الاكتئاب)
• سيبروترامين (لإفصاح الوزن)
• الأفيونات (مثل بوبرينورفين، ترامول، فينتانيل، تالينتابول، بنيدين أو بنتازورسين) لعلاج الألم الشديد
• ديكنترولوميثوفان (لتخفيف السعال)
• ميتيدون (لعلاج الإدمان على الأفيونات أو لعلاج الألم الحاد)
• ميتيلين أزرق (لعلاج المستويات المرتفعة لمتيبيومجولين في الدم)

• مستحضرات تحتوي على St. John's Wort (المسمى أيضاً بالعرن المقوب، وهو خلاصة نباتية تستعمل لعلاج الاكتئاب) (الطفيف)

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دوماً بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية وكيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الابتدائية المتبعة عادةً هي 75 ملغ في اليوم. قد يرفع الطبيب الجرعة الدوائية بحسب الحاجة.

**يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

### كيفية تناول

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من نقص الطعام في نفس الساعة تقريبًا كل يوم، في الصباح أو في المساء. يجب إبلاغك عما كلام مع الماء. **يمنع هرس/سطر/مصغ/إذابة الدواء** وذلك كي لا يتضرر الإطلاق الممتد للدواء.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكليتين، لأن جرعة الدواء قد تكون مختلفة.
**لا يجوز التوقف عن استعمال الدواء دون استشارة الطبيب.** الإيقاف الفجائي قد يسبب أعراض الانتكاب (انظر أيضاً البند "إذا توقفت عن استعمال الدواء").

### إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بإعطاء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

قد يشكّل فرط الجرعة خطراً على الحياة، خاصةً عند الاستعمال بالتوازي مع الكحول وأو/أو مع أدوية معينة (انظر "التفاعلات بين الأدوية" في البند 2).

قد تشمل أعراض فرط الجرعة الدوائية على: نظم قلبي سريع، تغيرات في مستوى البوظة (في المدى بين الأولى إلى النوم والعيوية)، تشنوش الرئوية، اختلاجات أو تشنجات وتقيؤات.

### إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تشكرك. لكن إذا جان موعد الجرعة التالية، فيجب أن تتخطى الجرعة التالية وأن تتناول الجرعة التالية كالمعتاد. لا يجوز إطلاقاً استعمال جرعتين معاً لتعويض عن الجرعة النسيبة! لا يجوز تناول ما يزيد عن الجرعة اليومية التي وصفت لك.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.
**إذا توقفت عن استعمال الدواء**

حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء أو تقليل الجرعة الدوائية دون استشارة الطبيب. سيرشك الطبيب إلى كيفية تقليل الجرعة الدوائية بشكل تدريجي قبل الإيقاف التام للعلاج إذا اعتقد أنك لم تعد بحاجة إلى العلاج بهذا الدواء.

التوقف الفجائي عن استعمال الدواء أو الإخفاض الأسرع من اللازم في الجرعة الدوائية قد يكونان مصحوبين بأعراض جانبية، مثل: الأفكار الانتحارية، العنادية، التعب، النزول، الإحساس بالدوخة، الارتعاج، الصداع، الأرق، الكواب، الجفاف في الفم، الإخفاض في الشهية، الغثيان، التقيؤ، الإسهال، الحمضية، التملل، الارتباك، الطنين في الأذنين، الإحساس بالوخز أو في أحيان نادرة إحساس بصدمة كهربائية، الصدغ، التعرق، الاختلاجات أو الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، المشاكل في الرؤية وارتفاع ضغط الدم (مما قد يسبب صداعاً، دوأماً، طنيناً في الأذنين، تعرقاً وما إلى ذلك).

سيرشك الطبيب إلى كيفية إيقاف العلاج بالدواء بشكل تدريجي. يمكن أن يستغرق ذلك فترة زمنية من عدة أسابيع أو أشهر. يُحتمل أن الأيقاع لدى بعض متلقي العلاج يجب أن يتم بشكل أكثر تدريجاً طوال أشهر أو أكثر. إذا نشأ ليك أي من هذه الأعراض أو أعراض مقلقة أخرى، فاستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في **العصاة/ راجح المصيق وتلك من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.** **ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.**
**إذا توقرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.**

### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **فِيبياكس XR** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

**يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ عند ظهور واحد أو أكثر من بين الأعراض الجانبية التالية:**
**أعراض جانبية غير شائعة** (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1,000):

انتفاخ الوجه، اللسان، الفم، الحلق، البدين أو التمدن أو ما طفق حاد في منير الحكة وبالرز (شرى)، صعوبة في البلع أو في التنفس

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في البلع أو في التنفس وضغط في الصدر، أزيز تنفسي، صعوبة في البلع أو في التنفس

طغف جلدي خطير، حكة أو شرى (حكة جلدية بزررة لونها أحمر أو عديمة اللون، عادة ما تكون منيرة الكفك)
علامات وأعراض متلازمة السيروتونين قد تشمل على هياج (عدم الهدوء)، هلوسة، تغيرات التناسق الحركي، نظم قلبي سريع، ارتفاع في حرارة الجسم، تغيرات سريعة في ضغط الدم، تزايد التشنجات، إسهال، غثيان، غثيان، قيء. يمكن أن تشبهه متلازمة السيروتونين بأشد أشكالها مع المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان (NMS). قد تشمل علامات وأعراض هذه المتلازمة على مزيج من حمى مرتفعة، نظم قلبي سريع، تعرق، تصلب شديد في العضلات، ارتفاع في الإنزيمات العضلية (تقبل تحديده في فحص الدم)

علامات على التلوث مثل حمى مرتفعة، تقيؤ، ارتعاج، صداع، تعرق وأعراض شبيهة بالإنفلونزا. قد تنجم هذه الأعراض عن اضطراب في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تزايد خطر حدوث تلوثات طغف جلدي شديد قد يسبب حوصلات خطيرة وتقرن الجلد.
الأم لا يزال لها في العضلات، حساسية أو ضعف. قد تكون هذه علامات لتحلل العضلات (التحلل الربيديا)

**أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف** (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوها بعد):

علامات وأعراض حالة تسمى "متلازمة القلب المكسور" (stress cardiomyopathy أو takotsubo) (انظر "التفاعلات بين الأدوية")
تشتمل على ألم في الصدر، ضيق التنفس، دوام، إعشاء، نظم قلبي غير منتظم

الأعراض الجانبية الأخرى التي ينبغي أن تخبر الطبيب بها تشمل على (شيوح هذه الأعراض الجانبية يظهر أندانة تحت "أعراض جانبية إضافية يمكن أن تحدث"):

سعال، آزيز تنفسي وضيق التنفس وقد تكون مصحوبة بحمى مرتفعة
براز أسود اللون أو دم في البراز

حكة، جلد أصفر أو عتبان صفراوان، أو بول غامق، وقد تكون هذه أعراضاً لانهاب الكبد (هيپاتيتيس)
مشاكل القلب مثل نظم قلبي سريع أو غير منتظم، ارتفاع ضغط الدم
مشاكل في العينين مثل تشنوش الرئوية، تورع الحقيقتين
مشاكل المتعلقة بالأعصاب مثل دوام، إحسان بالبدائيس والإبر، صعوبة في الحركة (تقلص أو تصلب العضلات)، اختلاجات أو تشنجات
مشاكل نفسية مثل فرط النشاط وإحسان شاذ بالإنفعال المفرط
أعراض الانتكاب (انظر في البند 3 "كيف تستعمل الدواء").
إذا توقفت عن استعمال الدواء)

نزيف دموي متبول - قد يستمر النزيف لمدة أطول من المعتاد إذا أصبت أو جرحت

### أعراض جانبية إضافية يمكن أن تحدث:

**أعراض جانبية شائعة** جدًا (أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشر):

دوار، صداع، غثاس، أرق
غثيان، جفاف في الفم، إمساك
تعرق (بما في ذلك التعرق الليلي)

**أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 100):
انخفاض في الشهية
ارتباك، شعور بالانفصال عن نفسك، انعدام الإشباع الجنسي، انخفاض في الشهوة الجنسية، تملد، عصبية، أحلام شاذة
في الشبوة، إحسان بعدم الهدوء أو عدم القدرة على الجوس أو الوقوف دون ارتعاج، إحسان بالبدائيس والإبر، تغيرات في حاشنة الذوق، ارتفاع في التوتر العضلي
اضطرابات في الرؤية تشمل على تشنوش الرئوية، تورع الحقيقتين، عدم فترة العين على نقل التركيز من الأشياء البعيدة إلى القريبة
ظنين في الأذنين
نظم قلبي سريع، شعور بخفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، تورذ الوجه

الخلول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسميماً هذا الدواء، واتي بأخر أداء، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (**تاريخ انتهاء الصلاحية** المذكور على العبوة). يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

**ظروف التخزين:**

**فِيبياكس XR 75**: يجب التخزين في مكان جاف، في درجة حرارة دون 25°C.

**فِيبياكس XR 150، فَيبياكس XR 225**: يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.

• لا يجوزلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في لملة النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل تساهم في حماية البيئة.

### 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:**
**فِيبياكس XR 75**

Microcrystalline cellulose, hypromellose, ethylcellulose, magnesium stearate, dibutyl sebacate, silica colloidal anhydrous, macrogol 400.

**فِيبياكس XR 150، فَيبياكس XR 225**

Calcium hydrogen phosphate dihydrate, hypromellose K-100, polyacrylate dispersion 30%, polyvinyl acetate dispersion 30%, talc, magnesium stearate, macrogol-poly(vinyl alcohol) grafted copolymer, silica colloidal anhydrous, triethyl citrate, carnauba wax, purified water

### كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

**فِيبياكس XR 75**: حبيسولات بيضاء.

**فِيبياكس XR 150، فَيبياكس XR 225**: أقراص مستديرة لونها أبيض-كريمي، ذات مظهر منقط.

أحجام العبوة المصاحبة عليها ل**فِيبياكس XR 75**: 7، 10، 28، 30 حبيسولة

أحجام العبوة المصاحبة عليها ل**فِيبياكس XR 150، فَيبياكس XR 225**: 2، 10، 28، 30 قرصاً.

قد لا يتسوق جميع أحجام العبوات.

تم تحرير النشرة في آب/أغسطس 2024 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

**فِيبياكس XR 75**: 00-30839-130-53

**فِيبياكس XR 150**: 00-35038-161-41

**فِيبياكس XR 225**: 00-35039-161-42

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءه، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكسر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء إما مخصص لكلا الجنسين.

**المصنِّع وصاحب التسجيل: دكسل م.ص.**

شارع كسمل 1، اور عفاكيا 3060000، إسرائيل