

Препарат отпускается без рецепта врача

Агистен™ Бейби

Паста

Клотримазол (Clotrimazole) 1% W/W

Неактивные и аллергенные вещества в препарате - см. пункт 2 "Важная информация о некоторых компонентах препарата" и пункт 6 "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Применяйте данный препарат в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе дозировки данной инструкции. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки болезни (симптомы) ухудшатся или не улучшатся через 7 дней.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Для лечения грибковой пеленочной сыпи у детей, длящейся более 72 часов.

Терапевтическая группа: Противогрибковое средство из группы имидазолов.

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

Не применяйте препарат:

- Если у Вас или у Вашего ребенка повышенная чувствительность (аллергия) к активному веществу или к любому другому ингредиенту, содержащихся в препарате.
- Для лечения инфекции кожи головы или ногтей.

Особые предостережения относительно применения препарата:

Перед первым применением препарата желательно посоветоваться с врачом, чтобы избежать ненужного использования. Препарат применяется только в случаях, когда раздражение не проходит через 72 часа.

Не применяйте данный препарат часто или продолжительный период времени без консультации врача.

Не применяйте на открытых ранах.

Избегайте контакта препарата с глазами и ртом. В случае контакта с глазами или ртом следует тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

Перед применением Агистен Бейби сообщите врачу, если:

- Вы не уверены, что пациент страдает грибковой инфекцией.
- У пациента повышенная чувствительность к каким-либо продуктам питания или каким-либо лекарственным препаратам.

Если Вы или Ваш ребенок принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Важная информация о некоторых компонентах препарата Агистен Бейби содержит шерстяной жир (wool fat) и Butylated hydroxytoluene, которые могут вызвать локализованные кожные эффекты (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек. Кроме того, препарат содержит пропилпарабен, который может вызывать аллергические реакции (возможны реакции замедленного типа).

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Уточните у врача или фармацевта, если Вы не уверены относительно дозировки и режима лечения препаратом.

Если препарат был выписан для Вас врачом, следуйте его указаниям.

Если Вы приобрели препарат без рецепта, тщательно придерживайтесь следующих рекомендаций:

Принятая дозировка и способ применения, при отсутствии других врачебных инструкций: смазывание пораженного участка два раза в день в течение 7-10 дней.

Способ применения:

Нанесите равномерно тонкий слой пасты на чистую, сухую и проветриваемую кожу и вотрите его в кожу легкими массирующими движениями. Количество пасты в ½ сантиметра будет достаточно, чтобы обработать участок примерно размером с ладонь. Рекомендуется часто менять подгузники. Желательно оставлять младенца без подгузника, насколько это возможно.

Симптомы кожной инфекции, такие, как зуд или болезненность, должны улучшиться через несколько дней лечения. В то же время такие признаки, как покраснение и шелушение кожи могут исчезнуть через более продолжительное время. Если симптомы продолжают продолжаться, посоветуйтесь с врачом.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Только для наружного применения.

Не кладите лекарство в рот и не глотайте его.

Если по ошибке ребенок или кто-либо другой проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Если Вы забыли применить препарат в положенное время, примените его как можно скорее и продолжите лечение, как обычно.

Как Вы можете способствовать успешному лечению?

- Несмотря на то, что пораженный участок чешется, не следует его расчесывать. Расчесывание нанесет вред поверхности кожи и таким образом приведет к распространению инфекции.
- Содержите пораженный участок в чистоте.
- Тщательно высушите пораженный участок, но избегайте чрезмерного трения.
- Обязательно мойте руки после лечения инфекции, чтобы предотвратить ее распространение.
- Не используйте общие с младенцем полотенце, коврик в ванной и тому подобное, так как это может привести к распространению инфекции.

Не принимайте препараты в темноте! Проверьте этикетку и дозу каждый раз перед применением препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым другим лекарством, применение Агистен Бейби может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Как и любое другое лекарство, препарат может вызывать аллергию у некоторых людей. Если у Вас или у Вашего ребенка есть аллергия, реакция разовьется вскоре после начала приема препарата. Если у Вас или у Вашего ребенка возникнет аллергическая реакция, **прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение ближайшей больницы.** Признаки аллергической реакции могут включать:

Сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, лица, горла или языка, слабость, тошноту, головокружение или обмороч.

После применения препарата Вы можете почувствовать: зуд, сыпь, волдыри, ощущение жжения, дискомфорт, отек, раздражение, парестезию, покраснение или шелушение кожи.

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

Отчет о побочных явлениях:

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или, зайдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

Кроме того, Вы можете сообщить в компанию по следующему адресу: www.Padagis.co.il.

5. КАК ХРАНИТЬ ЛЕКАРСТВО?

Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача. Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

• После первого открывания можно пользоваться в течение 6 месяцев.

• Храните при температуре ниже 25°C.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит: Wool fat, kaolin, paraffin white soft, isopropyl myristate, zinc oxide, heavy liquid paraffin, titanium dioxide, dimethicone, squalene, propyl parahydroxybenzoate, butyl hydroxy toluene (BHT).

• Как выглядит лекарство и каково содержание упаковки: Алюминиевый тубчик, содержащий 30 граммов почти белой пасты.

• Производитель и владелец лицензии: Падагис Израиль Фармацевтика ЛТД, ул. Ракефет 1, Шохам.

• Откорректировано в июле 2024 г. в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения.

• Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 125-94-26744