

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**  
התרופה משוקלת על פי מרשם רופא בלבד

## אסיול חדש 2 מ"ג

**טבליות**

כל טבליה מכילה:  
דיאזפם 2 מ"ג

## אסיול חדש 5 מ"ג

**טבליות**

כל טבליה מכילה:  
דיאזפם 5 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**הדגמה**

תרופה זו שייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים, שלה תכונות מיוחדות המחייבות זהירות רבה בעת השימוש בתרופות השייכות לקבוצה זו.
יש חשיבות רבה במעקב רפואי צמוד כאשר נוטלים תרופה זו.

- כאשר אתה נוטל תרופה זו, הקפד לפנות לרופא לאחר 2-4 שבועות, כיוון שהטיפול נועד לתקופות זמן קצרות בלבד.
- שימוש ממושך בתרופה זו עלול לגרום לכך שהשפעת התרופה תפחת.
- שימוש ממושך בתרופה זו לגרום לתופעה קשה של תלות, שתקשה על החולה להפסיק ליטול את התרופה.
- הפסקת טיפול בלתי מבוקרת מלווה בתופעות גמילה כגון: מתח, עצבנות, בלבול, רעד, נדודי שינה, כאבי בטן, בחילות, הקאות, זיעה, עויתות.
- לעיתים, שימוש ממושך בתרופה זו עלול לגרום לשינויים בדפוסי ההתנהגות ולמחשבות סטרנדיות.
- במייוחד אצל קשישים מומלץ להישמר בעת הליכה, כיוון שהתרופה פוגמת בערבות ולעיתים בתיאום תנועת הגוף, ועל-כן יש חשש למעידות ולפילות.

**נטיל תרופה זו עם תרופות ממשפחת האופיואידים, עם תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית (כולל סמים) או עם אלכוהול עלולה לגרום לתחושת שינויות עמוקה, לקשיי נשימה (דיכוי נשימתי), לתרדמת ולמוות.**

### 1. למה מיועדת התרופה?

אסיול חדש מיועד לטיפול במצבי מתח, חרדה, חוסר מנוחה/עצבנות הנגרמים כתוצאה מגמילה מאלכוהול, וכטיפול נוסף להקלה על התנוצוץ של שרירי שלד ופרכוסים.
השימוש בתרופה צריך להיות למשך זמן קצר ככל האפשר, ולא יותר מארבעה שבועות.
אם משתמשים לתקופה ארוכה ללא הפסקה, יש סיכון לפתח תלות או לפתח בעיות בעת הפסקת הטיפול.
בזמן לקיחת התרופה יש סיכון לתלות (צורך ליטול את התרופה). הסיכון עולה ביחד עם המינון ומשך הטיפול. הסיכון גבוה יותר אם יש לך היסטוריה של שימוש לרעה באלכוהול או בסמים.
**קבוצה תרופוית:** בנזודיאזפינים.
**תרופה זו שייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים, הפועלים על ידי שינוי בפעילות המוחית הקשורה לרגש.**

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה **רגיש (אלרגי)** לחומר הפעיל או לתרופה אחרת מקבוצת הבנזודיאזפינים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").
- יש לך **בעיות חמורות בכבד** או שנמשכות תקופה ארוכה.
- יש לך **בעיות נשימה חמורות**.
- אתה סובל **מדום נשימה בשינה (sleep apnoea)** (קושי בנשימה בזמן השינה).
- אתה סובל **ממיאסטיה גראביס (myasthenia gravis)** (מצב הגורם לשרירים להיחלש ולהתעייף ביתר קלות).
- אתה סובל **ממחלת נפש**, כגון פוביה או מחשבה כפייתית (אובססיה).
- אתה סובל מדיכאון (עם או ללא חרדה) או מהיפראקטיביות (אין להשתמש באסיול כטיפול יחיד בדיכאון או בחרדה המלווה בדיכאון).
- יש לך **פורפיריה** (מצב תורשתי הגורם לשלפוחיות בעור, לאכאי בטן ולליקויים במוח או במערכת העצבים).
- אתה סובל **מהיפרקנייה** (מצב של פעילות יתר, אי שקט).
- את **בהיריון** או **מתכננת היריון** (ראי בהמשך סעיף "היריון והנקה").
- ילדים מתחת לגיל 6 חודשים.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול באסיול, ספר לרופא אם:**

- יש לך משהו קרוב שנפטר לאחרונה
- יש לך בעיות בריאות
- יש לך בעיות בכבד
- יש לך הפרעת אישיות
- יש לך היסטוריה של אלכוהוליזם או שימוש לרעה בסמים
- יש לך **בעיות לב ובעיות ריאות** או **אי ספיקת כליות חמורה**
- יש לך **רמות נמוכות בדם** של חלבון הנקרא אלבומין
- יש לך אספקת דם לקויה למוח (**המחלות עורקים**)
- אתה **קושי** (קיים סיכון לבלבול או להפרעות בתיאום תנועת העגלולים לגרום לפציעות או לנפילות)
- אתה **מעשן**

**מידע חשוב נוסף שיש לדעת כאשר נוטלים אסיול**

- תלות** – כאשר נוטלים את התרופה ישנו סיכון לתלות (צורך להמשיך לצרוך את התרופה). אשר עולה עם המינון ומשך הטיפול. הסיכון גדל במטופלים בעלי היסטוריה של שימוש לרעה באלכוהול או בסמים או במטופלים שסובלים מהפרעת אישיות.
- גמילה** – צריך להפסיק את הטיפול בתרופה באופן הדרגתי. **תסמיני גמילה** מופיעים עם אסיול אפילו כאשר ניתנים מינונים תקינים ופרקי זמן קצרים. ראה פרק 3 סעיף "הפסקת השימוש באסיול ותופעות גמילה".
- סבילות** – אם אתה שם לב לאחר מספר שבועות שהתרופה לא מסייעה באותה המידה כמו בתחילת הטיפול, עלך היוועץ ברופא.

- השעות התנהגותיות** – עלולות להתרחש בעת נטילת אסיול (ראה פרק 4 – "תופעות לוואי").
- להפחתת הסיכון לאמנזיה (**אובדן זיכרון**), יש לוודא שינה רציפה של 7 שעות לפחות.

ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל אסיול אם אתה צריך לעבור טיפול או ניתוח הדורשים שימוש בחומרי הרדמה.

### תגובות בין-תרופתיות

שימוש בו זמני באסיול ובאופיואידים (משככי כאבים חזקים, תרופות המסייעות בגמילה מסמים ותרופות מוסימות לשיעול) מעלה את הסיכון לשינויות, כגון נשימה (דיכוי נשימתי), לתרדמת ועולל להיות מסכן חיים. לכן יש לשקול שימוש בו זמני בתרופות אלה רק כאשר אין אפשרויות טיפול אחרות. למרות זאת, אם הרופא נתון לך מרשם לאסיול ביחד עם אופיואידים, המינון ומשך הטיפול חייבים להיות מוגבלים על ידי הרופא. ספר לרופא על כל התרופות ממשפחת האופיואידים שאתה לוקח, ועקוב בקפידה אחר המינון שהרופא ממליץ. זה יכול להיות מועיל להודיע לחברים או לקרובי משפחה, שהיו מודעים לסימנים ולתסמינים שצוינו לעיל. פנה לרופא כאשר אתה חווה תסמינים כגון אלה.

**הימנע משימוש באסיול בשילוב עם:**

- סידום אוקסיט** (משמש למניעת מקרים של התקפי קטפלקסיה (התקפים של חולשת שרירים המופיעים בפתאומיות ונמשכים לזמן קצר) במטופלים עם נרקולפסיה (הפרעת שינה שעלולה לגרום לשינויות קיצוניות, להתקפי הירדמות פתאומיים בלתי ניתנים לשליטה במשך היום ולקטפלקסיה)).

- זידורבוק** (תרופה המסייעת בטיפול בגיף ה-HIV/אייДС), **אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- שילוב של התרופות הבאות עם אסיול עלול לגרום לישנוניות:**

- תרופות נגד דיכאון** כגון אמיתרופיטילין, פלובוקסמין, פלואוקסטיין, **תרופות אנטי פסיכוטיות** כגון כלורפרומאזין, האלפרסידיום (לטיפול בבעיות נפשיות כגון זנופטיין), **אנטי-היסטימינים** עם השפעה מרדמה (לטיפול באלרגיות) כגון כלורפינראמין, פרומתדין, **תרופות הרדמה כללית, תרופות היפנוטייות** כגון טמזפאם, זופיקלון (מסייעות להירדם), **חוסמי אלפא** או **מוקסונידין** (להורדת לחץ דם גבוה), **תרופות להרגעת שרירים** (כגון באקלופרין, טיזנידין), **תרופות לחרדה/להרגיעה** כגון לוראפאם, בוספרידון, **משככי כאבים חזקים** מסוימים (כגון קודאין או תרופות המכילות דקסטרופרופקסין הדמונולוריד ופראצטאמול) יכולים להעצים הרגשה כללית טובה כאשר נלקחים בשילוב עם אסיול, מה שיכול להגביר את הרצון להמשיך להשתמש בתרופות אלה (תלות) או לגרום לך להיות מאוד ישנוני.
- שילוב של תרופות הבאות עם אסיול עלול לגרום לישנוניות ולגרום לאסיול להפנות מהגוף לאט יותר מהרגיל: לופקסידין** (עוזר להקל על תסמיני גמילה במטופלים המפסיקים לקחת אופיואידים או הרואין), **בלבולין** (לטיפול בבחילה וקצתא, **דיסולפיראם** (הרואין), בהתמכרות לאלכוהול), באקלופן וטיזנידין (להקלה בהתכווצות השרירים).

- תרופות לאפילפסיה** כגון פנobarביטאל, פניטואין, קרבמזפין או סידום ואלפרואט (אסיול עלול להשפיע על רמות של התרופות אלה בדם).

- שילוב של התרופות הבאות עם אסיול עלול לגרום לאסיול להפנות מהגוף לאט יותר מהרגיל: אימפריזול או אסומפרזול** (תרופות לטיפול בכיב קיבה), **אמצעי מניעה המכילים אסטרוגן, אריתרומיצין (אנטיביוטיקה), תרופות אנטי פטרייטיות** (כגון פלוקונאזול, איטרקונאזול, שקלובאזול או ורוקונאזול), **איזוניאיד** (לטיפול בשחפת), **שילוב של התרופות הבאות עם אסיול עלול לגרום לאסיול להפנות מהגוף מהר יותר מהרגיל: ריפאמפינן**. לטיפול בזיהומים מאנטיביוטיקה, **תאופילין** (טיפול באסתמה), **אמפרברין** או **ריטוברי** (אנטי ויראליים), אלה יכולות לגרום לך להרגיש ישנוני למשך זמן ארוך יותר או לגרום לקשיי נשימה.

- תרופות **להורדת לחץ דם גבוה**, (כגון הידרלאזין, מינוקסידיל, נתרן ניטרופרוסיד), **משתנה**, **ניטרוגליצרין** (לבעיות לב), **מעכבי האנזים המהפך אנגיוטנסין** (משמשים לטיפול בלחץ דם גבוה, כגון פרינידופריל, קטספריל), **חוסמי אלפא** (משמשים לטיפול בלחץ דם גבוה, כגון אלפוזסין, פראזוסין), **חוסמי הקולטן אנגיוטנסין II** (משמשים לטיפול בלחץ דם גבוה, כגון ואלסארטאן), **חוסמי תעלות סידן** (משמשים לטיפול בלחץ דם גבוה, כגון אמלודיפיין), **חוסמי יורנים אדרנרגים** (משמשים לטיפול בלחץ דם גבוה, כגון ררפין), **חוסמי בטא** (משמשים לטיפול בלחץ דם גבוה, כגון ביסופרולול), מפני שתרופות אלה יכולות להוריד לחץ דם יתר על המידה.
- לבדופה** (משמש לטיפול בפרקינסון). אסיול עלול להקטין את השפעה של לבדופה.
- סותר** (מורידים חומציות בקיבה) עלולים להאיט את ספיגת אסיול לתוך הגוף.
- ציסאפריד** (משמש לטיפול בריפלוקס הקיבה).

**ילדים**

הרופא ירצה לבצע הערכה קפדנית של הטיפול בילדים ולשמור על משך טיפול קצר ככל שאפשר.

**שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול**

**אין לשתות אלכוהול בתקופת הטיפול באסיול.** אלכוהול עלול להגביר את ההשפעה המרדמה של אסיול ועלך לדבר על כך עם הרופא או עם הרוקח.

משקאות המכילים קפאין עלולים להפחית את השפעת התרופה.

### היריון והנקה

**אל תשתמשי** באסיול אם את בהיריון, מתכננת היריון, עלולה להיות בהיריון או מלקחת את החליט שאת צריכה להשתמש בתרופה זו.
קרא את סוף ההיריון (או שאתך לידיה), לתיקוף קושי נשימה או קשיים בהנזה. בנוסף, אם את מתלפת בתרופה זו בקביעות במהלך סוף ההיריון, התינוק עלול לתפח תסמיני גמילה.
אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עלולה להיות בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, היועצו ברופא לפני נטילת תרופה זו או כל תרופה אחרת.

### נהיגה ושימוש במכוונת

השימוש באסיול עלול לגרום לך להיות מבולבל, שכן, ישנוני, לא יציב או בעיל קואורדינציה לקויה, ביחד עם תופעות לוואי אחרות אשר יכולות להשפיע על פעילויות יומיומיות שלך (ראה פרק 4 "תופעות לוואי"). תופעות אלה עלולות להיות מוגברות אם לא ישנת מספיק. אין לנהוג או להפעיל מכוונת מסוכנות אם אתה מושפע מתרופה באופן זה.

תרופה זו עלולה להשפיע על יכולת הנהיגה מכיוון שהיא עלולה לגרום לך להרגיש ישנוני או מסוחרר. אין לנהוג בזמן השימוש בתרופה עד שתדע כיצד היא מסייעה עליך.

הרופא ירצה או איך ברוקח אם איך בטוח ביכולת שלך לנהוג בזרהיות בזמן השימוש בתרופה זו.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

טבליות אסיול חדש 2 מ"ג ו-5 מ"ג מכילות לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון הלאופן הטופל בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יוקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

**מבוגרים**

**הפרעות חרדה:** בהתאם לחומרת התסמינים, 10-2 מ"ג, 2 עד 4 פעמים ביום.

**כטיפול נוסף להקלה על התכווצות של שרירי השלד:**

2-10 מ"ג, 3 או 4 פעמים ביום.

**כטיפול נוסף לפרכוסים:** 2-10 מ"ג, 2 עד 4 פעמים ביום.

**הקלה על תסמינים של גמילה מאלכוהול:** 10 מ"ג, 3 או 4 פעמים במהלך 24 השעות הראשונות, ולאחר מכן 5 מ"ג, 3 או 4 פעמים ביום על הצורך.

**ילדים**

התרופה אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 6 חודשים (ראה פרק 2 – "לפני השימוש בתרופה").

יש ליטול את התרופה בהתאם להוראות הרופא. הרופא יקבע את המינון המתאים.

**קשישים או תושבים**

אם אתה קשיש או תשוש אתה עלול להיות יותר רגיש להשפעות של אסיול, כגון בלבול, והרופא ירשום לך מינונים נמוכים יותר. המינון או יעלה על מחצית המינון למבוגר.

**תפקוד לקוי או כבדי לקוי**

אם יש לך בעיות בכבד או בכליות ככל הנראה תקבל מינונים נמוכים יותר.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אופן השימוש**

יש לבלוע את התרופה עם מים.

ניתן לחצות את הטבליה של אסיול חדש 5 מ"ג בקו החצייה.

אין לחצות את הטבליה של אסיול חדש 2 מ"ג היות ואין קו חצייה.

אין מידע לגבי כתישה ולעיסה.

**אם נטלת טבעות מינון גבוה יותר**

אם אתה (או מישהו אחר) בולע הרבה טבליות בו זמנית או אם אתה חושב שבטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה יתך.

סימנים של מינון יתר כוללים סרבול ואיבוד קואורדינציה, ישנוניות או שינה עמוקה, בעיות בדיבור, דופק לב לא סדיר או איטי, קושי בשליטה על תנועות, תנועות עיניים בלתי נשלטות, חולשת שרירים או התכווצות שרירים, לחץ דם נמוך.

יתר קיצוני עלול לגרום לתרדמת (מצב של חוסר הכרה וחוסר תגובה), בעיות ברזלפקסיה וקשיי נשימה.

**אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת ליטול את המנה, קח אותה מייד כשזכרת, אלא אם זה כבר סמוך למועד הנטילה של המנה הבאה.

אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה ששכחתי.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**הפסקת השימוש באסיול ותופעות גמילה**

אין להפסיק את השימוש בתרופה זו באופן פתאומי; המשך ליטול אותה עד שהרופא ינחה אותך כיצד להפחית את המינון בהדרגה. אם אתה מנסה לקחת את התרופה בפתאומיות

אתה עלול לסבול מתופעות הלוואי הבאות:

- כאבי ראש, כאבי שרירים, מתח.
- חרדה חמורה, בלבול, חוסר מנוחה, דיכאון, עצבנות, הזעה, דופק מהיר ו/או לא סדיר, התכווצויות שרירים, רעד, אובדן יציבות, בחילות או הקאות, כאבי בטן, שלשול, אי שקט.
- במקרים חמורים** של תסמיני גמילה אתה עלול לחוות תחושה של דברים שלא קיימים, תחושת ניתוק מהמציאות, חוסר תחושה וקצוץ בידיים ובכפות הרגליים, צלילים ישמעו לך בעוצמה גבוהה מהרגיל ויכולים לעיתים להכאיב לך אם הצלילים אכן חזקים, רגישות לאור או למגע, הזיות ופרכוסים.

- אם נטלת מינון גבוה אתה עלול לחוות לעיתים בלבול או התנהגות יוצאת דופן. מטופלים בסיכון לפרכוסים עשויים להיות יותר רגישים לחוות פרכוסים בעת הגמילה.

הפסקת הטיפול צריכה להיעשות באופן הדרגתי, אחרת התסמינים שבגללם נטלת את התרופה עלולים לחזור בצורה חמורה יותר ממקודם (זהרה של נדודי שינה וחרדה). הסיכון שזה יקרה הוא גדול יותר בעת הפסקה פתאומית של התרופה.

אתה גם עלול לחוות שינויים במצב רוח, חרדה, חוסר מנוחה ושינויים בדפוסי שינה. אפילו אם הפסקת ליטול את התרופה באופן הדרגתי, אתה עשוי לחוות חרדה, דיכאון, חוסר מנוחה וקושי לישון.

בנוסף אתה עלול לחוות שלשול והזעה. אם אתה חווה תופעות אלה היוועץ ברופא.

**אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם אתה צוקק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות במוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

**כמו בכל תרופה, השימוש באסיול עלול לגרום לתופעות לוואי בלונק מהמשמשים. אל תיבהל למהר רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.**

**יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא או לחילופין לפנות למיון** אם אתה חווה אחת מהתופעות הבאות:

- תגובה אלרגית (התנפחות של השפתיים, של הפנים או של הצוואר המבוללים לקשיי נשימה חמורים; פריחה בעור או אלרגיה עורית (סרפדת))
- זוהי תופעת לוואי חמורה מאוד אך נדירה. אתה עלול להיות צוקק לרופא פרואי זרחה או לאשפוז.

**יש לספר מייד לרופא אם:**

- אתה סובל משינויי התנהגות כמו חוסר מנוחה, עצבנות, אי שקט, תנועות, הזיות, זעם, חוסים, איומה או תחושה של דברים שלא קיימים, הפרעות פסיכיאטריות והתנהגות לא הולמת, זאת משום שהרופא עשוי להפסיק לך את הטיפול.
- ספר לרופא** אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות או בכל תופעה אחרת אשר אינה מופיעה כאן:
- ישנוניות, הירדמות, עייפות, דיבור לא ברור, סחרחורת, חוסר יציבות או סרבול, אובדן קואורדינציה (אתה עשוי להבחין בכך אפילו לאחר מנה בודדת וזה עשוי להימשך ביום למחרת)

- בלבול (במיחד קשישים), אובדן זיכרון (אשר עשוי להתרחש מספר שעות לאחר נטילת אסיול, אם אפשרי, על מנת להוריד את הסיכון, יש לישון שינה רציפה של בין שבע לשמונה שעות לאחר נטילת התרופה), קושי להתרכז, התרגשות, רגשות קשים, ערנות ירודה, דיכאון מלווה בנטיית אובדניות, כאב ראש, תחושת סחרור, קושי לישון, חרדה

- הפרעות בדם (אתה עלול לפתח פצעים בגרון, דימומים מהאף או זיהומים), שינויים בדחף מיני (ליבידו), לחץ דם נמוך

- התכווצות/רעד או חולשה של השריר, קושי בשליטה על תנועות, קשיי נשימה

- בריחת שתן או בעיות במתן שתן
- אתה מרגיש כי אתה עושה שימוש לרעה בתרופה או מפתח תלות בתרופה

- הפרעות ראייה, בעיית מוטושטטת של ראייה כפולה
- בחילות, הקאות, גיית בקיבה, יובש בפה, שלשול, עצירות, הפרשת רוק מוגברת או מועטה

- תגובות עוריות
- צהבת (מאופיינת בהצהבה של העור או של לובן העיניים)

עלולה להתרחש לעיתים מידרות ורמה גבוהה של אנזימי כבד בדם עלולה להתרחש לעיתים מידרות מאוד.

**ידוע על התרחשויות של תסמיני גמילה** (ראה פרק 3 סעיף "הפסקת השימוש באסיול ותופעות גמילה").

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי במחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.**

דייווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מגע הרעלה! תרופה זו לכל תרופה אחרת יש למשמר במקום סגור מחוץ לתיגשי ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי חבוי חודש.

**יש לאחסן את התרופה מתחת ל-25°C.**

אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתיות. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשלמות עוד. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Lactose monohydrate, Maize starch, Cellulose, Copovidone, Talc, Colloidal anhydrous silica,