

**نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986**  
يُسَوَّق الدواء بموجب وصفة طبية فقط

**لونسورف 15 ملغ/6.14 ملغ**  
**لونسورف 20 ملغ/8.19 ملغ**  
**أقراص مطليّة**

المواد الفعالة وكميتها:

لونسورف 15 ملغ/6.14 ملغ:

يحتوي كل قرص مطليّ على:

تريفلوريدين 15 ملغ

تتيبيراتسيل (على شكل هيدروكلوريد) 6.14 ملغ

trifluridine 15 mg  
tipiracil (as hydrochloride) 6.14 mg

لونسورف 20 ملغ/8.19 ملغ:

يحتوي كل قرص مطليّ على:

تريفلوريدين 20 ملغ

تتيبيراتسيل (على شكل هيدروكلوريد) 8.19 ملغ

trifluridine 20mg  
tipiracil (as hydrochloride) 8.19 mg

المواد غير الفعالة ومُسيبات الحساسية في المستحضر: انظر البند 6 "معلومات إضافية". انظر أيضا "معلومات مهمّة عن قسم من مركّبات الدواء" في البند 2.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو الصيدليّ. وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

**1. لم أعد هذا الدواء؟**

لونسورف معد لعلاج لدى البالغين الذين يعانون من:

- السرطان النقيلي في المعى الغليظ أو المستقيم (colorectal cancer (CRC)):
  - علاج أحادي الدواء (monotherapy) للمرضى الذين تلقوا سابقا العلاجات المتوفرة، بما يشمل العلاج الكيميائي الذي يستند إلى فلوروبيريميديينات (fluoropyrimidines)، أو كساليپلاتين (oxaliplatin) أو إرينوتيكان (irinotecan)، مثبّطات VEGF (vascular endothelial growth factor) ومثبّطات EGFR (epidermal growth factor receptor)، أو الذين لا يمكن علاجهم بهذه العلاجات.
  - علاج مدمج مع بيفاسيزوماب (bevacizumab) للمرضى الذين تم علاجهم في السابق بالعلاج الكيميائي الذي يستند إلى فلوروبيريميديينات (fluoropyrimidines)، أو كساليپلاتين (oxaliplatin) أو إرينوتيكان (irinotecan)، بمثبّطات VEGF (vascular endothelial growth factor)، وإذا كان نوع الورم هو RAS wild-type، بمثبّطات EGFR.
- سرطان المعدة النقيلي، بما في ذلك سرطان في المنطقة التي تربط بين المريء والمعدة، وكعلاج أحادي الدواء (monotherapy) للمرضى الذين عولجوا في الماضي على الأقل بنظامي علاج جهازي لمرض متقدم.

الفصيلة العلاجية: مضادات السرطان، مضادات-المستقلبات

يحتوي لونسورف على مادتين فعاليتين مختلفتين: تريفلوريدين (trifluridine) وتتيبيراتسيل (tipiracil):

- يوقف تريفلوريدين نمو الخلايا السرطانية.
- يوقف تتيبيراتسيل تحلّل تريفلوريدين في الجسم، وهكذا يُساعد تريفلوريدين على العمل لمدة أطول.

## 2. قبل استعمال الدواء

### يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسا (لديك حساسية) للمادتين الفعالتين (trifluridine أو tipiracil) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

لا يجوز تناول لونسورف إذا كان ما جاء أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكدا، توجه إلى الطبيب قبل تناول لونسورف.

### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

#### قبل العلاج بلونسورف أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في الكلى
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد

إذا لم تكن متأكدا، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بلونسورف.

قد يؤدي العلاج إلى الأعراض الجانبية التالية (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية"):

- عدد منخفض من أنواع معينة من خلايا الدم البيضاء (neutropenia) الضرورية لحماية الجسم من عدوى جرثومية أو فطرية. نتيجة قلة العدلات، قد تظهر حُمى (قلة العدلات المصحوب بالحمى) وتلوث الدم (صدمة إنتانية).
- عدد منخفض من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).
- عدد منخفض من الصفائح الدموية (thrombocytopenia) الضرورية لإيقاف النزيف والتي تعمل عن طريق تراكمها وتخثر الدم أثناء الإصابات في الأوعية الدموية.
- مشاكل في الجهاز الهضمي.

### الأطفال والمراهقون

لونسورف ليس معدا لاستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاما.

### الفحوصات والمتابعة

سيجري لك الطبيب المعالج فحوصات دم قبل كل دورة علاج بلونسورف. تبدأ دورة العلاج الجديدة كل 4 أسابيع. الفحوصات ضرورية لأن لونسورف قد يؤثر أحيانا في خلايا دمك.

### التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرا، أو قد تتناول أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية، نباتات عشبية أو مكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وذلك لأن لونسورف قد يؤثر في طريقة عمل بعض الأدوية الأخرى. كذلك، قد يؤثر بعض الأدوية في طريقة عمل لونسورف.

أخبر الطبيب أو الصيدلي، لا سيما، إذا كنت تتناول أدوية تُستعمل لعلاج HIV، مثل زيدوفودين (zidovudine). وذلك لأن زيدوفودين قد لا يعمل جيدا إذا تناولت لونسورف. استشر الطبيب المعالج بالنسبة لتغيير لدواء آخر لعلاج HIV. إذا كانت الحالات الموصوفة أعلاه تنطبق عليك (أو إذا لم تكن متأكدا)، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بلونسورف.

### استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول الدواء خلال ساعة واحدة بعد وجبة الفطور والعشاء.

### الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملا أو مرضعة، تظنين أنك حامل، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بالدواء. قد يلحق لونسورف ضررا بالجنين.

## الحمل

إذا أصبحت حاملاً، عليك أنت وطبيبك أن تتخذا قراراً فيما إذا كانت أفضليات لونسورف أكبر من الخطر الذي سيلحق بالجنين.

## الإرضاع

لا ترضعي إذا كنت تتناولين لونسورف، لأنه ليس معروفاً فيما إذا كان لونسورف ينتقل عبر حليب الأم.

## منع الحمل

لا يجوز لك أن تصبحي حاملاً أثناء تناول هذا الدواء. وذلك لأن الدواء قد يلحق ضرراً بالجنين. عليك أنت وشريكك أن تستعملا طرقاً ناجعة لمنع الحمل أثناء تناول هذا الدواء. عليك القيام بذلك طيلة 6 أشهر إضافية بعد أن تتوقفي عن تناول الدواء. إذا كنت امرأة وحملت خلال هذه الفترة، أو إذا كنت رجلاً وحملت شريكك، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي.

## الخصوبة

قد يؤثر لونسورف على قدرتك على الإنجاب. يجب التحدث مع الطبيب قبل تناول الدواء.

## السياقة وتشغيل الماكينات

يؤثر لونسورف قليلاً في القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات. قد تحدث أعراض جانبية تتضمن التعب، الدوخة والغثيان أثناء العلاج، وقد تؤثر في قدرتك على السياقة وتشغيل الماكينات. يُمنع السياقة أو استعمال أية أدوات أو ماكينات إذا كانت لديك أعراض تؤثر في قدرتك على التركيز أو على رد فعلك.

## معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي لونسورف على اللاكتوز. إذا أخبرك الطبيب المعالج أنك تعاني من عدم القدرة على تحمل سكريات معينة، توجه إليه قبل تناول هذا الدواء.

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب فقط. تعتمد الجرعة على وزنك وطولك وما إذا كانت لديك مشاكل في الكلية.

يأتي لونسورف بعبارين. قد يأمرك الطبيب المعالج باستعمال كلا العبارين لأجل الجرعة الموصوفة لك.

سيخبرك الطبيب كم قرصاً عليك أن تتناول في كل مرة. عليك تناول الجرعة مرتين في اليوم.

خلال الأسبوعين الأوليين عليك تناول لونسورف لمدة 10 أيام. بعد ذلك، عليك التوقف عن تناول الدواء لمدة أسبوعين. تدعى هذه الفترة الزمنية التي مدتها 4 أسابيع "دورة". برنامج العلاج المحدد هو:

### • الأسبوع 1

- تناول الجرعة مرتين في اليوم، لمدة 5 أيام
- بعد ذلك، توقّف عن تناول الدواء لمدة يومين - من دون دواء

### • الأسبوع 2

- تناول الجرعة مرتين في اليوم، لمدة 5 أيام
- بعد ذلك، توقّف عن تناول الدواء لمدة يومين - من دون دواء

### • الأسبوع 3

- من دون دواء

#### • الأسبوع 4

- من دون دواء

بعد ذلك، ابدأ من جديد دورة أخرى مدتها 4 أسابيع وفقا للبرنامج المذكور أعلاه.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

#### طريقة تناول الدواء:

- تناول الدواء عن طريق الفم.
- ابتلع الأقراص كاملة مع كأس من الماء.
- تناول الدواء خلال ساعة واحدة بعد وجبة الفطور والعشاء.
- اغسل يديك بعد ملامسة الدواء.

لا تتوفر معلومات بشأن سحق، شطر أو مضغ الأقراص.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى من لونسورف من الجرعة التي عليك تناولها إذا تناولت جرعة مفترطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء.

#### إذا نسيت تناول لونسورف

- إذا نسيت تناول جرعة، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
- يُمنع تناول جرعة مضاعفة تعويضا عن الجرعة المنسية.

عليك المواظبة على العلاج تبعاً لتوصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن هذا العلاج الدوائي من دون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال لونسورف أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

قد تحصل الأعراض الجانبية التالية أثناء استعمال لونسورف بمفرده أو بالدمج مع بيفاسيزوماب (bevacizumab):

#### أعراض جانبية خطيرة

أخبر الطبيب فوراً إذا اختبرت أي من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية (يظهر الكثير من الأعراض الجانبية في الفحوصات المخبرية - مثلاً، تلك التي تؤثر في خلايا الدم):

- قلة العدلات (شائعة جداً)، قلة العدلات المصحوبة بالحمى (شائعة) وصدمة إنتانية (نادرة). تشمل العلامات على قشعريرة، حمى، تعرق أو علامات أخرى للعدوى الجرثومية أو الفطرية (انظر البند 2).
- فقر الدم (شائع جداً). تشمل العلامات على شعور بضيق التنفس، إرهاق أو مظهر شاحب (انظر البند 2).
- تقيؤ (شائع جداً) وإسهال (شائع جداً) قد يؤديان إلى الجفاف إذا كانا خطيرين أو متواصلين.
- مشاكل خطيرة في جهاز الهضم: ألم في البطن (شائع)، استسقاء (نادر)، التهاب القولون (ليس شائعاً)، التهاب حاد في البنكرياس (نادر)، انسداد الأمعاء (ileus) (ليس شائعاً)، انسداد الأمعاء جزئياً (sub-ileus) (نادر). تشمل العلامات على ألم حاد في البطن قد يكون مصحوباً بتقيؤ، انسداد الأمعاء أو انسداد الأمعاء الجزئي، حمى أو انتفاخ البطن.

- قلة الصفائح (شائعة جدا). تشمل العلامات على كدمات أو نزيف لسبب مجهول (انظر البند 2).
- انصبام رئوي (ليس شائعاً): خثرات دموية في الرئتين. تشمل العلامات على ضيق في التنفس وألم في الصدر أو الساقين.
- تم الإبلاغ عن الإصابة بمرض الرئة الخلالي (interstitial lung disease) لدى المرضى الذين تلقوا الدواء. تشمل العلامات على صعوبة في التنفس، ضيق في التنفس، مع سعال أو حُمى. قد يؤدي بعض هذه الأعراض الجانبية الخطيرة إلى الوفاة.

#### أعراض جانبية إضافية

أخبر الطبيب فوراً إذا اختبرت أحد الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه. تظهر الكثير من الأعراض الجانبية في الفحوصات المخبرية - مثلاً، أعراض تؤثر في خلايا الدم. سيفحص الطبيب المعالج إذا ظهرت هذه الأعراض الجانبية في نتائج فحوصاتك.

#### أعراض جانبية شائعة جداً: قد تؤثر في أكثر من شخص واحد 1 من بين 10 أشخاص:

- انخفاض الشهية
- شعور شديد بالتعب
- شعور بالغثيان
- انخفاض خلايا الدم البيضاء التي تدعى "الخلايا البيض" (leukocytes) - قد يزيد احتمال خطر إصابتك بعدوى
- انتفاخ في الأغشية المخاطية في الفم

#### أعراض جانبية شائعة: قد تؤثر في حتى 1 من بين 10 أشخاص:

- حُمى
- تساقط الشعر
- انخفاض الوزن
- تغييرات في حاسة التذوق
- إمساك
- شعور عام بالمرض
- مستويات منخفضة من الألبومين في الدم
- ارتفاع البيليروبين في الدم - قد يؤدي إلى اصفرار الجلد أو العينين
- انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء التي تدعى "اللمفاويات" (lymphocytes) - قد يزيد من احتمال خطر الإصابة بعدوى
- تورم اليدين أو الساقين أو القدمين
- مشاكل أو ألم في الفم
- انتفاخ في الأغشية المخاطية - قد يظهر في الأنف، الحنجرة، العينين، المهبل، الرئتين أو المعى
- ارتفاع إنزيمات الكبد
- بروتين في البول
- طفح، حكة أو جفاف في الجلد
- شعور بضيق التنفس، حالات عدوى في الصدر، في المجاري التنفسية أو في الرئتين
- عدوى فيروسية
- ألم في المفاصل
- شعور بالدوار، ألم الرأس
- ضغط دم مرتفع
- تقرحات في الفم
- ألم عضلات

#### أعراض جانبية ليست شائعة: قد تؤثر في حتى 1 من بين 100 شخص:

- ضغط دم منخفض
- نتائج فحوصات دم تشير إلى مشاكل في التخثر تسبب لك النزف بسهولة أكبر
- نبضات قلب ملحوظة أكثر، ألم في الصدر

- ارتفاع أو انخفاض شاذ في وتيرة نظم القلب
- ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء
- ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء التي تدعى الخلايا الوحيدة (monocytes)
- ارتفاع مستوى نازعة هيدروجين اللاكتات (lactate dehydrogenase) في دمك
- مستويات منخفضة من الفوسفات، الصوديوم، البوتاسيوم أو الكالسيوم في دمك
- انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء التي تدعى الخلايا الوحيدة (monocytes) - قد يزيد من احتمال خطر الإصابة بعدوى
- مستوى سكر مرتفع في الدم (hyperglycaemia)، ارتفاع مستوى البولة (urea)، الكرياتينين والبوتاسيوم في الدم
- تشير نتيجة فحص الدم إلى التهاب (ارتفاع في البروتين C-Reactive)
- شعور بالدوار (دوخة دورانية - vertigo)
- سيلان أو نزيف من الأنف، مشاكل في الجيوب الأنفية
- ألم في الحنجرة، بحة في الصوت، مشاكل في الصوت
- احمرار، حكة في العين، عداوى في العين، عيون دامعة
- جفاف
- انتفاخ، غازات، صعوبات في الهضم
- التهاب في القسم السفلي من المسالك الهضمية
- انتفاخ أو نزيف في الأمعاء
- التهاب أو ارتفاع في حموضة المعدة أو المريء، ارتجاع معدي مريئي (reflux)
- ألم في اللسان، بذل جهد للتقيؤ
- تسوس الأسنان، مشاكل في الأسنان، حالات عدوى في اللثة
- تورّد
- ألم أو شعور بالانزعاج في الذراعين أو الساقين
- ألم، يشتمل على ألم بسبب السرطان
- ألم في العظام، ضعف أو تشنجات في العضلات
- شعور بالنزلة
- هربس نطاقي (ألم وطفح جلدي حويصلي على الجلد فوق المسالك العصبية المتأثرة بالتهاب العصب الذي يسببه فيروس الهربس النطاقي (Herpes Zoster Virus))
- اضطرابات في الكبد
- التهاب أو عدوى في أنبوب المرارة
- قصور عمل الكلى
- سعال، تلوث في الجيوب الأنفية، عدوى في الحلق
- تلوث في المثانة البولية
- دم في البول
- مشاكل في التبول (احتباس البول)، فقدان القدرة على التحكم بالمثانة (سلس البول)
- تغييرات في الدورة الشهرية
- قلق
- مشاكل عصبية غير خطيرة
- طفح جلدي بارز مصحوب بحكة، شرى، حب الشباب
- تعرّق مفرط، مشاكل في الأظافر
- مشاكل في النوم أو نعاس
- انعدام الإحساس أو شعور بدبابيس وإبر في كفتي اليدين أو القدمين
- احمرار، انتفاخ، ألم في كفتي اليدين والقدمين (hand-foot syndrome)

أعراض جانبية نادرة: قد تؤثر في حتى 1 من بين 1,000 شخص:

- التهاب أو عدوى في الأمعاء
- عدوى فطرية في القدم (Athlete's Foot)، داء المبيضات (candidiasis)

- انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء التي تدعى الخلايا المحببة (granulocytes) – قد يزيد خطورة الإصابة بعدوى
- انتفاخ أو ألم في الإصبعين الكبيرين في القدمين
- انتفاخ في المفاصل
- ارتفاع مستوى الملح في الدم
- شعور بالحرق، شعور زائد بلمس غير لطيف أو فقدان الإحساس
- إغماء (syncope)
- مشاكل في الرؤية مثل تشوش الرؤية، رؤية مضاعفة، انخفاض في الرؤية، كاتاركت
- جفاف في العينين
- ألم في الأذن
- التهاب في الجزء العلوي من المسالك الهضمية
- ألم في القسم العلوي أو القسم السفلي من المسالك الهضمية
- تراكم سوائل في الرئتين
- رائحة كريهة من الفم، مشاكل في اللثة، نزيف من اللثة
- سلائل داخل الفم
- التهاب أو نزيف في الأمعاء
- ازدياد قطر أنبوب المرارة
- جلد أحمر مرتفع، بثور، تقشر الجلد
- حساسية للضوء
- التهاب في المثانة البولية
- تغييرات في فحوص البول
- خثرات دموية، مثلاً في الدماغ أو في الرجلين
- تغييرات في تخطيط نشاط القلب (ECG - فحص كهربائية القلب)
- مستوى منخفض من البروتين العام في الدم

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على عبوة الكرتون أو اللوحة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين:  
يجب تخزين الدواء في درجة حرارة تحت 30°C.
- يُمنع إلقاء الأدوية في المغسلة أو في حاوية القمامة المنزلية. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها بعد. تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

## 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

### لونسورف 15 ملغ/6.14 ملغ:

محتوى القرص:

lactose monohydrate, starch pregelatinised (maize), stearic acid

انظر البند 2: "معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء"

طلاء:

hypromellose (substitution type 2910), macrogol (8000), titanium dioxide (E171), magnesium stearate

حبر الطباعة:

shellac, iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172), titanium dioxide (E171), indigo carmine aluminium lake (E132), carnauba wax, talc

### لونسورف 20 ملغ/8.19 ملغ:

محتوى القرص:

lactose monohydrate, starch pregelatinised (maize), stearic acid

انظر البند 2: "معلومات مهمة عن قسم من مكونات الدواء"

طلاء:

hypromellose (substitution type 2910), macrogol (8000), titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172), magnesium stearate

حبر الطباعة:

shellac, iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172), titanium dioxide (E171), indigo carmine aluminium lake (E132), carnauba wax, talc

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

### لونسورف 15 ملغ/6.14 ملغ:

أقراص مطلية، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، لونها أبيض ومطبوع عليها باللون الرمادي "15" في جهة واحدة، و "102" و "15 mg" في الجهة الأخرى.

### لونسورف 20 ملغ/8.19 ملغ:

أقراص مطلية، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، لونها أحمر فاتح، ومطبوع عليها باللون الرمادي "20" في جهة واحدة، و "102" و "20 mg" في الجهة الأخرى.

تحتوي العبوة على 20 قرصاً مطلياً (2 لويحات ذات 10 أقراص) أو 40 قرصاً مطلياً (4 لويحات ذات 10 أقراص) أو 60 قرصاً مطلياً (6 لويحات ذات 10 أقراص). يوجد في كل شريط ممتص للرطوبة.

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه:

مديسون فارما م.ض.، شارع هشبيلواح 10، ص.ب. 7090، بيتاح تكفا.

اسم المُنتج وعنوانه:

Les Laboratoires Servier Industrie (LSI), 905, route de saran, 45520 Gidy, France

تم تحرير هذه النشرة في تشرين الثاني 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

لونسورف 15 ملغ/6.14 ملغ: 163-89-35314

لونسورف 20 ملغ/8.19 ملغ: 163-90-35315

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها، ورد النصّ بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.