

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال في الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله ومعياره
درونتال بلوس بطعم، بيطري
أقراص

2. المواد الفعالة وكميتها في وحدة جرعة :
كل قرص يحتوي على:

المواد الفعالة:
فيبانتييل (Febantel) – 150 ملغ
بييرانتييل إيمونات (Pyrantel Embonate) – 144 ملغ
پرازيكوانتييل (Praziquantel) - 50 ملغ

المواد غير الفعالة:
مادة – مذاق بطعم البقر: (Artificial beef flavour irradiated) 116.5 ملغ
للقائمة الكاملة بالمواد غير الفعالة أنظر البند 13: "معلومات إضافية".

3. لماذا مخصص الدواء
أقراص بطعم لعلاج الديدان المسطحة والمدورة في الكلاب
يشمل أنواع الديدان:

Ascarids: Toxocara canis, Toxascaris leonina (adult and late immature forms)
Hookworms: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adults)
Whipworms: Trichuris vulpis (adults)
Tapeworms: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium species (adult and immature forms).

الفصيلة العلاجية: مضاد للديدان.
فيبانتييل – ضد الديدان المدورة
بييرانتييل إيمونات- ضد الديدان المدورة
پرازيكوانتييل- ضد الديدان المسطحة

4. موانع الاستعمال
يمنع اعطاء المستحضر سوية مع مستحضرات تحتوي على بيبرازين (Piperazine).

5. أعراض جانبية
في حالات نادرة جدا قد تظهر اضطرابات خفيفة وعابرة في جهاز الهضم مثل التقيؤ و/أو إسهال. في حالات معدودة يمكن لهذه الأعراض أن تتراffic بعوارض غير محددة مثل نعاس، قهيم أو فرط نشاط.

التبليغ في حال الشك بوجود أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة المنزل التابعة لوزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه للنموذج الإلكتروني للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو من خلال دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

كذلك، يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لشركة ليدور المنتس على عنوان البريد الإلكتروني lidorvet@lidorr.com

6. حيوانات الهدف

كلاب.

7. الجرعة وطريقة الإعطاء

حسب تعليمات الطبيب البيطري.
قرص واحد لكل 10 كغم وزن الجسم.
يقدم القرص مباشرة، أو يوضع في الطعام. لا حاجة للصوم قبل أو بعد العلاج.

الجراء والكلاب الصغيرة:

3 – 5 كغم وزن الجسم = ½ قرص
فوق 5 كغم – 10 كغم وزن الجسم = 1 قرص

الكلاب المتوسطة:

فوق 10 كغم – 15 كغم وزن الجسم = 1 ½ أقرص
فوق 15 كغم – 20 كغم وزن الجسم = 2 أقرص
فوق 20 كغم – 25 كغم وزن الجسم = 2 ½ أقرص
فوق 25 كغم – 30 كغم وزن الجسم = 3 أقرص

الكلاب الكبيرة:

فوق 30 كغم – 35 كغم وزن الجسم = 3 ½ أقرص
فوق 35 كغم – 40 كغم وزن الجسم = 4 أقرص

في العلاج بواسطة *Toxocara*، سوف تتم معالجة إناث الكلاب المرضعة بعد أسبوعين من الانجاب، ومن ثم كل أسبوعين حتى فطام الجراء. علاج الجراء يجب أن يبدأ بجيل أسبوعين، ومن ثم كل أسبوعين حتى جيل 12 أسبوعًا. بعد ذلك يجب العلاج كل 3 أشهر. ينصح بعلاج الجراء والم في ذات الوقت. في الكلاب البالغة يجب إعطاء العلاج كل 3 أشهر. في حالات الإصابة الوخيمة بالديدان المدورة، يجب إعطاء علاج متكرر بعد أسبوعين.

8. طريقة استعمال المستحضر

أنظر البند 7: "الجرعة وطريقة الإعطاء".

9. فترة الانتظار

لا صلة.

10. تحذيرات

- تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء في حيوانات الهدف

تعتبر البراغيث مستضيفا مرحليا لنوع شائع من الديدان المسطحة - *Dipylidium caninum*. انتقال عدوى الديدان المسطحة هو أمر حتمي إلا إذا تم اتخاذ تدابير للسيطرة على مستوى المستضيفات المرحلية مثل البراغيث، الفئران والخ.

- تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة استعمال الدواء في الحيوانات لا يجوز الاستعمال في الكلاب التي تزن أقل من 3 كغم. يجب التخلص من بقايا أقراص استعملت بشكل جزئي.

- تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يستعمل المستحضر في الحيوانات للحفاظ على النظافة، يجب على الشخص الذي يعطي الأقراص للكلب مباشرة أو من خلال إضافة الأقراص لطعام الكلب، أن يغسل يديه مباشرة بعد إعطاء الدواء.

• الحمل والارضاع في الحيوانات التي تخضع للعلاج

- لا يجوز تخطي الجرعة الموصى بها عندما تتم معالجة إناث الكلاب الحوامل. يجب استشارة بيطري قبل علاج إناث الكلاب الحوامل ضد ديدان مدورة. يمكن استعمال الدواء في فترة الإرضاع.

• تفاعلات مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات

- يمنع استعمال الدواء سوية مع أدوية تحتوي على مركبات بيبيرازين.

• جرعة زائدة

- يتم تحمل المستحضر جيدا في الكلاب. في دراسات السلامة أدى إعطاء جرعات اعلى بخمسة أضعاف من الموصى به أو أكثر إلى ظهور تقيؤ أحيانا.

• قلة ملائمة (incompatibilities)

لا صلة.

11. تعليمات التخزين

- امنع التسمم! هذا الدواء وأي دواء آخر يجب أن يحفظ في مكان مغلق بعيدا عن متناول الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من الشهر.
- شروط التخزين: بدرجة حرارة الغرفة، دون 25 درجة مئوية.

12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر في نهاية الاستعمال

- كل ما يتبقى من مستحضر بيطري أو أي نفايات ناجمة عن استعمال مستحضر بيطري يجب أن تتلف على أنها نفايات سامة، لا يجوز رميها في المجاري.

13. معلومات إضافية

- إضافة للمواد الفعالة، يحتوي الدواء كذلك على:

Maize starch, Artificial beef flavor irradiated, Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Sodium lauryl sulphate, Colloidal anhydrous silica.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

علب كرتون تحتوي 24 أو 104 قرصًا، مغلفة في نفايات (بليستر).

قد لا يتم تسويق كل أحجام العبوات.

الأقراص بلون بني فاتح إلى بني، مدورة، مسطحة مع خط شطر في جانب واحد.

- صاحب التسجيل وعنوانه:
فيتاماركيت م.ب.ص.، طريق هحوريش 23، المنطقة الصناعية، منطقة مودييين
- اسم المنتج وعنوانه:

Elanco Animal Health GmbH
GERMANY

- رقم تسجيل الدواء في سجل المستحضرات الحكومي في وزارة الصحة:

081 95 92122

حررت النشرة في 4.2024
