

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بدون وصفة طبييب

تارودنت غسول للفم

0.2% w/v

المادة الفعّالة

كلور هيكسيدين جلوكونات 0.2% w/v chlorhexidine gluconate

الموادّ غير الفعّالة ومسببات الحساسية في المستحضر: انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر حسب التعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

- لتأخير تكوّن اللويحة الجرثومية (plaque)
 - كوسيلة مساعدة في علاج التهاب اللثة ومنعه (gingivitis)
 - كوسيلة مساعدة في الحفاظ على نظافة الفم
 - للاستعمال بعد العمليات الجراحية أو علاجات الأسنان، لحث شفاء اللثة
 - للاستعمال عند وجود تقرحات، التهابات نتيجة لأسنان اصطناعية وعدوى فطرية في الفم
- المجموعة العلاجية: مطهر (مضاد للتلوث)

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

وجدت لديك حساسية للمادة الفعّالة كلور هيكسيدين جلوكونات أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (أنظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- يُمنع الاستعمال للأطفال تحت جيل 12 سنة، إلا فقط بتوصية طبييب.
- يجب الاستعمال في تجويف الفم فقط. يُمنع البلع. أشطف جيّدًا بالماء إذا لامس المستحضر العينين أو الأذنين.
- في حالة حدوث رد فعل تحسسي خطير، يجب عليك إيقاف الاستعمال والتوجه فورًا للحصول على مساعدة. أنظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- قد تؤثر معاجين الأسنان سلبيًا وتعطل عمل غسول الفم. بعد تنظيف الأسنان، اغسل فمك جيّدًا بواسطة الماء وانتظر 5 دقائق قبل استعمال تارودنت لغسل الفم. بدلا من ذلك، يمكنك استعمال غسول الفم في وقت آخر من اليوم.
- يُمنع تبييض أقمشة كانت قد لامست غسول الفم.
- من الممكن ظهور تبّع مؤقت على الأسنان واللسان. أنظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- من الممكن حدوث تغيير في حاسة الذوق، أو قد يكون هناك شعور بالحرقّة، الوخز أو الخدر في تجويف الفم. أنظر البند 4 "الأعراض الجانبية".

الأطفال والمراهقون

الدواء مُعدّ للاستعمال لدى متلقي العلاج فوق سن 12 عاما. ما دون هذا العمر، يجب مراجعة الطبيب قبل الاستعمال.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

يمكن استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو مع الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المتبعة عادة هي:

استعمل مرتين في اليوم. قم بملء كأس القياس حتى الخط 10 ملل. اغسل الفم جيدًا لمدة دقيقة ومن ثم أبصق.

التهاب اللثة: يوصى بالاستعمال لمدة شهر.

تقرحات الفم وفطريات الفم: استمر في الاستعمال لمدة يومين إضافيين بعد الشفاء.

التهابات الفم نتيجة استعمال طقم أسنان اصطناعية: نظف وانقع طقم الأسنان الاصطناعية في غسول الفم لمدة 15 دقيقة، مرتين في اليوم.

بعد عمليات جراحية في الأسنان: اغسل بحسب تعليمات طبيب الأسنان.

إذا استمرت الأعراض، توجه إلى الطبيب.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يُمنع البلع.

إذا تناولت جرعة مفترطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال تارودنت غسول للفم أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

يجب التوقف عن استعمال غسول الفم والتوجه فورًا للحصول على مساعدة طبية إذا ظهر لديك طفح جلدي، انتفاخ في الشفتين، في اللسان، في الحلق أو في الوجه أو إذا كانت لديك صعوبات في التنفس. هذه الأعراض ممكن أن تكون أعراضًا لرد فعل تحسسي شديد، الأمر الذي يُعتبر نادرًا جدًا.

يجب التوقف عن استعمال غسول الفم والتوجه إلى الطبيب إذا ظهر تهيج في الفم، ألم أو انتفاخ في القسم الداخلي من الخدين. من المفترض أن تختفي هذه الأعراض عند إيقاف العلاج.

أعراض جانبية إضافية:

- تبقي مؤقت للسان. يختفي العرض عند إيقاف العلاج.
- تبقي مؤقت للأسنان. يمكن عادة إزالتها بواسطة فرك الأسنان. بإمكانك تجنب التبقي بواسطة الامتناع عن شرب الشاي، القهوة أو النبيذ الأحمر – خاصة بعد الاستعمال بساعة، وبواسطة فرك الأسنان يوميًا بمعجون أسنان (أنظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟"). إذا بقي التبقي، يمكن إزالته بواسطة التنظيف والتلميع لدى طبيب الأسنان أو مساعدة طبيب الأسنان. بإمكانك تنظيف طقم الأسنان الاصطناعية بواسطة مادة تنظيف خاصة لطقم الأسنان الاصطناعية.

- من المحتمل أن تلاحظ تغيرًا في حاسة الذوق، شعورًا بالحرقة، بالتميل (الخر)، أو وخز في اللسان عند استعمالك غسول الفم لأول مرّة. تختفي هذه الأعراض عادة مع استمرار العلاج.
- إذا حدث تقشّر للجلد داخل الفم، خفف تركيز غسول الفم بكمية متساوية من الماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقبيل بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب الخزن في مكان بارد ومظلم.
- احفظ في العبوة الأصلية.
- عبوة 300 ملل: للاستعمال حتى 9 أشهر من يوم الفتح.
- عبوة 50 ملل: للاستعمال حتى شهر من يوم الفتح.

6. معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Purified water, sorbitol 70% solution, alcohol, polysorbate 80, peppermint oil

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

محلول شفاف، صاف حتى عكر بعض الشيء، برائحة النعناع. العبوة مرزومة بقنينة بلاستيكية ذات غطاء مقاوم للفتح من قِبل الأطفال وكأس قياس. تحتوي القنينة على 300 ملل أو 50 ملل المحلول. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

المُنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:

تارو للصناعة الدوائية م.ض.، شارع هيكتور 14، خليج حيفا 2624761.

تم تحريرها في أيلول 2024.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 060-32-27698-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.