

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משוקת ללא מרשם רופא

אלקוספט תמיסה

הרכב:

כלורהקסידין גלוקונאט 0.5% w/v
(Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v)
אלכוהול 70% v/v (Alcohol 70% v/v)
חומרים בלתי פעילים ואלרגיים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עלִיך השתמש בתרופה על פי הוראות בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עלִיך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מממרים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי העור.
קבוצה תרפויטית: חומרים אנטיספטיים.

2. לפני השימוש בתרופה

אל השתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים כלורהקסידין גלוקונאט ו/או אלכוהול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). במיוחד במטופלים עם היסטוריה של תגובות אלרגיות אפשריות הקשורות לכלורהקסידין.
- במגע עם העיניים, המוח, קרומי המוח, באוזן התיכונה או באוזן החיצונית כאשר עור התוף מוצר.
- בהזרקה.
- בפתיח הגוף (לדוגמה: אף, אוזניים).
- כאשר נעשה שימוש בדיאתרמיה (סוג של משכוו שיטוח) לאחר השימוש באלקוספט – יש לוודא שאין הצטברות של אלקוספט והעוור וכל אריג בסביבת המטופל יבשים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אלקוספט מכיל כלורהקסידין. כלורהקסידין ידוע כגורם לרגישות יתר, כולל תגובות אלרגיות כלליות והלם אנפילקטי. השכיחות של רגישות יתר לכלורהקסידין אינה ידועה. אין להשתמש

באלקוספט במטופלים עם היסטוריה אפשרית של תגובה אלרגית לתרכובת המכילה כלורהקסידין.

- אם התרופה ניתנת בטעות באינפוזיה - ייתכן שעירוי דם יהיה הכרחי כדי לנטרל את ההמליזה.
- השימוש בתמיסות כלורהקסידין עבור חיטוי העור לפני פרוצדורות פולשניות, הן על סיסט אלכוהול והן מימיות, מקשר עם כוונות כימיות אצל ילודים. הסיכון נראה גבוה יותר אצל תינוקות שנולדו לפני הזמן, במיוחד אלו שנולדו לפני שבוע 32 של ההיריון ובתוך השבועיים הראשונים לחיים.
- אין לקרב את המוצר למקורות חום או אש.
- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.
- אין לאפשר מגע עם העיניים בגלל חשש לפגיעה בראייה. אם נגרם מגע עם העיניים – שטוף באופן מידי ויסודי עם מים. במקרה של גירוי, אודם, כאב בעין או הפרעה לראייה פנה ליועץ רפואי באופן מידי. מקרים חמורים של פגיעה מתמשכת בקרנית (פגיעה בפני שטח העין), שללולה לדרוש השתלת קרנית, דווחו כאשר מוצרים דומים באו בטעות במגע עם העין במהלך פרוצדורות כירורגיות, בחולים בהרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא אם עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה:

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע עם העיניים ועם רקמות ריריות. במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות לרופא במידת הצורך.

אופן השימוש:

יש לנגב את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג באלקוספט כל פעם שנדרש. אם בלעת בטעות מהתרופה או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזית התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תותיות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באלקוספט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק מיד את השימוש בתרופה ולפנות לקבלת טיפול רפואי אם מופיעות התופעות הבאות:

- כלורהקסידין יכול לעתים נדירות מאוד לגרום לרגישות יתר כולל הלם אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השפתיים, לחץ דם נמוך)
- תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה: תגובות אלרגיות (לדוגמה דלקת העור, גרד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפדת, גירוי בעור, שלפוחיות).
- פגיעה בקרנית (פגיעה בפני שטח העין) ונזק קבוע לעיניים כולל ליקוי ראייה קבוע (בעקבות חשיפה מקרית של העיניים במהלך ניתוח ראש, פנים וצוואר) בחולים תחת הרדמה כללית (שינה עמוקה ללא כאבים).

תופעות לוואי ביילודים:

- ייתכנו כוונות כימיות ביילודים ובתינוקות (שכיחות לא ידועה).

אם מתרחשת אחת מהתגובות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מידי.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלִיך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מצע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- זיהרות! חומר דליק, שמור מפני אש.
- לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש בתרופה עד לתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:
Purified water, Tartrazine.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה בצבע צהוב.

התרופה מגיעה בגדלי אריזה של: 100 מ"ל, 300 מ"ל, 500 מ"ל או 1,000 מ"ל.

ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

יצרן ובעל הרישום:

בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.נ. משגב 2017400, ישראל.
עלון זה נערך ב-03/2025/03 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 129-67-30806-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.