

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

ألكوسبت محلول

التركيبية:

كلورهيكسيدين جلوكونات 0.5% w/v
كلورهيكسيدين جلوكونات 0.5% w/v (Chlorhexidine Gluconate)
كحول 70% v/v (Alcohol 70% v/v)

المواد غير الفعالة ومسيبات الحساسية في الدواء - انظر البند 6

"معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لتطهير الجلد.
الفصيلة العلاجية: مواد مطهرة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادتين الفعالين كلورهيكسيدين جلوكونات و/أو الكحول أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية") خاصة لدى متلقي العلاج الذين لديهم سيرة مرضية من ردود الفعل التحسسية المحتملة المرتبطة بكلورهيكسيدين.
- بتماس مع العينين، الدماغ، أغشية الدماغ، في الأذن الوسطى أو في الأذن الخارجية عندما يكون الغشاء الطبلي (طبلة الأذن) مثقوباً.
- بالحقن.
- في فتحات الجسم (على سبيل المثال: الأنف، الأذنين).
- عندما يتم استعمال الإنفاذ الحراري (نوع من التجهيزات الجراحية) بعد استعمال ألكوسبت - يجب التأكد من عدم تراكم ألكوسبت ومن جفاف الجلد وأي تسبب في محيط متلقي العلاج.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- ألكوسبت يحتوي على كلورهيكسيدين. معلوم أن كلورهيكسيدين يسبب فرط الحساسية، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية العامة والصدمة التأقية. مدى شوب فرط الحساسية

لكلورهيكسيدين غير معلوم. لا يجوز استعمال ألكوسبت لدى متلقي العلاج الذين يُحتمل أن لديهم سيرة مرضية من رد فعل تحسسي لمركب يحتوي على كلورهيكسيدين.

- إذا أعطي الدواء بالتسريب (الإنفوزيا) عن طريق الخطأ - فيُحتمل أن تكون هناك ضرورة لنقل الدم من أجل إبطلال احتلال الدم.
- استعمال محاليل كلورهيكسيدين لتطهير الجلد قبل الإجراءات الغزوية - سواء تلك التي تركز على الكحول أو المائية - مرتبط بحدوث حروق كيميائية لدى المواليد الجدد. يبدو أن الأطفال الرضع الذين يولدون قبل الأوان أكثر عرضة لهذا الخطر، خاصة أولئك الذين يولدون قبل الأسبوع الـ 32 من الحمل وخلال أول أسبوعين في حياتهم.
- لا يجوز مجاورة المنتج لمصادر الحرارة أو النار.
- لا يجوز إشغال سيجارة أو التعرض للنار إلى أن يجف المستحضر تماماً.
- لا تجوز إتاحة التلامس مع العينين بسبب التخوف من تضرر البصر. إذا نجم تلامس مع العينين - اشطفهما جيداً بالماء وبشكل فوري. في حالة نشوء تهيج، احمرار، ألم في العين أو اضطراب في الرؤية فاطلب المشورة الطبية بشكل فوري. تم الإبلاغ عن حالات خطيرة من تضرر القرنية المسمر عند تلامس منتجات مشابهة مع العين بالخطأ أثناء إجراءات جراحية، لدى المرضى الخاضعين للتخدير الكلي (النوم العميق من غير الأم).

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية التناول:

لا يجوز بلعه! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط. يجب الامتناع عن ملامسة العينين والأنسجة المخاطية. في حالة الملامسة يجب الغسل بالكثير من الماء ومراجعة الطبيب عند الحاجة.

كيفية الاستعمال:

يجب مسح المنطقة المخصصة للتطهير بقطعة من القطن المرغوب بالكوسبت كلما تطلبت الحاجة.

إذا بلعت الدواء بالخطأ أو إذا قام ولد وبلع الدواء بالخطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ألكوسبت إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف فوراً عن استعمال الدواء والتوجه لتلقي العلاج الطبي إذا ظهرت الأعراض التالية:

- في أحيان نادرة جداً يمكن أن يسبب كلورهيكسيدين فرط الحساسية، بما في ذلك الصدمة التأقية (انفجاق الحلق أو الشفتين، ضغط دم منخفض)
- أعراض جانبية إضافية مدى شوبها غير معروف:
- ردود فعل تحسسية (مثلاً التهاب الجلد، حكة، احمرار، إيكزيماء، طفح جلدي، شرى، تهيج الجلد، حويصلات).
- تضرر القرنية (تضرر مساحة سطح العين) وضرر دائم للعينين يشمل اختلال الرؤية الدائم (بسبب التعرض العرضي للعينين أثناء جراحة للראس، الوجه والرقبة) لدى المرضى الخاضعين للتخدير الكلي (النوم العميق من غير الأم).

أعراض جانبية لدى المواليد الجدد:

- يُحتمل حدوث حروق كيميائية لدى المواليد الجدد والأطفال الرضع (الشبوب غير معلوم).
- إذا حدث أحد ردود الفعل هذه، فيجب التوقف عن الاستعمال والتوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين في مكان بارد، في درجة حرارة دون 25°C.
- تنيبه! مادة قابلة للاشتعال، تُحفظ بعيداً عن النار.
- بعد الفتح لأول مرة، يمكن استعمال الدواء حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادتين الفعالين، يحتوي الدواء أيضاً على:

Purified water, Tartrazine.

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه

محلول أصفر اللون.
يأتي الدواء في عبوة بأحجام: 100 مل، 300 مل، 500 مل أو 1,000 مل.

قد لا تسوق جميع أحجام العبوة.

المصنَّع وصاحب الامتياز:

بن شمعون فلوريس م.ص.، المنطقة الصناعية ميسجاف، بريد منجول ميسجاف 2017400، إسرائيل.
تم تحرير هذه النشرة في 03/2025 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

129-67-30806-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.