

ינואר 2025

רופא/ה נכבד/ה,  
רוקח/ת נכבד/ה,

**חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ מבקשת להודיע על עדכונים בעלון לצרכן ובעלון לרופא של התכשיר שבנדון:**

**Deferiprone Taro 1000 mg      דפריפרון תרו 1000 מ"ג**

**התוויה מאושרת:**

Deferiprone Taro 1000 mg is indicated for the treatment of iron overload in patients over 6 years old with thalassaemia major in whom deferoxamine therapy is contraindicated or inadequate.

**מרכיב פעיל:** Deferiprone 1000 mg

**צורת המתן של התכשיר:** Film coated tablets

שינויים בעלונים המהווים החמרה מודגשים ברקע **צהוב**, תוספות מסומנות בצבע **אדום** והשמטות מסומנות בקו אופקי. כמו כן, בעלונים בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה.

העלון מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: <https://israel drugs.health.gov.il>, ניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום: חברת תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 14. מפרץ חיפה 2624761, טל. 04-8475700

**להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן**

**2. לפני השימוש בתרופה**  
[...]

**הריון והנקה**

**הריון**

אין להשתמש בתרופה זו אם את בהריון או מתכננת הריון, **אלא אם יש צורך ברור בכך**. תרופה זו עלולה לגרום לנזק **בעובר** בשימוש אצל נשים בהריון. השתמש באמצעי מניעה יעילים כל עוד את מטופלת בדפריפרון תרו. שאלו את הרופא איזו שיטה היא הטובה ביותר עבורך. אם נכנסת להריון במהלך הטיפול בדפריפרון תרו, הפסיקי מייד לקחת את התרופה ועדכני את הרופא.

**אם את בהריון או נכנסת להריון תוך כדי טיפול בדפריפרון תרו עלייך לפנות באופן מיידי ליועץ רפואי.**

מומלץ למטופלים, הן לאישה והן לגבר לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים בעת פעילות מינית אם ישנה אפשרות כלשהי לכניסה להריון.

מומלץ לנשים שיכולות להיכנס להריון (בגיל הפוריות) להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול בדפריפרון תרו ולמשך 6 חודשים לאחר נטילת המנה האחרונה. מומלץ לגברים להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול בדפריפרון תרו ולמשך 3 חודשים לאחר נטילת המנה האחרונה. יש לדון בכך עם הרופא שלך.