

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### דילנטין™ 125 תרחיף

כל 5 מ"ל של התרחיף מכילים: פניטואין 125 מ"ג phenytoin 125 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### 1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בפרכוסים טוני-קלוני (גרנד מל) ובפרכוסים פסיכומטוריים (אונה טמפוראלית).

**קבוצה תרפויטית:** נוגד פרכוסים.

#### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6) או לתרופות ממשפחת ההידנטואין, כולל תגובת רגישות יתר של בצקת מסוג אנגיואדמה.
- סבלת בעבר מבעיות בכבד כתוצאה מנטילת פניטואין.
- אתה נוטל דלאווירדין.

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

**לפני הטיפול בדילנטין, ספר לרופא אם:**

- הינך סובל או סבלת מדיכאון, שינויים במצבי רוח, מחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית.
- חווית בעבר תגובה אלרגית לתרופות הדומות לדילנטין כגון קרבוקסאמידים, ברביטורטים, סוקצינימידים ואוקסזולידין-דיאונים.
- הינך סובל או סבלת מבעיות בכבד או בכליות.
- הינך סובל או סבלת ממחלת הפורפיריה.
- הינך סובל או סבלת מרמות סוכר גבוהות בדם (היפרגליקמיה).
- הינך צורך אלכוהול.
- הינך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון. דילנטין עלולה לגרום נזק לעובר.
- אם את נוטלת דילנטין במהלך היריון, התינוק שלך נמצא בסיכון למומים מולדים חמורים.
- אם הרית בזמן הטיפול בדילנטין, רמת התרופה בדם עשויה לרדת, דבר שגורם לפרכוסים חמורים יותר. הרופא עשוי לשנות את המינון של דילנטין.
- אם את נוטלת דילנטין במהלך היריון, התינוק שלך נמצא גם בסיכון לבעיות דימום מיד לאחר הלידה. הרופא עשוי לרשום לך ולתינוקך תרופה על מנת למנוע זאת.
- על כל הנשים בגיל הפרייה להתייעץ עם הרופא המטפל שלהן בנוגע לאפשרויות טיפול אחרות במקום דילנטין.
- אם את בגיל הפרייה ולא מתכננת להיכנס להיריון, עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן השימוש בדילנטין.
- הינך מניקה או מתכננת להניק. תרופה זו עלולה לעבור לחלב האם. את והרופא צריכים להחליט האם ליטול דילנטין בזמן שאת מניקה.

## אין להפסיק ליטול דילנטין בבת אחת וללא התייעצות עם הרופא.

- הפסקה פתאומית של דילנטין עלולה לגרום לבעיות חמורות.
- הפסקה פתאומית של תרופה לטיפול בפרכוסים עלולה לגרום לעלייה בשכיחות הפרכוסים או להתקף פרכוסים שלא מפסיק (סטטוס אפילפטיקוס).

## בדומה לתרופות נוגדות פרכוסים אחרות, דילנטין עלולה לגרום למחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית במספר קטן מאוד של אנשים (כ-1 מתוך 500). ראה סעיף 4, תופעות לוואי.

מחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית עלולות להיגרם על ידי גורמים אחרים מתרופות. ייתכן שהרופא יבדוק גורמים אחרים.

### על מנת לצפות תסמינים מוקדמים של מחשבות אובדניות או התנהגות אובדנית:

- יש לשים לב לכל שינוי, במיוחד שינויים פתאומיים במצב הרוח, בהתנהגויות, במחשבות או ברגשות.
  - יש להקפיד על ביקורים קבועים אצל הרופא המטפל.
- אנא פנה לרופא במידת הצורך, במיוחד אם אתה מודאג מהופעת תסמינים כלשהם.

## דילנטין עלולה לגרום לתגובה אלרגית חמורה, אשר עשויה להשפיע על חלקים שונים בגוף כגון הכבד, הכליות, הדם, הלב, העור או חלקים אחרים בגוף. תגובה זו עלולה להיות חמורה מאוד ואף לגרום למוות. ראה סעיף 4, תופעות לוואי.

תגובת רגישות יתר כוללת גם תגובה של העור ולעיתים נדירות תגובות עוריות חמורות. יש להפסיק מיד את נטילת התרופה במקרה של הופעת פריחה ולפנות לרופא. תגובת רגישות יתר כוללת גם תסמינים של בצקת מסוג אנגיודמה, כגון נפיחות של הפנים, אזור הפה או דרכי נשימה עליונות - במקרה של כל אחד מהתסמינים האלו יש להפסיק מיד את נטילת התרופה ולפנות לרופא.

## דילנטין עלולה לגרום לבעיות בלב, כולל קצב לב איטי. ראה סעיף 4, תופעות לוואי.

יש ליידע את הרופא על כל המצבים שבהם לא ניתן לקחת את התרופה דרך הפה כפי שנקבע (כגון ניתוח).

### בדיקות ומעקב

- בטיפול ממושך בתרופה יש לערוך בדיקת צפיפות עצם ורמות ויטמין D באופן תקופתי.
- תרופה זו יכולה להשפיע על תוצאות הרמות בדם של הורמונים של בלוטת התריס, דקסטזון, מטרפון, אלקליין פוספטאז, גלוקוז ו-GGT.
- בשילוב של התרופה עם חומצה ולפרואית או סודיום ולפרואט, ייתכן סיכון מוגבר לעודף אמוניה בדם (היפראמוניה) הקשורה לולפרואט. חולים המטופלים בשתי תרופות אלו צריכים להיות במעקב אחר סימנים ותסמינים של היפראמוניה.

### תגובות בין תרופתיות

שימוש בדילנטין עם תרופות מסוימות אחרות עלול לגרום לתופעות לוואי או להשפיע על יעילותן. אין ליטול או להפסיק לקחת תרופה אחרת מבלי להיוועץ ברופא.

## אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

### תרופות העלולות להעלות את רמת הפניטואין בדם:

תרופות נוגדות פרכוסים כגון אתוסוקסימיד, פלבמט, אוקסקארבאזפין, מטסוקסימיד, טופיראמאט; אזולים כגון פלוקונאזול, קטוקונאזול, מיקונאזול, איטראקונאזול, ווריקונאזול; תרופות לטיפול בגידולים סרטניים כגון קאפציטאבין, פלואוראוראציל; תרופות נגד דיכאון כגון פלואוקסטין, פלובוקסאמין, סרטלין; תרופות להורדת חומציות בקיבה כגון חוסמי H<sub>2</sub> (סימטידין), אומפראזול; סולפונאמידים כגון סולפאמטיזול, סולפאפינאזול, סולפאדיאזין, סולפאמתוקסאזול-טרמתופרים; תרופות אחרות כגון אמידארון, כלורמפניקול, כלורודיאזפוקסיד, דיסולפיראם, אסטרוגן, פלובאסטאטין, איזוניאזיד, מתילפנידאט, פנותיאזינים, סליצילאטים, טיקלופידין, טולבוטאמיד, טראזודון, וארפרין; כמו כן צריכת אלכוהול חריפה.

### תרופות העלולות להוריד את רמת הפניטואין בדם:

נוגדי חומצה כגון קלציום קרבונט, אלומיניום הידרוקסיד, מגנזיום הידרוקסיד (תכשירים אלו עלולים להשפיע על ספיגת התרופה, יש להימנע מנטילת נוגדי חומצה באותו זמן ביום עם דילנטין); תרופות לטיפול בגידולים סרטניים (בדרך כלל בשילוב) כגון בלאומיציין, קרבופלטיין, ציספלאטיין, דוקסורוביציין, מטותרקסאט; תרופות אנטי ויראליות כגון פוסאמפרנאביר, נלפינאביר, ריטונאביר; תרופות נוגדות פרכוסים כגון ויגבטריין, קארבאמזפין; תרופות אחרות כגון דיאזפאם, דיאזוקסיד, חומצה פולית, רזרפין, ריפאמפין, היפריקום (St. John's Wort), סוכראלפאט, תאופילין; כמו כן צריכת אלכוהול כרונית.

### תרופות העלולות להעלות/להוריד את רמת הפניטואין בדם:

תרופות נוגדות פרכוסים כגון פנובארביטאל, חומצה ולפרואית, סודיום ולפרואט.

#### תרופות שהאפקט שלהן עלול להשתנות כתוצאה מהשילוב עם פניטואין:

אזולים כגון פלוקונאזול, קטוקונאזול, איטראקונאזול, פוסאקונאזול, ווריקונאזול; תרופות לטיפול בגידולים סרטניים כגון אירינוטקאן, פאקליטאקסל, טניפוסיד; דלאווירדין (ראה סעיף 2: "אין להשתמש בתרופה אם"), תרופות להרפיית שרירים כגון ציסאטראקוריום, פנקורוניום, רוקורוניום, וקורוניום; וארפרין; תרופות אחרות כגון קורטיקוסטרואידים, דוקסיציקלין, אסטרוגנים, פורוסמיד, גלולות למניעת הריון, פארוקסטין, כינידין, ריפאמפין, סטרלין, תאופילין, ויטמין D.

#### תרופות שרמתן בדם עלולה לרדת כתוצאה מהשילוב עם פניטואין:

נוגדי קרישה כגון אפיקסבן, דביגטרן, אדוקסבן, ריברוקסבן, תרופות נוגדות פרכוסים כגון קארבאמזפין, פלבמט, לאמוטריג'ין, טופירמאט, אוקסקארבאזפין, לקוסאמיד; תרופות להורדת רמת השומנים בדם כגון אטורבסטטין, פלובאסטטין, סימבסטטין; מעכבי פעילות טסיות הדם כגון טיקג'רלור; תרופות אנטי ויראליות כגון אפאבירנז, לופינאביר/ריטונאביר, אינדינאביר, נלפינביר, ריטונאביר סקווינאביר, פוסאמפרנאביר; תרופות לטיפול ביתר לחץ דם וללב כגון ניפדיפין, נימודיפין, ניזולדיפין, וראפאמיל; תרופות אחרות כגון אלבנדאזול, כלורפרופאמיד, קלזאפין, ציקלוספורין, דיגוקסין, דיזופיראמיד, חומצה פולית, מתאדון, מקסילטין, פראזיקואנטל, קוואטיאפין.

#### **שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

במהלך הטיפול בתרופה אין לצרוך כלל אלכוהול ללא התייעצות מוקדמת עם הרופא. צריכת אלכוהול בזמן נטילת דילנטין עשויה לשנות את רמת התרופה בדם, דבר שעלול לגרום לבעיות חמורות.

#### **היריון, הנקה ופוריות**

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, דילנטין עלולה לגרום נזק לעובר.

- אם את נוטלת דילנטין במהלך ההיריון, התינוק שלך נמצא בסיכון למומים מולדים חמורים.
- אם הרית בזמן הטיפול בדילנטין, רמת התרופה בדם עשויה לרדת, דבר שגורם לפרכוסים חמורים יותר. הרופא עשוי לשנות את המינון של דילנטין.
- אם את נוטלת דילנטין במהלך ההיריון, התינוק שלך נמצא גם בסיכון לבעיות דימום מיד לאחר הלידה. הרופא עשוי לרשום לך ולתינוקך תרופה על מנת למנוע זאת.
- על כל הנשים בגיל הפרייה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאפשרויות טיפול אחרות במקום דילנטין.
- אם את בגיל הפרייה ולא מתכננת להיכנס להיריון, עליך להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן השימוש בדילנטין. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך מניקה או מתכננת להניק. תרופה זו עלולה לעבור לחלב האם. את והרופא צריכים להחליט אם ליטול דילנטין בזמן שאת מניקה.

#### **נהיגה ושימוש במכוונות**

אין לנהוג, להפעיל מכוונות כבדות או לבצע פעילויות מסוכנות עד שתדע כיצד דילנטין תשפיע עליך. דילנטין עלולה להאט את יכולות החשיבה והיכולות המוטוריות (התנועתיות). ראה סעיף 4, תופעות לוואי.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

התרחיף מכיל סוכרוז ולכן יש להיזהר בשימוש בחולי סוכרת. התרופה מכילה אלכוהול (ראה סעיף 6, מידע נוסף).

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא 5 מ"ל של תרחיף, 3 פעמים ביום. הרופא עשוי לשנות את המינון במידת הצורך. אין לשנות את המינון מבלי להיוועץ ברופא.

#### **אין לעבור על המנה המומלצת.**

יש לנער את התרחיף לפני השימוש.

יש להימנע מנטילת נוגדי חומצה (כגון קלציום קרבונט, אלומיניום הידרוקסיד, מגנזיום הידרוקסיד) באותו זמן ביום עם דילנטין. תכשירים אלו עלולים להשפיע על ספיגת התרופה.

#### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמינים ראשוניים של מינון יתר כוללים: ריצוד עיניים, חוסר קואורדינציה והפרעה בדיבור. סימנים אחרים כוללים: רעד, עודף רפלקסים, מצב של חוסר תגובה, דיבור עילג, ראייה מטושטשת, בחילה והקאה. ייתכן אובדן הכרה וירידה בלחץ הדם. כמו כן דווח על קצב לב איטי ודום לב.

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה!**

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

#### **אם אתה מפסיק את נטילת התרופה**

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. הפסקת התרופה עלולה לגרום לעלייה בשכיחות הפרוסים או להתקף פרוסים שלא מפסיק (סטטוס אפילפטיקוס).

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בדילנטין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

#### **יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרה של:**

- תגובה של רגישות יתר לתרופה, הכוללת פריחה עורית, חום והגדלה של בלוטות לימפה ו/או נפיחות בפנים.
- תגובה של רגישות יתר לתרופה, הכוללת תסמינים של בצקת מסוג אנגיודמה, כגון נפיחות בפנים, אזור הפה או דרכי נשימה עליונות.
- שוק אנפילקטי.

**יש לפנות מיד לרופא במקרה שמופיעה אחת או יותר מהתופעות הלוואי הבאות, במיוחד אם הן חדשות, היו קיימות והחמירו או מדאיגות אותך:**

דיכאון, חרדה, עצבנות – תופעות חדשות או שהיו קיימות והחמירו.  
מחשבות והתנהגות אובדנית, התקף פאניקה, חוסר מנוחה ואי שקט, אגרסיביות (כעס ואלימות), התנהגות אימפולסיבית מסוכנת, דיבור ופעילות יתר (מאניה), שינויים חריגים אחרים במצב הרוח ובהתנהגות, נדודי שינה.

דילנטין עלולה לגרום לתגובה אלרגית חמורה, אשר עשויה להשפיע על חלקים שונים בגוף כגון הכבד, הכליות, הדם, הלב, העור או חלקים אחרים בגוף. תגובה זו עלולה להיות חמורה מאד ואף לגרום למוות.

#### **יש לפנות מיד לרופא במקרה ומופיעה אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות:**

חום, פריחה, הגדלה של בלוטות לימפה, נפיחות של הפנים, העיניים, השפתיים או הלשון, קושי בבליעה או בנשימה, כאב גרון, פצעים כואבים בפה, נטייה גבוהה לחבורות, כתמים סגולים או אדומים על העור, זיהומים בתדירות גבוהה, איבוד תיאבון (אנורקסיה), בחילה, הקאה, הצהבה של העור או העיניים (צהבת).

יש לפנות לרופא גם אם התופעות קלות או אם אתה נוטל דילנטין במשך תקופה ממושכת. תופעות אלו עלולות להיות סימן לתגובה אלרגית חמורה.

דילנטין עלולה לגרום לבעיות בלב, כולל קצב לב איטי.

#### **יש לפנות מיד לרופא במקרה ומופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:**

סחרחורת, עייפות, תחושה שהלב פועם באיטיות או מחסיר פעימות, כאב בחזה.

#### **תופעות לוואי נוספות כוללות:**

עצירות, סחרחורת, נמנום קל, בלבול, עצבנות קלה, כאב ראש, ריצוד עיניים, הפרעות בדיבור, הליכה או בקואורדינציה, תנועות לא רצוניות, הפרעה בחוש הטעם כולל טעם מתכתי, תחושת נמול, בחילה, הקאה, חום, רעד, חולשת שרירים או כאב, כאבים במפרקים, עלייה בסיכון לשברים (אוסטאופורוזיס, אוסטאופניה, אוסטאומלסיה), שברים בעצמות, רמות ויטמין D נמוכות, היפוקלצמיה, היפופוספטמיה, שינויים בספירת הדם (כגון תרומבוציטופניה ולויקופניה), אנמיה, רמות סוכר גבוהות (היפרגליקמיה), צהבת, פגיעה כבדית, זאבת אדמנתית מערכתית, שגשוג יתר של רקמת החניכיים, נפיחות של השפתיים, מחלת פיירוני, פריחה, חרלת, שיעור יתר, תגובות עוריות אחרות כוללות תסמונת סטיבנס-ג'ונסון (Stevens-Johnson syndrome), נמק אפידרמי רעלני (Toxic Epidermal Necrolysis) ותגובה עורית נדירה המתאפיינת בבליטות קטנות על העור עם נוזל מוגלתי.

רמות גבוהות של דילנטין בדם אשר עלולות לגרום לבלבול (הזיות), פסיכודה או מצב חמור יותר המשפיע על תפקוד המוח (אנצפלופתיה).

### **תסמינים במקרה של הפסקת הטיפול**

אם תפסיק את התרופה בפתאומיות יתכן שתפתח פרכוסים או התקף פרכוסים שלא מפסיק (סטטוס אפילפטיקוס).

התכשיר עלול לגרום לשגשוג החניכיים. צחצוח, שימוש בחוט דנטאלי וביקור קבוע אצל רופא השיניים יכולים למנוע מצב זה.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C. אין להקפיא.
- יש להגן מאור.
- לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש עד 4 חודשים.

### **6. מידע נוסף**

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

sucrose, glycerin, CMC sodium, magnesium aluminium silicate, sodium benzoate, alcohol, citric acid anhydrous, polysorbate 40, banana flavour, oil orange concentrated, FD&C yellow#6, vanillin, purified water.

**התרופה מכילה סוכרוז:**

כל 5 מ"ל דילנטין מכילים: 1044 מ"ג סוכרוז.

**התרופה מכילה אלכוהול:**

כל 5 מ"ל דילנטין מכילים: 20.38 מ"ג אלכוהול. התרחיף מכיל כ- 0.97 גרם אלכוהול (אתנאול), פחות מ- 0.6 אחוז.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

תרחיף בצבע כתום המגיע בבקבוק בתוך אריזת קרטון.

**יצרן ובעל הרישום:** דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 123-70-24017.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

עודכן בינואר 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.