

אטנט 10 מ"ג טבליות
אטנט 20 מ"ג טבליות
אטנט 30 מ"ג טבליות

הרכיב

1. למה מיעדת התרוס

התרופה מכילה תערובת מלחי אמפטמינים שהם חומרם המריצים את מערכת העצבים המרכזית, ומיועדת לאיסורן של הרציפות.

- שימוש כדלקמן: טיפול בהפרעת קשב, ריכוך והיפרattività (=הפרעת קשב), ובאנגלית: ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder התropaה עצורה על הגביר את העירנות ולהוירד את סף האימפולטיביות וההיפרattivitàים במטופלים הסובלים מהפרעת קשב. יש להשתמש בתreatment זו במוגרת חוכנית שיקומית של ADHD הכוולה יעוץ או טיפולים אחרים.
 - טיפול ברנוקולפסיה (מחלה המאפיינת בהתקפי שינוי בלתי נשלטים במהלך היום).

קבוצה רפואיית

תערובת מלחי אמפטמינים.

2. לפני השימוש בתרוופה

- אין להשתמש בתרופת אם:
 - זדעה רגישות לאמתניים או לאחד מהמרכיבים האחרים של התרופת אם, ראה "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופת אם" בפרק 2, ואת רשימת כל הרכיבים שמכילה התroppה בפרק 6 - "מידע נסף".
 - אתה וטל תרופת נגד דיכאון מסווג מרכיבי מונואמין אוקסיטיז (MAOIs) כולל האנטיביוטיקה לינזוליד (methylene blue) (linezolid) או מתילין בלוי (methylene blue) בהזרקה, או אם נטלה תרופת כזו במשך 14 הימים לאחר מכן.

ازהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בת蘿פה

על הרופא לעורך בדיקה מדוקדקת של תפקוד הלב שלאו של ילדר טרם תחילת הטיפול בתורופה.

- בעיות לב, מחלת לב, מום בלב, יתר לוחץ דם
 - או אם קיימת היסטוריה משפחתית, כולל:
ילדך סובל או אם סבלת בעבר מבעיה רפואייה כלשהי
 - לפנינו התחלת הטיפול יש לספר לרופא אם אתה או
הדם ודופק הלב בתקופת הטיפול בתרופה.
 - על הרופא לעורר לך או לילדך בדיקות סידורתיות של לחץ

- בעיות נפשיות כולל פסיכון, מאניה,

- בעיות בכליה דו-קוטבית, דיכאון, עבר משפחתי של התאבדות

- עוררות או תזקאות לא תקין של בדיקת גל המוח (EEG)
 - בעיות במחזור הדם באצלעות הידיים והרגליים
 - תנענות או צלילים חרוזים – טיקים או הסמנות טורט

איןטראקטזרות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך חת לאחרונה, תרופות

כולל תרופות לכל מرض ותוספי תזונה, ספר על כן לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח את אופת ליבתך:

- תרופות מקובצות SSRIs – מעכבר רירני של ספיגה חדש של סרטוניין
 - תרופות מקובצות SNRIs – מעכבר ספיגה חדש של סרטוניין נוראפרנינרין
 - תרופות לטיפול בכאבי ראש של מיגרנה התקראות גונדרגונזין

• ווגדי דיראנו וריאיצטלייט

נאות וסודות במקרא

- טרמזרול
 - טריפטופן
 - בוספירון
 - סנט יון ווורט St. John's Wort
 - תרופה נגד דיכאון כולל תרופות מקבוצת מעכבי מנומאטיים אוקפיקידיז (MAOIs) באה רבבה 2 "איו"

להשתמש בתרופה אם

- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם
- תרופות נגד התקפיعروיות

- תרופה להקלת החצנות או תרופה נגד אלרגיה המכילות מפיגי גודש
 - תרופה לטיפול בחומציות יתר של הקיבה עליך להכיר את התרופות שאתא או ילך נטלים. יש להזכיר ולשמור רשימת התרופות על מנת להציגה לרופך או לרופא לפוי האזרע

בנין גן

אם את בהירyon או שוקلت להיכנס להירyon, יש להתייעץ עם הרופא ורוכם ווילמת החרופה. לא ידוע אם אונונז מזיכר

- הנקה**
התroxפה עוברת לחלב האם. יש להימנע מהונקה בעת השימוש בתroxפה.

שימוש בילדים

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בלבדם מתחת לגיל 3 שנים

התרופה מכילה אמפטמינים שכוכלים לגירום לתעבורה
לווארי וציניות כולל:
שימוש לרעה והתמכרות:
לאטנט סיכרים גבוה לשימוש לרעה או שימוש לשלול להוביל להתמכרות.
שימוש לרעה ושימוש לא נכון באטנט, בתרופות א-
הכלולות אמפטמינים והתרופות המכילות מתלבפים
עלולים להוביל למיןון יתר ולמוות. הסיכון לע-
ם מינונים גברויים יותר של אטנט או כאשר ה-
נעשה בנסיבות מתן לא毛主席ת כמו הסנהפה או ר-
על הרופא לבדוק את הסיכון לשימוש לרעה, על-
או נכון או להתמכרות שלך או של יילך לפניו
הטיפול באטנט, להמשיך במעקב לאורך הטיפול
אטנט עלול להוביל לתלות פיסית לאחר שימושו מה-
גם אם נטיל בהתאם להוראות הרופא.
אל תעביר אטנט לאף אדם אחר.
שמור את התרופה במקומם בטוח והיפטר מכל ע-
תרופה כנדיש.
ספר לרופא אם אתה או יילך השתמשתם אי פעם
או אם הייתם תלויים באלהוול, תרופות מרשם או
סיכום לאנשימים עם חלות לב חמורות:
חמות פראומי אירע לאנשים עם מומים לב-
חרופת לב חמורות אכזרית.