

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קונסרטה™ 18 מ"ג, טבליות בשחרור מושהה

קונסרטה™ 27 מ"ג, טבליות בשחרור מושהה

קונסרטה™ 36 מ"ג, טבליות בשחרור מושהה

קונסרטה™ 54 מ"ג, טבליות בשחרור מושהה

	כל טבליה של קונסרטה 18 מ"ג מכילה 18 מ"ג מתילפנידט הידרוכלוריד
methylphenidate hydrochloride 18 mg	
	כל טבליה של קונסרטה 27 מ"ג מכילה 27 מ"ג מתילפנידט הידרוכלוריד
methylphenidate hydrochloride 27 mg	
	כל טבליה של קונסרטה 36 מ"ג מכילה 36 מ"ג מתילפנידט הידרוכלוריד
methylphenidate hydrochloride 36 mg	
	כל טבליה של קונסרטה 54 מ"ג מכילה 54 מ"ג מתילפנידט הידרוכלוריד
methylphenidate hydrochloride 54 mg	

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

אזהרה: שימוש לרעה, שימוש שלא בהתאם לעלון והתמכרות

לתכשיר קונסרטה יש סיכון גבוה לשימוש לרעה ושימוש שלא בהתאם לעלון, שעלול להוביל להתפתחות של שימוש לרעה בחומרים, כולל התמכרות. שימוש לרעה ושימוש שלא בהתאם לעלון בתרופות המעוררות את מערכת העצבים המרכזית, כולל קונסרטה, עלולים להוביל למנת יתר ולמוות (ראה סעיף "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר"), סיכון זה עולה כשנוטלים מנות גבוהות יותר או כשנוטלים באופן שאינו מאושר, כגון הסנפה או הזרקה.

1. למה מיועדת התרופה?

קונסרטה מיועדת לטיפול בהפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD) בילדים מעל גיל 6, במתבגרים ובמבוגרים עד גיל 65.

קונסרטה יכולה לשפר את הקשב, את הריכוז, ולהקטין אימפולסיביות והיפראקטיביות באנשים עם ADHD.

קונסרטה אמורה להינתן כחלק מתכנית טיפולית ל-ADHD שיכולה לכלול ייעוץ או טיפולים אחרים. **קבוצה תרפויטית:** מעורר מערכת העצבים המרכזית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם אתה או ילדך:

- רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (methylphenidate hydrochloride) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- סובל מטיקים או סינדרום טורט (Tourette's Syndrome) או שקיימת היסטוריה משפחתית של סינדרום טורט. טיקים הינם תנועות או קולות חזרתיים בלתי נשלטים.
- נוטל כעת או נטל/ת במהלך 14 יום לפני התחלת הטיפול בקונסרטה תכשיר לטיפול בדיכאון ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידז (MAO monoamine oxidase inhibitor).
- אין להשתמש בקונסרטה בילדים מתחת לגיל 6 היות שהתרופה לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני התחלת הטיפול בקונסרטה ספר לרופא אם אתה או ילדך סובל או סבל/ת או שקיימת היסטוריה משפחתית של אחד מהמצבים הבאים:

- התמכרות/תלות או שימוש לרעה באלכוהול, תרופות מרשם או סמי רחוב.
- בעיות בלב, מחלת לב, מום בלב או לחץ דם גבוה.
- קיימת היסטוריה משפחתית של מוות פתאומי.
- בעיות נפשיות, כגון פסיכוזה, מאניה, הפרעה דו-קוטבית (בי פולרית) או דיכאון, או שקיימת היסטוריה משפחתית של אובדנות, הפרעה דו-קוטבית או דיכאון.
- תנועות או קולות חזרתיים בלתי נשלטים (טיקים) או תסמונת טורט, או שיש היסטוריה משפחתית של טיקים או תסמונת טורט.
- פרכוסים או תוצאות לא תקינות של סקירה מוחית (EEG).
- בעיות סירקולציה (זרימת דם) באצבעות הידיים והרגליים.
- בעיות במערכת העיכול - חסימה או היצרות במעיים.
- בעיות בעיניים, כולל לחץ מוגבר על העין, גלאוקומה, או בעיות בראייה מקרוב (רוחק ראייה).
- בהריון או מתכננת הריון. לא ידוע אם קונסרטה עלולה לפגוע בעובר.
- מניקה או מתכננת להניק. לא ידוע אם קונסרטה עוברת לחלב אם. יש להתייעץ עם הרופא לגבי התזונה המיטבית עבור התינוק בעת טיפול בקונסרטה.

הבעיות הבאות דווחו בשימוש במתילפנידיט הידרוכלוריד ותרופות מעוררות אחרות :

שימוש לרעה, שימוש מכונן שלא בהתאם לעלון והתמכרות

לתכשיר קונסרטה יש סיכון גבוה לשימוש לרעה שעלול להוביל לבעיות בנטילת התרופה, כולל התמכרות. שימוש לרעה בקונסרטה, תרופות אחרות שמכילות מתילפנידיט ותרופות המכילות אמפטמין, עלול להוביל למנת יתר ומוות. הסיכון למנת יתר ומוות עולה כשנטלים מנות גבוהות יותר של קונסרטה או כשנטלים באופן שאינו מאושר, כגון הסנפה או הזרקה.

- רופאך צריך לבדוק את הסיכון עבורך ועבור ילדך לשימוש לרעה, שימוש שלא בהתאם לעלון והתמכרות לפני התחלת הטיפול בקונסרטה, ולנטר את הטיפול שלך או של ילדך.
- קונסרטה עלולה לגרום לתלות גופנית לאחר שימוש ממושך, גם אם נלקח על פי הנחיית רופאך.
- אין לתת קונסרטה לאף אחד אחר. ראה סעיף 1 "למה מיועדת התרופה" למידע נוסף.
- יש לשמור קונסרטה במקום בטוח ולהשליך כל תרופה שנותרה. ראה סעיף 5 "איך לאחסן את התרופה?".
- יש לספר לרופאך אם אתה או ילדך סבלת משימוש לרעה או תלות באלכוהול, תרופות מרשם או סמי רחוב.

בעיות הקשורות בלב

- מוות פתאומי בחולים הסובלים מבעיות לב או מום לבבי.
 - שבץ והתקפי לב במבוגרים.
 - עלייה בלחץ דם ודופק.
- בדרך כלל, אין להשתמש בקונסרטה בילדים, במתבגרים או במבוגרים הסובלים ממום בלב או מבעיות חמורות אחרות בלב.

פנה באופן מיידי לרופא או לחדר מיון של בית החולים הקרוב, אם אתה או ילדך מפתחים תסמינים של בעיות לב כגון כאב בחזה, קוצר נשימה או עילפון במהלך השימוש בקונסרטה.

עלייה בלחץ דם ודופק

תרופות מעוררות עלולות לגרום לעלייה בלחץ הדם ודופק. רופאך יעקוב אחרי מדדי לחץ דם ודופק אם הנך נוטל תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ודופק מואץ.

בעיות נפשיות (פסיכיאטריות)

- תרופות מעוררות עלולות לגרום או להחמיר בעיות התנהגות או מחשבות במטופלים עם בעיה נפשית קיימת.
 - הופעה או החמרה של הפרעה ביפולארית (דו-קוטבית).
 - תופעות פסיכוטיות חדשות (כגון שמיעת קולות או ראייה של דברים שלא קיימים) או הופעה של תסמינים מאניים חדשים.
- ספר לרופאך על בעיות נפשיות שהנך או ילדך סובל מהם, או היסטוריה משפחתית של התאבדות, מחלה ביפולארית או דיכאון.
- יש לפנות לרופא באופן מיידי אם אתה או ילדך חווים הופעה חדשה או החמרה של תסמינים נפשיים או בעיות במהלך השימוש בקונסרטה, בייחוד שמיעה של קולות וראייה של דברים לא אמיתיים, אמונה בדברים לא אמיתיים, או הופעת תסמינים חדשים של מאניה.**

ילדים ומתבגרים

אין להשתמש בקונסרטה בילדים מתחת לגיל 6 היות שהתרופה לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב

הרופא יבדוק אותך או את ילדך לבעיות לב לפני תחילת הטיפול בקונסרטה. הרופא יבצע ניטור בדיקות דם, לחץ הדם וקצב הלב, לך או לילדך, באופן קבוע במהלך הטיפול עם קונסרטה.

יש לנטר לעיתים קרובות את הגובה והמשקל של ילדים הנוטלים קונסרטה. ייתכן שהטיפול בקונסרטה יופסק אם תמצא בעיה במהלך ניטורים אלו.

אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות

אם אתה או ילדך לוקח, או אם לקח/ת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

קונסרטה בשילוב עם תרופות מסוימות עלולות לגרום לתופעות לוואי חמורות. לעיתים קיים צורך להתאים את המינונים של התרופות בתקופת הנטילה של קונסרטה. הרופא שלך יחליט אם ניתן ליטול קונסרטה עם תרופות אחרות.

במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה או ילדך לוקח את אחד הבאים:

- תרופות ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידז (MAOI). אין ליטול קונסרטה אם אתה או ילדך נוטל כעת או נטל/ת במהלך 14 יום לפני התחלת הטיפול בקונסרטה תכשירים לטיפול בדיכאון ממשפחת מעכבי האנזים מונואמין אוקסידז (MAOI) (ראה גם פרק 2 - סעיף "אין להשתמש בתרופה...").
- תרופות לטיפול בלחץ דם.
- תרופות שמשפיעות על כיווץ כלי דם (כגון תרופות לטיפול בצינון או אלרגיה המכילות נוגדי גודש).
- תרופות נוגדות קרישה מקבוצת הקומרינים (כגון וורפרין).
- תרופות לטיפול בפרכוסים (כגון פנוברביטל, פניטואין, פרימדון).
- תרופות לטיפול בדיכאון (כגון נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי ספיגת סרוטונין).
- תרופה לטיפול במחלת נפש – ריספרידון.

יש להכיר את התרופות שאתה או ילדך נוטל. יש לשמור רשימת תרופות שלך או של ילדך על מנת להציג לרופא ולרוקח את רשימת התרופות שאתה או ילדך נוטל, כשמקבלים תרופה חדשה. **אין להתחיל בנטילת תרופות חדשות במהלך הטיפול בקונסרטה מבלי לשוחח קודם עם הרופא שלך.**

אם הנך עומד לעבור ניתוח

יש להודיע לרופאך אם הנך עומד לעבור ניתוח. זאת משום שאסור ליטול מתילפנידט ביום הניתוח עם סוג מסוים של תרופת הרדמה. קיים סיכון לעליית לחץ דם בזמן ניתוח.

שימוש בתרופה ומזון

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים או נוזל אחר.
הטבליה יכולה להילקח עם או ללא מזון

הריון, הנקה ופוריות

אם את בהריון, מניקה או מתכוננת להרות, יש לדווח לרופא אשר יחליט אם את יכולה ליטול קונסרטה.

נהיגה ושימוש במכונות

חומרים ממריצים עלולים לפגום ביכולתך או ביכולת ילדך להפעיל מכונות מסוכנות או לנהוג ברכב. יש לפעול בזהירות, ולבצע פעולות אלו רק כאשר אתה או ילדך בטוח שהתרופה אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

קונסרטה מכילה לקטוז. היוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה אם הנך סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים.
נתרן- תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן פר טבליה, כלומר היא למעשה נחשבת ל"נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
אין לעבור על המנה המומלצת.
קונסרטה הינה טבליה בשחרור מושהה. היא משחררת את התרופה לגוף לאורך היום. על כן אין **ללעוס, לכתוש או לחצות את הטבליה.**
יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מים או נוזל אחר.
ספר לרופא אם אתה או ילדך לא יכול לבלוע את הטבליה בשלמותה. ייתכן שיהיה צורך לרשום לך/לילדך תרופה אחרת.
הטבליה יכולה להילקח עם או ללא מזון.
יש ליטול את הטבליה פעם ביום, בבוקר.
טבלית קונסרטה לא מתמוססת בשלמותה בגוף. לאחר שכל התרופה השתחררה, ייתכן כי תבחין לעיתים בטבליה ריקה בצואה, דבר זה תקין.
ייתכן שהרופא יפסיק את הטיפול בקונסרטה מדי פעם לזמן מה על מנת לבדוק את תסמיני הפרעת הקשב והריכוז עם היפראקטיביות (ADHD).

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולות להופיע תופעות לוואי כתוצאה ממינון יתר: השפעות על הלב ולחץ הדם: שינויים והפרעות בקצב הלב, יתר לחץ דם או תת לחץ דם. השפעות על מערכת העצבים המרכזית: אגיטציה ועלייה בתנועות בלתי נשלטות, תחושת בלבול, הזיות (ראייה, תחושה ושמיעה של דברים לא מציאותיים). תסמונת סרטונין, פירכוסים, שבץ וקומה. חום גבוה מסכן חיים ותמס- שריר (רבדומיליזיס).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה, התייעץ עם הרופא טרם הפסקת השימוש בתרופה. **אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

- כמו בכל תרופה, השימוש בקונסרטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
- התכשיר קונסרטה עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות. יש לפנות מייד לרופא במקרים הבאים:**
- **שימוש לרעה, שימוש מכון שלא בהתאם לעלון והתמכרות.** (ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה").
 - **סימנים של אלרגיה** כגון פריחה, גרד או חרלת על העור, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים בגוף, קוצר נשימה, ציפצופים או קושי בנשימה.
 - **תסמינים של בעיות לב** כגון כאב בחזה, קוצר נשימה או עילפון. תופעות הלוואי הבאות דווחו בשימוש במתילפנידט או סטימולנטים אחרים: מוות פתאומי בחולים הסובלים מבעיות לב או מום לבבי, שבץ והתקפי לב במבוגרים עלייה בלחץ דם ודופק.
 - **עלייה בלחץ דם ודופק.** תרופות מעוררות עלולות לגרום לעלייה בלחץ הדם ודופק. רופאך יעקוב אחרי מדדי לחץ דם ודופק אם הנך נוטל תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ודופק מואץ.
 - **בעיות נפשיות (פסיכיאטריות).** הופעה חדשה או החמרה של תסמינים נפשיים או בעיות נפשיות במהלך השימוש בקונסרטה. בייחוד ראייה ושמיעה של דברים לא אמיתיים, אמונה בדברים לא אמיתיים או חשודים. בעיות התנהגותיות או מחשבתיות, דיכאון, הפרעה דו קוטבית. (ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה").
 - **פרכוסים.** אם אתה או ילדך מפתח פרכוסים, רופאך ינחה להפסיק את הטיפול.
 - **זקפה כואבת וממושכת (פריאפיזם).** קרו מקרים של פריאפיזם שדרש ניתוח בקרב מטופלים במתילפנידט. **אם אתה או ילדך מפתח פריאפיזם, יש לפנות לעזרה רפואית באופן מיידי.**

- **בעיות בזרימת דם באצבעות הידיים והרגליים** (Peripheral vasculopathy) כולל תופעת ריינו (Raynaud's phenomenon). התסמינים עלולים לכלול:
 - חוסר תחושה, תחושת קרירות או כאב באצבעות הידיים או הרגליים.
 - שינוי בצבע עור מחיוור לכחול ולאדום באצבעות הידיים או הרגליים.
 פנה לרופא אם הנך או ילדך סובל מאובדן תחושה, כאב, שינוי בצבע עור, או רגישות לטמפרטורה באצבעות הידיים או הרגליים.
- **יש לפנות לרופא באופן מיידי אם לך או לילדך מתפתחים סימנים של פצעים לא מוסברים באצבעות הידיים או הרגליים בעת הטיפול בקונסרטה.**
- **האטה בגדילה (גובה ומשקל) בילדים.** יש לבצע בדיקות תכופות של גובה ומשקל בילדים בזמן הטיפול בקונסרטה. ייתכן שיהיה צורך בהפסקת טיפול אם ילדך לא גדל או עולה במשקל כצפוי.
- **תיתכן חסימה במעיים.** מאחר שטבליות קונסרטה לא משנות את צורתן במעיים (מערכת העיכול), אין ליטול קונסרטה באנשים עם בעיות חמורות במעיים (היצרות חמורה של מעיים).
- **בעיות בעיניים (עלייה בלחץ תוך-עיני וגלאוקומה).** יש לפנות לרופא מיידי, אם הנך או ילדך מפתח שינויים בראייה או כאבים, נפיחות או אודם בעיניים.
- **שינויים בראייה או טשטוש ראייה.**
- **הופעה או החמרה של טיקים או החמרה של תסמונת טורט.** יש להודיע לרופא מיידי, אם הנך או ילדך סובל מהופעה או החמרה של טיקים או החמרה של תסמונת טורט בזמן הטיפול בקונסרטה.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד:

בקרב ילדים:

- כאב בבטן עליונה

בקרב מבוגרים:

- ירידה בתיאבון
- כאב ראש
- יובש בפה
- בחילה
- נדודי שינה
- חרדה
- סחרחורת
- ירידה במשקל
- עצבנות
- הזעה מוגברת

תופעות לוואי שכיחות שנצפו במחקרים קליניים:

בילדים ובמתבגרים: כאבים בבטן העליונה, הקאה, חום, נזופרינגיטיס (דלקת ריריות האף והלוע עם זלת מוגלתית), סחרחורת, נדודי שינה, שיעול, כאב בפה ובלוע.
במבוגרים: דופק מהיר, דפיקות לב, ורטיגו (תחושת סחרור), טשטוש ראייה, יובש בפה, בחילה, קשיי עיכול, הקאה, עצירות, נרגנות, זיהום בדרכי נשימה עליונות, ירידה במשקל, ירידה בתיאבון, אנורקסיה (הפרעת אכילה), מתח בשרירים, כאב ראש, סחרחורת, רעד, עקצוץ (פרסתזיה), טשטוש (סדציה), כאב ראש של מתח, נדודי שינה, חרדה, נדודי שינה ראשוניים, מצב רוח דיכאוני ודיכאון, עצבנות, חוסר שקט, תוקפנות, חריקת שיניים, ירידה בחשק מיני, אי יציבות רגשית, תחושת בלבול, מתח, כאבים בפה ובלוע, הזעת יתר.

תופעות לוואי נוספות שדווחו במחקרים קליניים:

ספירת כדוריות לבנות נמוכה (לויקופניה), יובש בעיניים, ליקויי אקומודציה (מיקוד ראייה), גלי חום, אי נוחות או כאב בבטן, שלשול, חולשה, עייפות, הרגשת מתח/עצבנות, תחושת צמא, דלקת בסינוסים, עלייה ברמת האנזים אלנין אמינוטרנספראז, עלייה בקצב לב, ובלחץ דם, רשרוש בלב, התכווצות שרירים, לאות (lethargy), ישנוניות, פעילות פסיכו-מוטורית מוגברת, כעס, דריכות יתר, שינויים במצב רוח, תנודות תכופות במצב הרוח, התקף פאניקה, הפרעת שינה, נטייה לבכי, טיקים, אין אונות, קוצר נשימה, פריחה בעור, פריחה מקולרית, יתר לחץ דם.

תופעות לוואי נוספות שדווחו בשימוש בתכשיר:

פנציטופניה (מספר נמוך מדי של כל תאי הדם - אדומים, לבנים וטסיות), ירידה בטסיות (תרומבוציטופניה), תרומבוציטופניה פורפורה (דימום המאפיין ספירת טסיות נמוכה מאוד).
תעוקת חזה, דופק איטי, הפרעות בקצב לב.
ראייה כפולה, עלייה בלחץ תוך-עיני, אישונים מורחבים, בעיות ראייה.
כאבים בחזה, אי נוחות בחזה, ירידה בהשפעת התרופה או בתגובה לתרופה, חום גבוה.
פגיעה בתאי כבד, אי ספיקת כבד חריפה.
תגובת רגישות יתר (אלרגיה) כגון אנגיואדמה, תגובה אנפילקטית, התנפחות של האוזן, שלפוחיות על פני העור, קילופי עור, חרלת (מחלת עור), גרד, גירוי בעור ו/או זיהום בעור, פריחה.
עלייה ברמת האנזים פוספאטאז בסיסי (alkaline phosphatase) בדם, עלייה ברמת בילירובין בדם, עלייה ברמת אנזימי הכבד בדם, ספירת כדוריות לבנות וטסיות לא תקינה.
כאבי מפרקים, כאבי שרירים, עוויתות שרירים, תמס שריר (רבדומיליזיס).
פרקוס, דיסקינזיה (תנועות חוזרות בלתי רצוניות), תסמונת סרטונין (בשילוב עם נטילת תרופות מסוימות), טיקים מוטוריים ומילוליים.
הרגשת חוסר התמצאות (דיסאורנטציה), הזיות (חזותיות או קוליות), מאניה, דיבור מופרז, שינויים בדחף המיני, זקפה מתמשכת וכואבת (פריאפיזם), נשירת שיער במקומות שונים בגוף (אלופציה), אדמומיות בעור (ארייתמה), כיווץ כלי הדם בקצות אצבעות הידיים והרגליים, בדרך כלל בעקבות חשיפה לקור (תסמונת ריינו).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. יש לאחסן קונסרטה במקום בטוח, כגון משרד נעול. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל- 25°C. יש לסגור הבקבוק היטב. השלך טבליות קונסרטה שנותרו, שאינן בשימוש או שפג תוקפן על פי כללי זהירות הבאים: יש לערבב את הטבליות עם חומר לא רצוי, לא רעיל כמו לכלוך, זבל חתולים או שאריות קפה משומשות כדי להפוך אותן לפחות מושכות לילדים וחיות מחמד. יש להניח את התערובת בכלי כגון שקית ניילון סגורה ולהשליך לפח הביתי.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

polyethylene oxide 200K, povidone K29-32, succinic acid, stearic acid, butylated hydroxytoluene (BHT), polyethylene oxide 7000K, sodium chloride, ferric oxide black, ferric oxide yellow, ferric oxide red (27 mg and 54 mg tablets only), cellulose acetate 398-10, poloxamer 188, hypromellose 2910, 3 cps, phosphoric acid.

ציפוי צבע:

lactose monohydrate, HPMC, titanium dioxide, triacetin, ferric oxide yellow (18 mg and 54 mg tablets only), stearic acid (18 mg tablet only), black iron oxide (27 mg tablet only), ferric oxide red (54 mg tablet only).

ציפוי שקוף:

HPMC, polyethylene glycol (macrogol 400), carnauba wax.

דיו להדפסה:

black iron oxide, isopropyl alcohol, propylene glycol, HPMC, purified water.

כל טבליה של קונסרטה 18 מ"ג מכילה: לקטוז מונוהידרט 6.84 מ"ג Lactose Monohydrate

כל טבליה של קונסרטה 27 מ"ג מכילה: לקטוז מונוהידרט 5.20 מ"ג Lactose Monohydrate

כל טבליה של קונסרטה 36 מ"ג מכילה: לקטוז מונוהידרט 17.60 מ"ג Lactose Monohydrate

כל טבליה של קונסרטה 54 מ"ג מכילה: לקטוז מונוהידרט 8.00 מ"ג Lactose Monohydrate

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קונסרטה 18 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע צהוב עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון "alza"
"18"

קונסרטה 27 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע אפור עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון "alza"
"27"

קונסרטה 36 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע לבן עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון "alza 36"
קונסרטה 54 מ"ג: טבליה בצורת קפסולה בצבע חום-אדום עליה הטבעה בדיו שחור של הסימון
"alza 54"

כל אריזה מכילה 30 טבליות.

בעל הרישום : ג'יי-סי הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים, 6099000, ישראל.
היצרן: יאנסן-סילג מניופקטוריונג, LLC, גוראבו, פוארטו ריקו, 00778, ארצות הברית.

נערך במאי 2024.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

קונסרטה 18 מ"ג - 126-85-30589

קונסרטה 27 מ"ג - 134-47-31123

קונסרטה 36 מ"ג - 126-86-30590

קונסרטה 54 מ"ג - 126-87-30591

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.