



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إتوريكوكسيب دِكسل 30, 60, 90, 120 ملغ, أقراص

كل قرص يحتوي على إتوريكوكسيب (Etoricoxib) بجرعة 30, 60, 90, 120 ملغ على التوالي.

المواد غير الفعّالة والمواد مسببة الحساسية (مستأرجة) في الدواء – انظر للبند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف للعلاج من أملك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل.

هذا الدواء غير مُخصص لعلاج الأطفال والمراهقين تحت جيل 16 سنة.

1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

إتوريكوكسيب دِكسل 30 ملغ يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل وفي العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب عظام المَفْصَل.

إتوريكوكسيب دِكسل 60 ملغ يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل وفي العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب عظام المَفْصَل، التهاب المَفْصَل الرُّوماتويديّ و التهاب الفقار المُقْسِط (ankylosing spondylitis).

إتوريكوكسيب دِكسل 90 ملغ يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل وفي العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المَفْصَل الرُّوماتويديّ و التهاب الفقار المُقْسِط (ankylosing spondylitis). إتوريكوكسيب دِكسل 90 ملغ يستعمل أيضاً لعلاج قصير الأمد للألم المتوسط بعد جراحة الأسنان.

إتوريكوكسيب دِكسل 120 ملغ يساعد على تقليل الألم والتورم (التهاب) في المفاصل وفي العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من النُفْرَس (gout).

الفصيلة العلاجية: إتوريكوكسيب دِكسل هو دواء من فصيلة الأدوية التي تُدعى مثبطات COX-2 الإنتقائية. والتي تنتمي إلى فصيلة الأدوية التي تُدعى مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية (NSAIDs).

ما هو التهاب عظام المَفْصَل؟

التهاب عظام المَفْصَل هو مرض مفاصل. هو نتيجة لانحلال تدريجي للغضروف والذي ينجّد أطراف العظام. الأمر الذي يؤدي إلى تورم (التهاب)، ألم، حساسية، صلابة وإعاقة.

ما هو التهاب المَفْصَل الرُّوماتويديّ؟

التهاب المَفْصَل الرُّوماتويديّ هو مرض التهابيّ طويل الأمد في المفاصل. هو يسبب ألماً، صلابة، تورم وفقدان متزايد للحركة في المفاصل الذي يُؤثر عليها. هو قد يؤدي أيضاً إلى التهاب في مناطق أخرى من الجسم.

ما هو النُفْرَس (gout)؟

النُفْرَس هو مرض من نوبات مفاجئة ودورية لالتهاب مؤلم جداً واحمرار في المفاصل. هو ينتج بسبب رواسب بلورية معدنية في المفاصل.

ما هو التهاب الفقار المُقْسِط (ankylosing spondylitis)؟

التهاب الفقار المُقْسِط هو مرض التهابيّ للعمود الفقري والمفاصل الكبيرة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعّالة (إتوريكوكسيب) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (مفصّلة في بند 6)
- كنت حساساً لأدوية مضادة للالتهاب لاسيتروئيدية (NSAIDs), بما في ذلك أسبيرين ومثبطات COX-2 (انظر البند 4 "أعراض جانبية")
- لديك قرحة نشطة في المعدة أو نزيف في المعدة أو في الأمعاء
- لديك مرض كبد و خيم
- لديك مرض كلوي و خيم
- كنت حاملاً أو قد تكونين حاملاً أو كنتِ مرضعة (انظري "حمل, إرضاع وخصوبة")
- كنت تحت جيل 16 سنة
- لديك مرض معوي التهابيّ, مثل مرض كرون, التهاب القولون التقرحي أو التهاب القولون
- لديك ضغط دم مرتفع وغير مسيطر عليه بالعلاج (تحقق من طبيبك أو الممرضة إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان ضغط دمك مُسيطر عليه جيداً)
- كنت تعاني من مشاكل في القلب بما في ذلك فشل قلب (متوسط أو وخيم), ذبحة صدرية (ألم في الصدر)

- كنت تعاني من داء قلبي إقفاري، كان لديك نوبة قلبية أو جراحة مجازة أو مرض الأوعية الدموية المحيطة (تدفق دم منخفض في الرجلين أو القدمين بسبب تضيق أو انسداد الأوعية الدموية)
- كان لديك أي نوع من سكتة دماغية (بما في ذلك سكتة دماغية صغيرة، نوبة إقفارية عابرة أو TIA). إيتوريكوسيب قد يزيد قليلاً الاخطار (احتمال الخطر) لنوبة قلبية وسكتة دماغية ولذلك لا يجوز تناوله من قبل مرضى كان لديهم في الماضي مشاكل قلبية أو سكتة دماغية.

إذا كنت تعتقد بأن أي من هذه له علاقة بك، لا تتناول الأقراص حتى تستشير طبيبك.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- قبل العلاج بإتوريكوسيب ديسل، أخبر الطبيب إذا:
- كان لديك سابقة لنزيف في المعدة أو لتقرحات.
- حصل لديك جفاف، مثلاً عقب نوبة طويلة من التقيؤ أو الإسهال.
- كان لديك تورم نتيجة لاحتباس السوائل.
- كان لديك سابقة لفشل قلب أو أي مرض قلبي آخر.
- كان لديك سابقة لضغط دم مرتفع. يمكن أن يرفع إيتوريكوسيب ضغط الدم لدى مرضى معينين، خاصة في الجرعات المرتفعة، وسوف يرغب طبيبك بقياس ضغط دمك من حين إلى آخر.
- كان لديك سابقة لمرض كبد أو كلي.
- كنت تتلقى علاجاً للتلوث. قد يمّوه إيتوريكوسيب أو يخفي سخونة التي هي إشارة لتلوث.
- كان لديك سكري، كولسترول مرتفع أو إذا كنت مدخناً. يمكن لهذه العوامل أن تزيد الاخطار (احتمال الخطر) لديك لمرض قلب.
- كنت امرأة تحاول الحمل.
- كنت فوق جيل 65 سنة.

إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان أحد البنود المذكورة أعلاه ينطبق عليك، تحدث مع طبيبك قبل تناول إيتوريكوسيب ديسل من أجل الاستفسار فيما إذا كان هذا المستحضر يناسبك.

يعمل إيتوريكوسيب جيدًا على حد سواء لدى المرضى البالغين الشباب والمرضى الأكبر سنًا. إذا كنت فوق جيل 65 سنة، سوف يرغب طبيبك بالإشراف عليك كما ينبغي. ليست هنالك حاجة لملائمة الجرعة لدى المرضى فوق جيل 65 سنة.

الأطفال والمراهقين

لا يجوز إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين تحت جيل 16 سنة.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو أخذت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خصوصًا إذا كنت تأخذ واحد من الأدوية التالية، سوف يرغب طبيبك بمراقبتك من أجل فحص فيما إذا كانت أدويةك تعمل كما ينبغي، بعد بدء العلاج بإتوريكوسيب ديسل:

- أدوية التي تمنع الدم (مضادات التخثر) مثل وارفارين
- ريفامبيسين (مضاد حيوي)
- ميتوتريكسات (دواء الذي يستعمل لتنشيط جهاز المناعة ويستعمل أحيانًا لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي)
- سيكلوسبورين أو تاكروليموس (أدوية لتنشيط جهاز المناعة)
- ليثيوم (دواء لعلاج أنواع مختلفة من الاكتئاب)
- مستحضرات مخصصة لعلاج ضغط الدم المرتفع وفشل القلب، التي تُدعى مثبطات ACE ومُحصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، مثل اينالابريل، رامبيريل، لوسارتان، فالسارتان
- مُدَرّات بولية
- ديجوكسين (دواء لفشل القلب و نظم غير منتظم للقلب)
- مينوكتيديل (دواء لعلاج فرط ضغط الدم)
- سلبوتامول أقراص أو محلول للإعطاء عن طريق الفم (دواء للربو)
- أقراص منع الحمل (قد يزيد الدمج الاخطار (احتمال الخطر) لديك لأعراض جانبية)
- علاج هورموني بديل (قد يزيد الدمج الاخطار (احتمال الخطر) لديك لأعراض جانبية)
- أسبيرين، الاخطار (احتمال الخطر) لتقرحات في المعدة أكبر إذا كنت تتناول إيتوريكوسيب مع أسبيرين.
- أسبيرين لمنع نوبات قلبية أو سكتة دماغية:
- بالإمكان تناول إيتوريكوسيب مع جرعات منخفضة من الأسبيرين. إذا كنت تتناول الآن جرعة منخفضة من الأسبيرين لمنع نوبات قلبية أو سكتة دماغية، لا يجوز التوقف عن تناول الأسبيرين بدون استشارة طبيبك.
- أسبيرين وأدوية مضادة للالتهاب لاستيرونيدية أخرى (NSAIDs):
- لا يجوز تناول الأسبيرين بجرعة عالية أو أدوية مضادة للالتهاب أخرى أثناء تناول إيتوريكوسيب.

استعمال الدواء والطعام

يجوز تناول أقراص إيتوريكوسيب ديسل مع أو بدون الطعام. قد تكون بداية تأثير إيتوريكوسيب أكثر سرعة عند تناوله بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

لا يجوز تناول أقراص إيتوريكوسيب دكسل خلال الحمل. إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين بأنك قد تكونين حامل، أو إذا كنت تخططين للحمل، لا يجوز تناول الأقراص. إذا حملت، توقفي عن أخذها واستشري طبيبك. استشري الطبيب في حال لم تكوني متأكدة أو بحاجة إلى مشورة إضافية.

الإرضاع

ليس معروفاً إذا كان إيتوريكوسيب يُفرز في حليب الأم. إذا كنتِ مرضعة، أو تخططين للإرضاع، استشري طبيبك قبل تناول إيتوريكوسيب دكسل. إذا كنت تتناولين إيتوريكوسيب دكسل، لا يجوز الإرضاع.

الخصوبة

إيتوريكوسيب دكسل غير موصى به لدى النساء اللواتي يحاولن الحمل.

القيادة واستعمال الآلات

تم التبليغ عن دوخة وُنعاس لدى جزء من المرضى الذين تناولوا إيتوريكوسيب. لا تُقْد إذا كنت تشعر بدوخة أو نُعاس. لا تستعمل أي معدات أو آلات إذا كنت تشعر بدوخة أو نُعاس.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي إيتوريكوسيب دكسل على لاكتوز. إذا قبل لك من قبل طبيبك في الماضي بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج بهذا الدواء. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملي مول (23 ملغ) صوديوم لكل قرص، مما يعني أنها في الواقع "خالية من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تناول أكثر من الجرعة الموصى بها لحالتك. سوف يرغب طبيبك بمناقشة علاجك من حين إلى آخر. من المهم أن تستعمل الجرعة الأصغر التي تسيطر على ألمك وأن لا تتناول إيتوريكوسيب دكسل لوقت أطول من المطلوب. ذلك لأن الاختطار (احتمال الخطر) لنوبات قلبية وسكتات دماغية قد يزيد بعد علاج مستمر، خصوصاً بجرعات عالية.

هنالك عبارات مختلفة لهذا الدواء وسوف يصف طبيبك العيار الملائم لك وفقاً لمرضك.

الجرعة الموصى بها بشكل عام هي:

- التهاب عظام المفصل: الجرعة الموصى بها هي 30 ملغ مرة في اليوم، يُمكن الزيادة لحد أقصى قدره 60 ملغ مرة في اليوم، عند الحاجة.
- التهاب المفصل الروماتويدي: الجرعة الموصى بها هي 60 ملغ مرة في اليوم، مع زيادة قصوى ل- 90 ملغ مرة في اليوم عند الحاجة.
- التهاب الفقار المُسَبَّب: الجرعة الموصى بها هي 60 ملغ مرة في اليوم، مع زيادة قصوى ل- 90 ملغ مرة في اليوم عند الحاجة.
- لحالات التهاب المفصل النقرسي الحاد وللألم بعد جراحة أسنان، يجب استعمال إيتوريكوسيب فقط لفترة الألم المصحوب بالأعراض.
- النقرس (gout): الجرعة الموصى بها هي 120 ملغ مرة في اليوم، التي يجب استعمالها فقط في المرحلة الحادة من الألم، محدودة ل- 8 أيام علاج كإقصى حد.
- ألم بعد جراحة أسنان: الجرعة الموصى بها هي 90 ملغ مرة في اليوم، محدودة ل- 3 أيام علاج كإقصى حد.

معالجين ذوي مشاكل كبد

- إذا كان لديك مرض كبدي خفيف، لا يجوز تناول أكثر من 60 ملغ مرة في اليوم.
- إذا كان لديك مرض كبدي معتدل، لا يجوز تناول أكثر من 30 ملغ مرة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين

لا يجوز إعطاء إيتوريكوسيب دكسل للأطفال والمراهقين تحت جيل 16 سنة.

المُسَنون

لا توجد حاجة لملائمة الجرعة لدى معالجين مُسنين. كما في أدوية أخرى، يجب اتخاذ الحذر مع معالجين مُسنين.

طريقة الإعطاء

إيتوريكوسيب دكسل مُخصص للإعطاء عن طريق الفم. يجب تناول الأقراص مرة في اليوم. يمكن تناول إيتوريكوسيب دكسل مع أو بدون طعام.

يجب بلع الدواء مع كمية قليلة من الماء.

ممنوع شطر الأقراص لأنه لا يوجد خط شطر. ليست هنالك معلومات حول سحق/مضغ الأقراص.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

لا يجوز أبدًا تناول أقرص أكثر مما أوصى به الطبيب. إذا تناولت أقرص أكثر من اللازم من إيتوريكوكسيب ديكسل، عليك التوجه لتلقي علاج طبي فورًا. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل من الدواء بالخطأ، توجه فورًا لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

من المهم تناول إيتوريكوكسيب ديكسل وفقًا لما وصف طبيبك. إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد، في اليوم التالي واستشر الطبيب. يجب الاستمرار في العلاج حسب الموصى به من قبل الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن في وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال إيتوريكوكسيب ديكسل أعراضًا جانبيةً لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

إذا كنت تطوّر أي واحدة من العلامات التالية، عليك التوقف عن العلاج بإيتوريكوكسيب ديكسل والتوجه إلى الطبيب فورًا (انظر "قبل استعمال الدواء"، بند 2):

- ضيق تنفس، آلام في الصدر أو تورم في الكاحلين التي تظهر أو تتفاقم
- اصفرار الجلد والعينين (يرقان) – هذه علامات لمشاكل في الكبد
- ألم بطن وخيم أو مستمر أو براز أسود
- رد فعل تحسسيّ (أرجي) - الذي يمكن أن يشمل تفاعلات جلدية مثل تقرحات أو نُقط (بثرات)، أو تورم الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق الذي قد يسبب صعوبات في التنفس.

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

- ألم بطن

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):

- سيخ جاف (التهاب وآلم بعد قلع سن)
- تورم الرجلين و/أو القدمين نتيجة لاحتباس السوائل (وذمة)
- دوخة، آلم رأس
- خفقان القلب (دقات قلب سريعة أو غير منتظمة)، نظم غير منتظم للقلب (اضطراب النظم)
- ارتفاع في ضغط الدم
- أزيز أو ضيق تنفس (تشنجات قصبية)
- إمساك، غازات (فرط غازات)، التهاب المعدة (التهاب الغشاء المخاطي للمعدة)، حُرقة، إسهال، صعوبات في الهضم (عسر الهضم)/عدم ارتياح في البطن، غثيان، تقيؤ، التهاب في المريء، تقرحات في الفم
- تغيرات في فحوصات الدم المرتبطة بالكبد
- كدمات
- وهن وتعب، مرض شبيه بالإنفلونزا

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 1,000):

- التهاب المعدة والأمعاء (التهاب الجهاز الهضمي الذي يشمل كلاً من المعدة والمعوي الدقيق/إنفلونزا البطن)، تلوث في المسالك التنفسية العلوية، تلوث في المسالك البولية
- تغيرات في قيم فحوصات المختبر (انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض في الصفائح الدموية)
- حساسية زائدة (رد فعل تحسسيّ (أرجي) بما في ذلك شرى الذي قد يكون وخيم بحيث يتطلب علاج طبيّ فوري)
- ارتفاع أو انخفاض في الشهية، زيادة في الوزن
- قلق، اكتئاب، انخفاض في حدة الحواس؛ رؤية، شعور أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسة)
- تغيرات في المذاق، عدم القدرة على النوم، خدر أو وخز، نُعاس
- تشوش الرؤية، تهيج في العين واحمرار
- رنين في الأذنين، دوار (شعور بدوخة أثناء الوقوف في المكان)
- نظم غير منتظم للقلب (رجفان أذيني)، نظم قلب سريع، فشل قلب، الشعور بضيق، ضغط أو ثقل في الصدر (ذبحة صدرية)، نوبة قلبية
- تَوَرُد، سكتة دماغية، سكتة دماغية صغيرة (نوبة إقفارية عابرة)، ارتفاع وخيم في ضغط الدم، التهاب الأوعية الدموية
- سُعال، ضيق تنفس، نزيف من الأنف
- انتفاخ في المعدة أو في المعوي، تغير في عادات التغوط، جفاف في الفم، قرحة معدة، التهاب الغشاء المخاطي للمعدة الذي قد يكون وخيم ويؤدي لنزيف، متلازمة المعوي المتهيج، التهاب البنكرياس

- تورم الوجه, طفح في الجلد أو حكة في الجلد, احمرار الجلد
- انقباض/ تشنج عضلي, ألم/تصلب عضلي
- مستويات عالية من البوتاسيوم في دمك, تغيرات في فحوصات الدم أو البول المتعلقة بكليتيك, مشاكل وخيمة في الكلى
- ألم في الصدر

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 10,000):

- وَدَمَةٌ وَعَائِيَّةٌ (رد فعل تحسسيّ (أرجي) المصحوب بتورم الوجه, الشفتين, اللسان و/أو الحلق حيث يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس أو البلع, وقد يكون وخيم بحيث يتطلب علاج طبيّ فوري) // تفاعلات تَأَقِيَّةٌ/ تَأَقَانِيَّةٌ بما في ذلك صَدْمَةٌ (رد فعل تحسسيّ (أرجي) وخيم الذي يتطلب علاج طبيّ فوري)
- ارتباك, عدم راحة
- مشاكل في الكبد (التهاب كبد)
- مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم
- فشل كبد, اصفرار الجلد و/أو العينين (يرقان)
- ردود فعل جلدية وخيمة

إذا ظهر عرض جانبيّ, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية, أو عندما تعاني من عرض جانبيّ لم يُذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية, أو عن طريق الدخول للرابط: <http://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ونظر الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: حَرَن تحت 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تُساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone, croscarmellose sodium, hypromellose (E464), magnesium stearate, titanium dioxide (E171), triacetin (E1518), carnauba wax.

أقراص إيتوريكوكسيب دكسل 30, 60 و-120 ملغ تحتوي بالإضافة إلى ذلك: Lake brilliant blue (E133), Lake quinoline yellow (E104)

أقراص إيتوريكوكسيب دكسل 60 و-120 ملغ تحتوي بالإضافة إلى ذلك: Iron oxide yellow (E172)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

- إيتوريكوكسيب دكسل 30 ملغ: أقراص مدوّرة بلون أزرق أخضر. 28 قرص في العبوة.
- إيتوريكوكسيب دكسل 60 ملغ: أقراص مدوّرة بلون أخضر داكن. 14 قرص في العبوة.
- إيتوريكوكسيب دكسل 90 ملغ: أقراص مدوّرة بلون أبيض. 14 قرص في العبوة.
- إيتوريكوكسيب دكسل 120 ملغ: أقراص مدوّرة بلون أخضر فاتح. 7 أقراص في العبوة.

تم التنقيح في أيلول 2020

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إيتوريكوكسيب دكسل 30 ملغ: 160-15-34747-00

إيتوريكوكسيب دكسل 60 ملغ: 160-16-34749-00

إيتوريكوكسيب دكسل 90 ملغ: 160-17-34750-00

إيتوريكوكسيب دكسل 120 ملغ: 160-18-34751-00

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض., شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل.