

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) 1986

يُستوى هذا الدواء بدون وصفة طبية

سولودنت غسول للفم محلول لغسل الفم



التركيبة:

كلور هيكسيدين ديجلوكونات 0.2% w/v

(Chlorhexidine Digluconate 0.2% w/v)

المركبات غير الفعالة ومسببات الحساسية في الدواء – انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" وفي البند 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة باعتماد حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقًا للتعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

- لإعانة تكون اللويحة السنية (البلاك).
- للمساعدة في علاج ومنع التهاب اللثة (جينجيفيتيس).
- للمساعدة في الحفاظ على النظافة الصحية للفم.
- لاستعمال بعد الجراحات أو العلاجات السنية، للبحث على تعافي اللثة.
- لعلاج الفروخ، والالتهابات الناجمة عن استعمال أطقم الأسنان، والتلوث الفطري في الفم.

الفصلية العلاجية: مطهر

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة كلور هيكسيدين ديجلوكونات أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز استعمال لدى الأولاد الذين عمرهم دون 12 عامًا إلا بتوصية من الطبيب.
- يجب الاستعمال في تجويف الفم فقط. لا يجوز بلعه. في حالة ملامسة المحلول للعينين أو للأذنين، فيجب شطفهما جيدًا بالماء.
- في حالة نشوء رد فعل تحسسي شديد، عليك التوقف عن الاستعمال والتوجه فورًا لتلقي المساعدة. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- قد تخل معاجين الأسنان بفعالية غسول الفم. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، اشطف فمك جيدًا بالماء وانتظر 5 دقائق قبل استعمال سولودنت غسول للفم. بدلًا من ذلك، بإمكانك استعمال غسول الفم أيضًا في وقت آخر من اليوم.

- لا يجوز تبييض الأقمشة التي لامست غسول الفم.
- قد يظهر تطليخ (تصبغ) مؤقت للأسنان واللسان. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".
- قد يطرأ تغير على الإحساس بالطعم، أو تستشر بإحساس بالذغ، الوخز أو التتميل في تجويف الفم. انظر البند 4 "الأعراض الجانبية".

الأولاد والمرافقون:

الدواء مخصص للاستعمال لدى متلقي العلاج الذين يزيد عمرهم عن 12 عامًا. إذا كان العمر دون ذلك فيجب مراجعة الطبيب قبل الاستعمال.
التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع:

يمكن استعمال الدواء إذا كنت حاملًا أو مرضعًا.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على المركب PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (يسمى أيضًا: Macrogolglycerol Hydroxystearate)، الذي قد يسبب تهيجًا في الجلد.
- يحتوي الدواء على الكحول الذي قد يسبب إحساسًا بالذغ على الجلد المتضرر.
- يحتوي هذا الدواء على 5.656 ملل من الكحول في كل 100 ملل، وهذا التركيز يعادل 0.05656 ملل/ملل.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية استعمال الدواء.

الجرعة الدوائية المثبتة عادة هي: مرتان في اليوم.

- التهاب اللثة: يوصى بالاستعمال لمدة شهر.
- الفروخ في الفم والتلوث الفطري في الفم: يجب مواصلة الاستعمال لمدة يومين إضافيين بعد الشفاء.
- التهابات الفم الناجمة عن أطقم الأسنان: يجب تنظيف ونقع أطقم الأسنان في غسول الفم لمدة 15 دقيقة مرتين في اليوم.
- بعد الجراحات السنية: يجب اتباع تعليمات طبيب الأسنان الخاص بك.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال:

لا يجوز بلعه.

يجب الاستعمال فقط إذا كان قفل السداد موجودًا وبشكله الكامل قبل الفتح.

تعليمات الاستعمال:

- يجب تعبئة كأس القياس الصغيرة حتى خط 10 ملل، وشطف الفم جيدًا بالدواء لمدة دقيقة واحدة وبعد ذلك يجب بصق الدواء.
- إذا استمرت الأعراض، فراجع الطبيب.
- إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد يبلغ الدوا بالخطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.
- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سولودنت غسول للفم إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تطلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا لتلقي المساعدة الطبية إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

- طفح جلدي
- انتفاخ في الفم، في الشفتين، في اللسان، في الحلق أو في الوجه
- صعوبات في التنفس

قد تكون هذه الأعراض أعراضًا لرد فعل تحسسي خطير ونادر جدًا.
يجب التوقف عن استعمال الدواء ومراجعة الطبيب إذا ظهر لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

- تهيج في الفم
- ألم
- انتفاخ الجانب الداخلي للخدين
- أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) – أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل 1 من بين 10:
- تطليخ (تصبغ) مؤقت للسان ويتلاشى عند إيقاف العلاج.
- أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:
- جفاف في الفم.
- تغير في حساسة الذوق، إحساس بالذغ، تتميل، أو وخز في اللسان عندما تستعمل غسول الفم لأول مرة. يزول ذلك عادة مع الاستمرار بالعلاج.

إذا استمرت الأعراض – فيجب التوجه إلى الطبيب.

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوها بعد):

- تطليخ (تصبغ) مؤقت للأسنان وعادة يمكن إزالته عن طريق التنظيف بالفرشاة.

يمكن منع حدوث هذا التطليخ بواسطة الامتناع عن شرب الشاي، القهوة أو النبيذ الأحمر – خاصة ساعة بعد الاستعمال، وأيضًا عن طريق تنظيف الأسنان اليومي بالفرشاة ومعجون الأسنان (انظر البند 3 "كيف تستعمل الدواء؟"). إذا بقي التطليخ، فيمكن إزالته بواسطة التنظيف والصلق لدى طبيب الأسنان أو أخصائية صحة الأسنان.

بالنسبة لأطقم الأسنان – يمكن تنظيفها بواسطة مادة لتنظيف أطقم الأسنان.

- انتفاخ في غدد العناب.
- تقشر الجلد داخل الفم. لاجتئاب حدوث ذلك، يجب تخفيف غسول الفم بكمية مساوية من الماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدون على العبوة. يتغير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C.
- يجب حفظه في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.
- يمكن استعمال الدواء لما لا يزيد عن 6 أشهر منذ فتح العبوة لأول مرة، ودون تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Purified Water, Sorbitol Solution, Ethanol 95% (Alcohol 95%), PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Peppermint Oil

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنبلة لونها بني تحتوي على محلول صافٍ. تأتي مع كأس قياس صغيرة.

حجم العبوة: 300 ملل.

المصنّع وصاحب الامتياز:

بن شعون فلوريس م.ض.، المنطقة الصناعية ميسجاف، بريد متجول 2017400، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في 02/2025 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

163-01-36040-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.