

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

سيبتادين محلول

التريكية:

كلورهيكسيدين ديجلوكونات 0.5% w/v
(Chlorhexidine Digluconate 0.5% w/v)
كحول 70% v/v (Alcohol 70% v/v)

المركبات غير الفعالة ومسببات الحساسية في الدواء - انظر
البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال الدواء وفقاً للتعليمات الواردة في البند

3 "كيف تستعمل الدواء"، في هذه النشرة. استشر الصيدلي

إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة

الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء المخصص لتطهير اليدين السريع، آيماً قبل العمليات

الطبية الغزوية.

الفصيلة العلاجية: مواد مطهرة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

• إذا وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادتين الفعالتين

كلورهيكسيدين ديجلوكونات وأو الكحول أو لأي من

المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر

البند 6 "معلومات إضافية"). خاصة لدى متلقي العلاج

الذين لديهم سيرة مرضية من ردود الفعل التحسسية

المحتملة المرتبطة بكلورهيكسيدين.

• بتماس مع العينين، الدماغ، أغشية الدماغ، في الأذن

والوسطى أو في الأذن الخارجية عندما يكون الغشاء

الطبيعي (طبلة الأذن) متقوياً.

• بالحقن.

• في فتحات الجسم (على سبيل المثال: الأنف، الأذنين).

• عندما يتم استعمال الإنفاذ الحراري (نوع من

التجيزات الجراحية) بعد استعمال سيبتادين - يجب

التأكد من عدم تراكم سيبتادين ومن جفاف الجلد أو وجب

تنسج في محيط متلقي العلاج.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

• يحتوي سيبتادين على كلورهيكسيدين. معلوم أن

كلورهيكسيدين يسبب فرط الحساسية، بما في ذلك ردود

فحتمل أن تكون هناك ضرورة لنقل الدم من أجل إبطال

الحالات المدم.

• استعمال محاليل كلورهيكسيدين لتطهير الجلد قبل

الإجراءات الغزوية - سواء تلك التي تتركز على الكحول

أو المائية - مرتبط بحدوث حروق كيميائية لدى المواليد

الجدد. يبدو أن الأطفال الرضع الذين يولدون قبل الأوان

أكثر عرضة لحدوث الخطر، خاصة أولئك الذين يولدون

قبل الأسبوع الـ 32 من الحمل وخلال أول أسبوعين في

حياتهم.

• لا يجوز مجاورة المنتج لمصادر الحرارة أو النار.

• لا يجوز إشعال سيجارة أو التعرض للنار إلى أن يصف

المستحضر تماماً.

• لا تجوز إتاحة التلامس مع العينين بسبب التخوف من

تضيق البصر. إذا نجم تلامس مع العينين - اشطفهما

جدا بالماء وبشكل فوري. في حالة نشوء كهيج، احمرار،

آلم في العين أو اضطراب في الرؤية فاطلب المشورة

الطبية بشكل فوري.

• تم الإبلاغ عن حالات خطيرة من تضمر القرنية المستمر

(تضمر مساحة سطح العين)، الذي قد يتطلب زرع

القرنية، عند تلامس المنتج، مشابهة مع العين بالخطأ

أثناء إجراءات جراحية، لدى المرضى الخاضعين للتخدير

الكلي (النوم العميق من غير الأمل).

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى

بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية،

فاخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على 15 مغ من Propylene glycol في كل

جرعة (3 مل).

3. كيف تستعمل الدواء؟

• عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من

الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

• يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول:

• لا يجوز بلعه! هذا الدواء مخصص لاستعمال الخارجي فقط.

• يجب الامتناع عن ملامسة العينين والأغشية المخاطية. في

حالة الملامسة يجب الشطف بالكثير من الماء ومراجعة

الطبيب عند الحاجة.

كيفية الاستعمال:

• اسكب 3 مل من المستحضر على يدين نظيفتين، ووزع

المحلول على كل مساحة اليد وحك اليدين ببعضهما إلى أن

تتغير المادة (تطالين) بشكل تام.

• إذا بلعت الدواء بالخطأ أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ،

فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى

وأحضر معك عبوة الدواء.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من

الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية

إذا كنت بحاجة إليها.

• إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء،

فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

• مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سيبتادين إلى نشوء أعراض

جانبيه عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة

الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

• يجب التوقف فوراً عن استعمال الدواء والتوجه لتلقي

العلاج الطبي إذا ظهرت الأعراض التالية:

• في أحيان نادرة جداً يمكن أن يسبب كلورهيكسيدين فرط

الحساسية، بما في ذلك الصدمة التأقية (انتفاخ الحلق أو

التشنج، ضغط دم منخفض).

• أعراض جانبية إضافية مدى شيوها غير معروف:

• ردود فعل تحسسية (مثلاً التهاب الجلد، حكة، احمرار،

إيكزيما، طفح جلدي، شرى، تهيج الجلد، حويصلات).

• تضمر القرنية (تضمر مساحة سطح العين) وتضور

دائم للعينين يشمل اختلال الرؤية الدائم (بسبب التهاب

المرضى للعينين أثناء جراحة للراس، الوجه والرقبة)

لدى المرضى الخاضعين للتخدير الكلي (النوم العميق

من غير الأمل).

• أعراض جانبية لدى المواليد الجدد:

• يُحتمل حدوث حروق كيميائية لدى المواليد الجدد

والأطفال الرضع (الشيوخ غير معلوم).

• إذا حدث أحد ردود الفعل هذه، فيجب التوقف عن الاستعمال

والتوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو

إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة،

فتعليق استشارة الطبيب.

التعليق عن الأعراض الجانبية

• بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج

الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(www.health.gov.au) والذي يوجه إلى الاستمارة

المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول

إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

• امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في

مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال

الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا

تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين:

• يجب التخزين في مكان بارد، في درجة حرارة دون

25°C.

• يجب إغلاقه بإحكام.

• تنبيه! مادة قابلة للاشتعال. تُحفظ بعيداً عن النار.

• بعد الفتح لأول مرة، يمكن استعمال الدواء حتى تاريخ

انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

6. معلومات إضافية

• بالإضافة إلى المادتين الفعالتين، يحتوي الدواء أيضاً على:

Purified water, Glycerin, Propylene Glycol

(E1520), Brilliant Blue.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

• محلول أزرق اللون.

• المحتوى: 500 ملل.

• قد لا تسوق جميع أحجام العبوة.

الصنّع وصاحب الامتياز:

• بن شعون فلوريس م.ض، المنطقة الصناعية ميسجاف،

بريد متجول ميسجاف 2017400، إسرائيل.

• تم تحرير هذه النشرة وفقاً لإرشادات وزارة

الصحة.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة

الصحة: 108-58-29253-00

• من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة

بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص

لكلا الجنسين.