

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

## פורוסמיד אינובמד

**טבליות**

**חומר פעיל:**

כל טבליה מכילה: פורוסמיד 40 מ"ג

Furosemide 40 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.**
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

**פעילות רפואית**

מטרת לטיפול בבצקת ריאות, בבצקת המתלווה לאי-ספיקת לב, בשחמת הכבד, למחלת כליות ולטיפול בלחץ דם גבוה.

**קבוצה תרופוטית:** תרופות משננות.

תרופות אלו ניתנות לטיפול בבצקת, מצב בו יש יותר מדי מים בגוף שלך. מצב זה יכול להתרחש עקב בעיה בלב, בריאות, בכליות, בכבד, בכלי הדם או לחץ דם גבוה. פורוסמיד אינובמד עוזרת לכליות להיפטר מעודף המים שלא נדרשים בגוף.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה גרשי (אלרגי) לחומר הפעיל, furosemide, לסולפונאמידים אחרים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- אתה סובל מליקוי חמור בכליות המונע מהן לתפקד כראוי ולייצר שתן.
- אתה סובל מאי ספיקת כליות הנובעת מתרופות או מכימיקלים הנוטים לגרום לנזק כלייתי או לנזק לכבד או אם יש לך אי ספיקת כליות כתוצאה מהפרעות שמקורן בכבד.
- יש לך רמות נמוכות מאוד בדם של אשלגן, נתון או של אלקטרוליטים אחרים או תת-נפח דם (הרופא יוכל ליעץ לך).
- אתה מיובש.
- יש לך לחץ דם נמוך.
- אתה נוטל תוספי אשלגן או משתנים שומרי אשלגן לטיפול בלחץ דם גבוה (כגון אמילוריד או ספירנולאקטון).
- יש לך שינוי ברמות ההכרה ותדרמת כתוצאה **משחמת הכבד** (יעיפות, חולשה, אצירת מים, בחילות או הקאות, ירידה במשקל או בתיאבון, הצהבה של העור או העיניים, גרד) או כתוצאה **מאנפאלופתיה כבדית** (בלבול, שינוי ברמות ההכרה ותדרמת כתוצאה משכל כבדי).
- יש לך מחלת אידוס (רמות נמוכות של הורמונים קורטיקוסטרואידים מופרשים).
- יש לך הרעלת דיגיטליס (בחילות או הקאות, רמות גבוהות של אשלגן בדם, קצב לב איטי, מהיר או לא סדיר).
- את מניקה.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול בפורוסמיד אינובמד, ספר לרופא אם:**

- אתה סובל מתת-נפח דם (hypovolaemia).
- אתה בסיכון לפתח לחץ דם נמוך או כאשר מדובר בפגים כיוון שהם עלולים יותר להיות בעלי נטיה לפתח אבנים בכליות.
- יש לך גודש בכבד (זימט דם איטית דרך כלי הדם) או בעיות כבד אחרות.
- יש לך בעיות כליה או שיש לך רמות נמוכות של חלבונים בדם (תת-חלבון בדם – hypoalbuminaemia) כתוצאה מליקוי כלייתי.
- יש לך בעיות חריגות בדם.
- יש לך או יכול להיות שיש לך סוכרת. אם אתה נוטל אינסולין, ייתכן שהרופא יצטרך להתאים את מינון האינסולין שלך.
- אתה קשיש, אם אתה אדם נוטל תרופות אחרות העלולות לגרום לירידה של לחץ הדם ואם יש לך מצבים רפואיים אחרים המעמידים אותך בסיכון לירידה בלחץ הדם.
- אתה סובל מלחץ דם נמוך או מרגיש סחרחורת כאשר אתה נעמד.

אתה מרגיש סחרחורת או מיובש. זה יכול לקרות אם איבדת כמות גדולה של מים בגלל הקאה, שלשול או מתן שתן בתדירות גבוהה מאוד. זה יכול להתרחש גם אם אתה מתקשה לשתות או לאכול.

יש לך רמות נמוכות בדם של מינרלים חיוניים כמו נתרן או אשלגן או שיש לך חוסר איזון בסיס-חומצה בגוף שזוהה בבדיקות דם.

אתה סובל מבעיות בערמונית (פרוסטטה) כלומר הגדלה של בלוטת הערמונית (לגברים בלבד) או שיש לך קושי במתן שתן.

אתה עומד לעבור בדיקת סוכר (גלוקוז).

אתה סובל משיגדון (גאוט, gout – מאופיינת במפרקים כואבים עקב עליה ברמות של חומצת שתן).

אתה עומד לעבור בדיקות דם או שתן.

יש לך רמות מגברות של סידן או רמות נמוכות של מגנזיום בדם; מומלץ ניטור קפדני של נזלים ורמות אלקטרוליטים. אתה כבר מטופל בתרופות כמו נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs – לטיפול בדלקת ובאכא) או מעכבי ACE (תרופות המשמשות להורדת לחץ דם).

**בדיקות ומעקב**

במשך תקופת נטילת תרופה זו ייתכן שהרופא ינטר את מצבך ויפנה אותך לבדיקות דם.

**אין אנטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות הנקראות מעכבי ACE (כגון רמיפריל, אנלפריל, תרופודופיל או חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין II (כגון לוסרטן, קאנדסארטאן, אירבסארטאן). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המנה של התרופה שלך או לבקש ממך להפסיק את נטילתה.
- אליסקין – לטיפול ביתר לחץ דם.
- תרופות להורדת לחץ דם כמו מעכבי רנין, חוסמי אלפא (כגון לוסרטן), אירבסארטאן, אירבסארטאן). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המנה של התרופה שלך או לבקש ממך להפסיק את נטילתה.
- אליסקין – לטיפול ביתר לחץ דם.
- תרופות להורדת לחץ דם כמו מעכבי רנין, חוסמי אלפא (כגון לוסרטן), תרופות משננות (כגון אמילוריד, ספירנולאקטון), פנוטיאזינים (כגון פרומתאזין).
- תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב מסוג חוסמי בטא (כגון סוטלוול, אטמולול, פרופראנוולין, כגון אמיריפטילין), תרופות כמו נוגדי דיכאן טריציקליים (כגון אמיריפטילין), מעכבי מנואמין אוקסיזאד (MAOIs) (כגון סג'לין) או תרופות הפינטוטינול ונגזרות חרדה (כגון ברביטוראטים).
- תרופות להורדת לחץ דם או לבעיות לבביות (קצב לב לא סדיר) כמו חוסמי תעלות סידן, חוסמי בטא, קלונדין, מוקסונידן, ניטרופרסיד סודיום, אמידארון, דיזופירמיד, פליהאניד, מינוקסידיל, ליזוקאין, הידראלאזין, דיאזוקסיד, מתילדופה.
- דיזוקסין המשמש לטיפול באי ספיקת לב. ייתכן שהרופא יצטרך לשנות את מינון התרופה.
- ליתיום – לטיפול במחלות נפשיות.
- סוכראלפאט – תרופה זו עלולה להפחית את הספיגה של פורוסמיד אינובמד.
- כולסטרואמין או כולסטיפול – לטיפול בכולסטרול גבוה.
- תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs) – תרופות לטיפול בכאב ובדלקת (כגון איבופרופן, נאפרוסקן, אינדומתאצין, קטורולאק) או סליצילאטים (כגון אספירין).
- אנטיביוטיקות המשתייכות למשפחת האמינוגליקוזידים או הפולימיקסינים מכיוון שעלול להיות סיכון לנזק לאוזניים או לכליות (כגון צפקאלור, גנטמיצין, וקומיצין).
- אמפותריצין (לטיפול בדיהומים פטרייתיים).
- תרופות לטיפול באפילפסיה (נוגדי פרכוסים כגון קארבאמאזין, פינטואין).
- נוגדי פטריות (סיכון לאובדן אשלגן או לנזק כלייתי המתואר עם פורוסמיד).
- תרופות המשמשות לטיפול בהיזומים הנגרמים על ידי וירוס, כגון ריטונאביר.

תרופות המשמשות לטיפול בבלקת, המכונות קורטיקוסטרואידים כגון פרדניזולון, דקסמתזון.

תרופות או מוצרי מזון המכילים ליקריץ' (סיכון מוגבר לאובדן אשלגן עם פורוסמיד).

ציספלאטין – לטיפול בסרטן (סיכון מוגבר לנזק לכליות עם פורוסמיד).

מתוטרכסאט – סיכוי מוגבר לרעילות של פורוסמיד.

לדופה – לטיפול במחלת פרקינסון (סיכון מוגבר להורדת לחץ דם עם פורוסמיד).

תרופות לדיכוי מערכת החיסון (כגון ציקלוספואין, נאפרוסקן, אינדומתאצין, קטורולאק) או סליצילאטים (כגון אספירין).

הפולימיקסינים מכיוון שעלול להיות סיכון לנזק לאוזניים או לכליות (כגון צפקאלור, גנטמיצין, וקומיצין).

אמפותריצין (לטיפול בדיהומים פטרייתיים).

קארבאמאזין, פינטואין).

נוגדי פטריות (סיכון לאובדן אשלגן או לנזק כלייתי המתואר עם פורוסמיד).

תרופות המשמשות לכרפי שרירים כגון באקלופן או טיזאנידן.

לילות למינעת היריון או תרופות המכילות אסטרוגן עלולות לחסום את השפעת פורוסמיד אם נלקחות בו זמנית.

תרופות כגון אלפרוסטדיל, לטיפול בכשל זקפתי (אין אונות – אימפוטנציה).

תאופילין לטיפול בצפופים וקושי בנשימה.

פרובניציד למניעת שיגדון (גאוט, gout).

תרופות המשמשות להרדמה כללית.

תרופות לשלשות – משמשות להקלה על עצירות.

תרופות לסוכרת (כגון אינסולין). ייתכן ירידה בעילות כאשר אתה נוטל פורוסמיד אינובמד.

תרופות לטיפול בבעיות נפשיות המכונות פסיכוחז' כגון ריפסרידן, אמיסולפריד, פימוזיד או כלרופומאזין. יש להימנע משימוש פימוזיד בו זמנית עם פורוסמיד.

תרופות לטיפול באסטמה כאשר ניתנות במינונים גבוהים.

תרופות משננות אחרות כגון בנדרפולומיטיאזיד. ייתכן שהרופא יצטרך לשנות את מינון של התרופה שלך.

מלח אשלגן המשמשים לטיפול ברמת אשלגן נמוכה בדם.

**שימוש בתרופה ומזון**

ניתן לשתות את התרופה עם אוכל.

**שימוש בתרופה וצריכת אלקוהול**

עלך להימנע משתיית אלקוהול כאשר אתה נוטל פורוסמיד אינובמד כיוון שזה עשוי לגרום לירידה נוספת בלחץ הדם שלך.

**היריון והנקה**

יש להיוועץ ברופא לפני שאת נוטלת פורוסמיד אינובמד אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת ללדת תינוק.

**הבינון**

אין ליטול טבליות פורוסמיד אינובמד אם את בהריון, אלא אם נאמר לך אחרת על ידי הרופא שלך.

**הצננה**

אין להקיא את דם נוטלת פורוסמיד אינובמד. זאת כיוון שכמויות קטנות עלולות לעבור לתוך חלב האם.

**נהיגה ושימוש במכוונות**

חלק מהתופעות שפורוסמיד אינובמד עלולה לגרום לסחרחורת או בלילות פחות עירניים דבר שיכול להפריע ליכולת לנהוג או להפעיל מכוונת. אם אתה חש פחות ערני מבדרך כלל, אל תנהג או תפעיל מכוונת והתייעץ עם הרופא שלך.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

פורוסמיד אינובמד מכילה חומרים מנוהיידרזאט, שהוא סוג של סוכר. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבולות ללקטוז או שאינך יכול לעכל סוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבליה, ולפיכך נחשבת לנטולת נתרן".

ראה גם סעיף 6 – "מידע נוסף".

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עלך לדבוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

**מינון**

המינון ואופן הטיפול יוקבעו על ידי הרופא בלבד.

הרופא יתאים את המינון לכל מטופל בהתאם למצבו ולתגובתו. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אופן השימוש**

אין מידע לגבי כתישה/לעיסה של הטבליה.

ניתן ללחצות את הטבליה בקו החצייה. יש לבלוע את הטבליות עם מעט מים.

ניתן ליטול את התרופה עם אוכל.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמינים של מינון יתר כוללים התייבשות ושינויים ברמות של חומרים מסוימים בדם.

**אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת ליטול את תרופה זו בזמן המיועד, קח את המנה מיד כשזכרתך ואז קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצול על המנה ששכחת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור ממצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושרך! בדוק תהויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.**

**הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפורוסמיד אינובמד עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש לפנות מיד לרופא או לבית החולים אם יש לך אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:**

- תגובה אלרגית חמורה העשויה לכלול גירוד, פריחה עורית עם גירוד חמור וסרפדת, חום, רגישות לאור, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון או קושי בנשימה או בבליעה.
- שלפוחית, דלקת של קולף של העור מסביב לשפתיים, לעיניים, לפה, לאף ולאברי המין, תסמינים דמויי שפעת וחום יכולים להוות מצב הנקרא נמק אפידרמלי רעלני (toxic epidermal necrolysis).
- דלקת של כלי דם (vasculitis) העלולה לגרום לפריחה, חום וכאבי מפרקים או שרירים או דלקת כליה העלולה לשנות את מספר הפעמים שאתה מטיל שתן או שאתה עלול לראות דם בשתן. ייתכן שיהיה לך חום, תחוש נמנום, או תבחין בפניחיות, למשל, של הקרסול.
- כתמים אדמונים על העור, כגון פרקים ו/או דלקת בעיניים, "פוסטולוזיס תפרחתית מופשטת חדה (AGEP)" (פריחה מושרית תרופה – פגיעה חריפה (acute febrile drug eruption), המאופיינת בתגובה חמורה חריפה (אלרגית) המלווה בחום ובשלפוחיות על העור/קילוף של העור ובכתמים זעירים ומדימום בעור.
- דלקת פתאומית של הלבלב מלווה בכאב חמור בבטן העליונה או המקרין לכיוון הגב.
- כל חברוה או דימום בלתי מוסברים, חום, כאב גרון, כיבים בפה. זה יכול להיות סימן לספירת דם נמוכה, אגרנווציטוזיס. ספירת דם לא תקינה (ירידה בתאי דם לבנים) של המלווה ברגישות מוגברת לזיהום.
- אנמיה אפלטטית (מצב המאופיין בירידה בתאי דם אדומים). סימנים לדלקת בכליות, לדוגמה כאבים בצדדים, דם בשתן. הלב (ירידה חמורה בלחץ הדם, חיוורון קיצוני, אי שקט, דופק חלש ומהיר, עור לח, פגיעה בכיבד) כתוצאה מהתרחבות חמורה ופתאומית של כלי הדם עקב אלרגיה לחומרים מסוימים.
- הפרעה פסיכיאטרית.
- שינויים בכבד הגורמים להצהבה של העור או של לובן בעיניים.
- קריש דם (גורם לכאב, נפיחות או רגישות ברגליים).

**תופעות לוואי נספוט**

**עלך לדווח לרופא או לרוקח אם הבחנת באחת מתופעות הלוואי הבאות:**

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:**

- התייבשות, שלשול, במאזן של נזלים וחומרים בגוף (כגון נתרן, אשלגן, כלור, סידן ומגנזיום) הגורם ליובש בפה, חולשה, יעיפות או נמנום, אי-שקט, עוויתות, כאבים, חולשה או התכווצות של השרירים, לחץ דם נמוך הגורם לירידה בריכוז ותגובות מואטות, קושי במתן שתן, קצב לב מהיר או לא סדיר, בחילה והקאות

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-100 משתמשים מתוך 100:**

- תת-נפח דם (hypovolaemia)
- עלייה בערכי קריאטינין ושתנן (אוריהה) בדם (נראה בבדיקות דם)

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000:**

- שינויים בראייה הכוללים ראייה מטושטשת או צהובה
- שינויים בגוף הניאיים בבדיקות כגון רמתות או רמות חומצה אורית
- רמות בדם של חלק מהשומנים (כולסטרול וטריגליצרידים) עשויות לעלות, אך בדרך כלל חוזרות לרמות תקינות תוך 6 חודשים
- שיגדון (גאוט)
- קצב לב לא סדיר
- התכווציות שרירים או חולשה
- שינויים בכמות השתן או בצורך להשתין
- אם יש לך הפרעה בשלפוחיות השתן, בלוטת ערמונית מוגדלת או היצרות של השלפוחים, ייצור השתן עלול להיפסק בפתאומיות
- ירידה בלחץ דם הגורמת לפגיעה בריכוז ובתגובות, הרגשת סיחרור, תחושות של לחץ בראש, כאב ראש, סחרחורת, נמנום, הרגשת חולשה, שינויים בראייה, יובש בפה וחוסר יכולת ללמוד זקוף
- רגישות לאור (פוטוסנטסיביות)
- הרגשת יעיפות
- יובש בפה, צמא, הפרעות במעי כגון שלשול, עצירות, בחילה או הקאות
- בעיות נשמיכה כגון 'לצלולים באוזניים', חירשות (לפעמים בלתי הפיך)

**תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000:**

- עליה בתאים מסויימים בדם (אאזינופילים)
- עלייה באזנימי כבד מסויימים
- תחושת נמלול ודקרוו, תחושת גירוד או עקצוץ בעור
- בלבול, כאב ראש, סחרחורת, יעיפות, תחושה כללית לא טובה, חום
- אם יש לך חסימה בדרכי השתן, ייצור שתן מוגבר עלול להתרחש או להחמיר
- פריחות עוריות כולל גרד

**תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שמופיעות בכפות ממששתש אחד מתוך 10,000:**

- תמועות לא רצויות של השריר
- תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):**

- חמצת מטבושת המאופיינת בכאבי חזה, דופק לא סדיר, כאב ראש, תחושת בחילה, הקאות, כאבי בטן, שינוי בתיאבון ועלייה במשקל, חולשת שרירים, כאבי עצמות ומפרקים
- ירידה ברמות אשלגן בגוף (חסר אשלגן) המאופיינת בחולשת שרירים וחוסר יכולת לנווץ שריר אחד או יותר (שתוק), הפרשה מוגברת של שתן ובעיות לב
- מועטים שונים של דלקת עור (דרמטיס) כולל פריחה אלרגית (אורטיקריה) נגעים שלפוחיתיים, אריתמה מולטיפורמה (erythema multiforme), ארגמנת (פורפורה – דימומים תת-עוריים), דלקת עור שמלווה בקילוף של העור (exfoliative dermatitis), גרד

**תופעות לוואי נוספות בירדים:**

- משקעים של מלח' סידן בכליות או מומי לב כגון צינור עורקי פתוח (patent ductus arteriosus) דווחו אצל פגים בעקבות טיפול בפורוסמיד
- אבנים בכליות בתינוקות
- אנמיה הופיעה **תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון, עלוך להתייעץ עם הרופא.**
- ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום קרר מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (expiry date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתחשב (exp) האחרון של אותו חודש.

**יש לאחסן את התרופה במקום קריר ויבש, בטמפרטורה מתחת ל-25°C.**

אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**לופח**
Lactose monohydrate, maize starch, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

טבליות לא מוצפות, עגולות, בצבע לבן-קרם, עם קצה משופע שטוח, בצד האחד מוטבטים "F" ו-"40" המופרדים בקו חצייה והצד השני חלק.

**סוג האריזה:** התרופה מסופקת באריזת קרטון המכילה 30 טבליות במגשייות (בליסטרים)

**בעל הרישום והיוצא:** אינובמד פארמה בע"מ, ת.ד. 2349, בני ברק.

**שם היצרן:** אאורובינדו פארמה בע"מ, היידראבאד, טלנגנה, הודו.

**העלון נערך בנובמבר 2024.**

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 174-14-36620

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף