

**יש לשאת כרטיס זה איתך כל הזמן.**  
**הצג כרטיס זה לכל אנשי הצוות הרפואי**  
**המעורבים בטיפולך, ואם אתה הולך לבית החולים**

טאלווי עלול לגרום לתופעות לוואי כגון תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) ורעילות עצבית, כולל תסמונת רעילות עצבית הקשורה לתאי חיסון אפקטוריים (ICANS)<sup>1</sup>.

## שם המטופל/ת:

### מידע בטיחותי חשוב למטופלים

פנה מייד לעזרה רפואית אם אתה חווה אחד מהבאים:

רעילות עצבית, כולל ICANS	תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS)
<ul style="list-style-type: none"><li>• הרגשת בלבול</li><li>• הרגשת פגיעה בערנות או ישנוניות</li><li>• הרגשה של חוסר התמצאות</li><li>• שינוי, איטיות או קושי בחשיבה</li><li>• ירידה בהכרה</li><li>• קושי בדיבור, בהבנת הדיבור ובכתיבה</li><li>• חולשת שרירים, תנועות איטיות, קושי בהליכה</li><li>• פרכוסים</li><li>• פגיעה בזיכרון</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• חום</li><li>• לחץ דם נמוך</li><li>• צמרמורות</li><li>• קושי בנשימה</li><li>• תשישות</li><li>• כאב ראש</li><li>• קצב לב מהיר</li><li>• עלייה ברמת אנזימי כבד בדם</li></ul>

**חשוב לזכור:** השאר קרוב למקום בו קיבלת את הטיפול בטאלווי למעקב יומי, למשך יומיים לפחות לאחר קבלת כל אחת מהמנות במהלך המתן ההדרגתי. אם הנך חווה תסמין **כלשהו** מאלו הרשומים בכרטיס זה, התקשר לרופא/ה שלך או פנה לקבלת עזרה רפואית דחופה באופן מיידי! אלו לא כל תופעות הלוואי האפשריות של טאלווי. ספר לרופא/ה שלך אם יש לך תופעת לוואי כלשהי שמטרידה אותך או שאינה חולפת.

## הרופא/ה המטפל/ת

שם הרופא/ה המטפל/ת:	מספר טלפון של הרופא/ה המטפל/ת:
שם בית החולים וכתובת:	מספר טלפון:

### מידע למילוי על-ידי הצוות הרפואי

אנא מסור כרטיס זה לצוות הרפואי שלך על-מנת שימלאו את המידע ויחזירו אותו אליך.  
תאריכי זריקות טאלווי (לוח הזמנים של המתן ההדרגתי):

**מנה 1 של המתן ההדרגתי**

**מנה 2 של המתן ההדרגתי**

**מנה 3 של המתן ההדרגתי**

**מנה 4 של המתן ההדרגתי\***

**שלב הטיפול‡**

\*למנה דו-שבועית בלבד.

‡ מנה טיפולית תינתן פעם בשבוע במינון של 0.4 מ"ג/ק"ג החל מהמנה השלישית ואילך, או פעם בשבועיים במינון של 0.8 מ"ג/ק"ג החל מהמנה הרביעית ואילך.

### מידע בטיחותי חשוב לאנשי צוות רפואי

CRS ורעילות עצבית, כולל ICANS, עלולים להתרחש במטופלים המקבלים טאלווי ויכולים להיות קטלניים או מסכני חיים. מרבית המקרים שנצפו בעקבות מתן טאלווי היו בדרגה קלה/בינונית (דרגות 1 ו 2)<sup>1</sup>.

בצע הערכה של המטופל לזיהוי סימנים ותסמינים של CRS ו-ICANS. אם המטופל שלך מדווח על סימנים או תסמינים כלשהם המוזכרים בכרטיס זה, אנא צור קשר עם הרופא/ה המטפל/ת שלו באופן מיידי למידע נוסף.

לפרטים המלאים יש לעיין בעלון לרופא באתר משרד הבריאות הישראלי: <https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>.

### דיווח תופעות לוואי

פורמט זה ותכולתו נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ב- 01/12/2024. למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי באתר הבית של משרד הבריאות: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il), או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

בנוסף, ניתן לדווח על תופעות לוואי ישירות לג'ונסון וג'ונסון ישראל, בטלפון: 09-9591111.

<sup>1</sup> Talvey-2mg\_ml\_40mg\_ml\_solution for injection\_PI\_09\_2024.